

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
SARAKSTS**

2013



RĪGA, 2013

UDK 581+502(474.3)
La 810

Izdevējs: **Valsts augu aizsardzības dienests**

Izdevumu sagatavojuši

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta speciālisti:

Inese Margeviča

Regīna Čūdere

Dace Būmane

Laila Krupenko

Anitra Prekele

Maija Gudoviča

Vāka noformējumam izmantota **Māras Bērziņas** fotogrāfija

Datormaketētāja **Ilze Stikāne**

Sagatavots un iespiests SIA “N. I. M. S.”

Pērnavas ielā 47/3, Rīgā LV-1009

ISBN 9984-679-79-9

SATURS

Ievads	5
Saīsinājumi un skaidrojumi	6
Alfabētiskie rādītāji	7
Latvijas Republikā reģistrētie ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi	7
Latvijas Republikā reģistrētie augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļi	16
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kas satur sadzīvē izmantojamās vielas	16
Latvijas Republikā reģistrētie trešās reģistrācijas klases ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi	17
Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas	19
Latvijas Republikā reģistrētie mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	26
Latvijas Republikā reģistrētie dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi	26
Izsniegtās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai	27
Augu aizsardzības līdzekļu saraksts, kuriem 2012. gadā izmainīts nosaukums	27
2011. un 2012. gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulētie ieraksti	28
Ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi	28
2011. un 2012. gadā anulētās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai	28
2010. gadā anulētie ieraksti augu aizsardzības līdzekļu reģistrā	29
Augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļi	29
Augu aizsardzības līdzekļi, kas satur sadzīvē izmantojamās vielas	29
Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi	30
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus atsevišķās kultūrās nedrīkst lietot tuvāk par 40 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm	30
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus nedrīkst lietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm	30
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus nedrīkst lietot tuvāk par 12 / 14 / 15 / 16 vai 25 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm	32
Citi Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi	33
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir kaitīgi bitēm	33
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus lietojot, ir jāievēro aizsardzības pasākumi blakuskultūrām un citiem ar lietojumu nesaistītiem organismiem	34
Augu aizsardzības līdzekļu lietojumi	37
Augu augšanas regulatori	37
Desikanti	42
Dezinfekcijas līdzekļi	43
Kodnes	45
Koku brūču aizsarglīdzekļi	53
Fungicīdi	54
Herbicīdi	136
Insekticīdi un akaricīdi	200
Lamacīdi	228
Repelenti	230

Rodenticīdi	231
Mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	232
Dzīvus organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi	233
2010. gadā anulēto augu aizsardzības līdzekļu lietošana	237
Augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļi	237
Augu aizsardzības līdzekļi, kas satur sadzīvē izmantojamās vielas	238
Fungicīdi kartupeļu lakstu puves (<i>Phytophthora infestans</i>) ierobežošanai	240
Fungicīdi augļu dārzēm	241
Kodnes ziemāju graudaugu sēklu kodināšanai, to devas un ierobežojamās augu slimības	242
Kodnes vasarāju graudaugu sēklu kodināšanai, to devas un ierobežojamās augu slimības	243
Fungicīdi graudaugiem	244
Mieži	244
Kvieši	245
Rudzi	246
Tritikāle	247
Auzas	248
Apstrādājamo kultūraugu un citu objektu rādītājs	249
Latvijas tīrumos izplatītākās nezāles	269
Augu aizsardzības jomu regulējošie normatīvie akti	272
Augu aizsardzības likums	272
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū	283
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi	290
Aizsargjoslu likuma izraksts	294
Izraksts no likuma “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”	299
Izraksts no noteikumiem par Kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros	299
Valsts augu aizsardzības dienesta telefona numuri	300
Rapša fenoloģiskās attīstības stadijas	301
Sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas	302

IEVADS

Cienījamais augu aizsardzības līdzekļu lietotāj!

Augu aizsardzības jomā pēdējo gadu laikā ir notikušas ievērojamas izmaiņas – līdz ar jaunas likumdošanas stāšanās spēkā Eiropā, 2011. un 2012. gadā tika veiktas izmaiņas arī mūsu normatīvajos aktos, kas regulē augu aizsardzības jomu. Katram augu aizsardzības līdzekļu lietotājam būtu noteikti jāizlasa jaunie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi. Šie noteikumi ir atrodamī mūsu izdevumā. Papildus tam, katram profesionālajam augu aizsardzības līdzekļa lietotājam būtu jāzina arī tas, ka 2012. gada 10. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 “Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām”, kas paredz to, ka līdz 2016. gada 26. novembrim visām iekārtām (izņemot rokas lietošanas iekārtas un smidzinātājus, kas pārnēsājami uz muguras) vismaz vienu reizi ir jābūt pārbaudītām. Šie noteikumi gan nav iekļauti grāmatā, taču tos, tāpat kā citu ar augu aizsardzību saistītu informāciju, atradīsiet dienesta mājas lapā – <http://www.vaad.gov.lv>. Plānojam, ka tuvākajā laikā tiks apstiprināti arī noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību.

2012. gads augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas jomā tika aizvadīts, strādājot paralēli gan pie augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas ziemeļu zonā, gan pieliekot punktu augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļu reģistrā pēc vecās kārtības – saskaņā ar direktīvu 91/414/EEK. Ziemeļu zonas augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas un reģistrācijas procedūras augļus varēsīm sākt nobaudīt tikai šogad – 2013. gadā, jo 2012. gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā līdzekļi tika iekļauti saskaņā ar iepriekšējo kārtību.

Ikgadējais izdevums “Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2013” ir papildināts ar 28 jauniem augu aizsardzības līdzekļiem, taču, kā katru gadu, arī 2012. gadā, vairāki augu aizsardzības līdzekļi no reģistra tika anulēti. 2013. gada izdevumā reģistrēto līdzekļu sarakstā neatradīsiet augu aizsardzības līdzekļus Opera s.e., Tanos 50 d.g., Kruizers 70 p.s., Arčers Top 400 e.k. un Pyramin Turbo, taču, lai izlietotu valstī esošos krājumus, katram līdzeklim ir noteikts papildus laiks krājumu izplatīšanai un izlietošanai. Šo informāciju atradīsiet grāmatā. Grāmatā atradīsiet izlietošanai noteiktos termiņus arī 2010. un 2011. gadā anulētajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Pagājušajā gadā ievērojami paplašinājies augu aizsardzības līdzekļu paralēlai tirdzniecībai izsniegto atļauju skaits – 2012. gadā tika izsniegtas 12 atļaujas.

Tā kā Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts visu laiku mainās, šīs izmaiņas izdevumā neatradīsiet, taču pašu jaunāko informāciju par izmaiņām augu aizsardzības līdzekļu reģistrā noteikti atradīsiet dienesta mājas lapā: <http://www.vaad.gov.lv>. Gadījumos, kad nepieciešama palīdzība augu aizsardzības jautājumos, zvaniet Valsts augu aizsardzības dienesta speciālistiem, kuru telefona numurus atradīsiet šī izdevuma nobeigumā vai mājas lapā: <http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regionalas-nodalas.aspx>.

Veiksmi vēlot

Valsts augu aizsardzības dienesta direktore

2013. gada janvārī



K. Kjago

SAĪSINĀJUMI UN SKAIDROJUMI:

A	akaricīds
AAL	augu aizsardzības līdzeklis
AAS	augu augšanas stimulators
a.e.	aerosols
AR	augu augšanas regulators
AS	attīstības stadijas: decimālā kodu sistēma graudaugu attīstības stadiju noteikšanai Zadoks, Chang, Kozak, 1974 rapša fenoloģiskās attīstības stadijas, BBCH skala sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas, BBCH skala
B	baktericīds
CS	kapsulu suspensija
D	desikants
d.g.; WG	disperģējošas granulas
d.š.	darba šķidrums
Dz	dzīvos organismus saturošais augu aizsardzības līdzeklis
e.k.; EC	emulsijas koncentrāts
e.ū.; EW	emulsija ūdenī
F	fungicīds
F/A	fungicīds – akaricīds
F/L/M	fungicīds – lihenicīds – muscicīds
g	grams
gr.	granulas
H	herbicīds
I	insekticīds
I/A	insekticīds – akaricīds
I/F	insekticīds – fungicīds
Liet. kat.	lietošanas kategorija
K	kodne
KBA	koku brūču aizsarglīdzeklis
k.k.f.	koncentrāts karstai fumigācijai
k.v.	kristāliska viela
k.k.v.	koloniju veidojošas vienības
konc.	Koncentrācija
L	lihenicīds
l	litrs
M	muscicīds
Mb	mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis
ml	mililitrs
m.s.	mikrokapsulu suspensija
OD	dispersija eļļā
p.	pulveris
p.s.; WP	pulveris suspensijai
prep.	preparāts
R	repelents
Reģ. klase	reģistrācijas klase
Reģ. Nr.	reģistrācijas numurs
Ro	rodenticīds
s., susp.	suspensija
s.e.	suspo-emulsija
s.k.; SC	suspensijas koncentrāts
š.k.; SL	šķīstošs koncentrāts vai šķīduma koncentrāts
š.g.; SG	šķīstošas granulas
tb.	tabletes
V	viricīds un virocīds
VAAD	Valsts augu aizsardzības dienests
•	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai
v •	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai vasarāju graudaugos
z •	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai ziemāju graudaugos
ZC	kapsulu suspensijas un suspensijas koncentrāta maisījums
Nogaidīšanas laiks	Laiks no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai, dienās
Aizsargjoslas platums	noteikts joslas platums no ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kurā aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus (10 m). Dažiem augu aizsardzības līdzekļiem tas var būt lielāks, tāpēc jāievēro nosacījumi, kas norādīti lietošanas instrukcijās.

ALFABĒTISKIE RĀDĪTĀJI

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģis- trā- cijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,4-D Nufarm š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0095	2	2,4-D	600 g/l	05.12.2016.	136
Accurate 200 WG	H	Cheminova A/S	0342	2	metil- metsulfurons	200 g/kg	31.12.2015.	136
Acrobat Plus	F	BASF A/S	0156	2/3	dimetomorfs mankocebs	90 g/kg 600 g/kg	30.06.2016.	54
Actara 25 WG	I	Syngenta Crop Protection AG	0167	2/3	tiametoksams	250 g/kg	31.01.2017.	200, 201
Actellic 50 EC	I/A	Syngenta Limited	0170	2	metil-pirimifoss	50%	30.09.2017.	202
Activus 330 EC	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0341	2	pendimetalīns	330 g/l	31.12.2013.	137
Adexar	F	BASF A/S	0404	2	fluksapiroksāds epoksikonazols	62.5 g/l 62.5 g/l	30.04.2019.	55
Agroksons 75 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0048	2	MCPA	750 g/l	22.02.2016.	137
Akanto 250 s.k.	F	DuPont Finland Ltd.	0308	2	pikoksistrobīns	250 g/l	31.12.2013.	56
Akanto Prīma š.g.	F	DuPont Finland Ltd.	0340	2	ciprodinils pikoksistrobīns	300 g/kg 80 g/kg	27.12.2019.	57
Aksials 50 e.k.	H	Syngenta Crop Protection AG	0304	2	pinoksadēns	50 g/l	31.05.2014.	138
Alister Grande OD	H	Bayer CropScience AG	0315	2	nātrija metil- jodosulfurons metil- mezosulfurons diflufenikans	4.5 g/l 6 g/l 180 g/l	12.10.2018.	138
Allegro Super s.e.	F	BASF A/S	0270	2	metil-krezoksims epoksikonazols fenpropimorfs	83 g/l 83 g/l 317 g/l	18.05.2016.	58
Altima 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0176	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2019.	59
Alverde	I	BASF A/S	0365	2	metaflumizons	240 g/l	27.03.2014.	205
Amega š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0288	2/3	glifosāts	360 g/l	15.11.2013.	139
Amistārs 250 s.k.	F	Syngenta Limited	0187	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2015.	60
Amistārs ekstra s.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0219	2	azoksistrobīns ciprokonazols	200 g/l 80 g/l	31.12.2015.	62
Amistārs Opti 480 s.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0325	2	azoksistrobīns hlortalonils	80 g/l 400 g/l	24.03.2019.	63
Archer Turbo 575 EC	F	Syngenta Crop Protection AG	0407	2	propikonazols fenpropidīns	125 g/l 450 g/l	31.01.2017.	64
Arelons flussig s.k.	H	Stähler International GmbH & Co. KG	0329	2	izoproturons	500 g/l	31.12.2018.	139
Ariane S	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0188	2	fluoksipirs klopīralīds MCPA	40 g/l 20 g/l 200 g/l	30.04.2017.	140

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arrats d.g.	H	BASF A/S	0249	2	tritosulfurons dikamba	250 g/kg 500 g/kg	31.12.2018.	140
Artea 330 e.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0169	2	propikonazols ciprokonazols	250 g/l 80 g/l	31.05.2015.	65
Attribut	H	Bayer CropScience AG	0191	2	Na-propoksi- karbazons	700 g/kg	31.03.2014.	140
Axial One 50 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0371	2	pinoksadēns florasulams	45 g/l 5 g/l	13.07.2014.	141
Ažils 100 e.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0003	2/3	propakvizafops	100g/l	21.02.2015.	141
Baytan Universal	K	Bayer CropScience AG	0220	2	triadimenols fuberidazols imazalils	75 g/l 9 g/l 10 g/l	23.04.2014.	45
Bampers 25 e.k.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0133	2	propikonazols	250 g/l	22.10.2018.	66
Bampers Super e.k.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0217	2	propikonazols prohlorazs	90 g/l 400 g/l	31.12.2015.	67
Banvels 4S š.k.	H	Syngenta Crop Protection AG	0038	2	dikamba	480 g/l	22.02.2016.	142
Barbarian 360 š.k.	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0298	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2015.	142
Barbarian Biograde 360 š.k.	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0299	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2014.	144
Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0289	2	glifosāts	490 g/l	31.05.2014.	145
Barclay Bolt XL	F	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0379	2	propikonazols	250 g/l	11.10.2014.	68
Bariton Ultra	K	Bayer CropScience AG	0336	2	fluoksastrobīns protiokonazols	112.5 g/l 112.5 g/l	08.10.2019.	45
Basta	H	Bayer CropScience AG	0200	2	amonija glufosināts	150 g/l	30.08.2013.	147
Bazagrāns 480 š.k.	H	BASF A/S	0024	2	bentazons	480 g/l	10.10.2015.	148
Bell	F	BASF A/S	0290	2	boskalīds epoksikonazols	233 g/l 67 g/l	31.07.2018.	69
Bell Super OD	F	BASF A/S	0377	2	boskalīds epoksikonazols	140 g/l 50 g/l	13.09.2021.	70
Betanal	H	Bayer CropScience AG	0291	2/3	fenmedifams	160 g/l	19.03.2017.	148
Betanal Expert	H	Bayer CropScience AG	0350	2	desmedifams fenmedifams etofumezāts	71 g/l 91 g/l 112 g/l	25.02.2019.	149
Bokseris 800 e.k.	H	Syngenta Crop Protection AG	0271	2	prosulfokarbs	800 g/l	18.05.2016.	149
Brasan 540 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	09.11.2018.	149
Buldoks 025 e.k.	I	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0090	2	beta-ciflutrīns	25 g/l	25.10.2016.	205
Butisan 400	H	BASF A/S	0037	2	metazahlors	400 g/l	22.02.2016.	150
Butisan Star	H	BASF A/S	0258	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	10.10.2015.	150
Butoksons š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0138	2	MCPB	400 g/l	16.12.2018.	150
Caliban Duo	H	Stähler International GmbH & Co. KG	0360	2	Na propoksi- karbazons Na metil- jodosulfurons	168 g/kg 10 g/kg	31.12.2018.	151
Cantus	F	BASF A/S	0280	2	boskalīds	500 g/kg	31.07.2018.	73
CCC	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0147	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	30.11.2019.	37
Celest Trio 060 FS	K	Syngenta Crop Protection AG	0380	2	fludioksonils difenokonazols tebukonazols	25 g/l 25 g/l 10 g/l	27.10.2021.	46
Ceriox	F	BASF A/S	0405	2	fluksapiroksāds epoksikonazols piraklostrobīns	41.6 g/l 41.6 g/l 66.6 g/l	31.01.2017.	73
Ceridor MCPA 750 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0345	2	MCPA	750 g/l	22.02.2016.	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cerone	AR	Bayer CropScience AG	0122	2	etefons	480 g/l	02.04.2018.	37
Chorus 50 WG	F	Syngenta Crop Protection AG	0339	2	ciprodinils	500 g/kg	28.10.2019.	74
Chwastox 750 SL	H	Zakłady Chemiczne "Organika Sarzyna" S.A.	0376	2	MCPA	750 g/l	08.02.2020.	151
Cikocels 750 š.k.	AR	BASF A/S	0096	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	05.12.2016.	38
Ciperkils 250 e.k.	I	Agriphar S.A.	0307	2	cipermetrīns	250 g/l	27.01.2018.	205
Ciperkils 500 e.k.	I	Agriphar S.A.	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	08.02.2020.	206
Comet	F	BASF A/S	0198	2	piraklostrobīns	250 g/l	31.05.2014.	75
Comet Pro	F	BASF A/S	0354	2	piraklostrobīns	200 g/l	21.07.2020.	76
Cruiser OSR	K	Syngenta Crop Protection AG	0195	2	tiametoksams fludioksonils metalaksils-M	280.0 g/l 8.0 g/l 32.3 g/l	30.04.2013.	46
Čambels s.k.	K	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0309	2	tebukonazols	60 g/l	27.04.2018.	47
Čempions 50 p.s.	F	Nufarm GmbH & Co KG	0139	3	vara hidroksīds	77%	16.12.2018.	76
Dalgis š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0286	2/3	glifosāts	360 g/l	06.07.2015.	152
Danadims 40 e.k.	I/A	Cheminova A/S	0211	2	dimetoāts	400 g/l	23.09.2013.	47, 207
Decis 2.5 e.k.	I	Bayer CropScience AG	0020	3	deltametrīns	25 g/l	10.10.2015.	208
Decis Mega	I	Bayer CropScience AG	0310	2/3	deltametrīns	50 g/l	17.12.2017.	209, 210
Devrinols s.k.	H	United Phosphorus Limited	0252	2	napropamīds	450 g/l	22.04.2015.	152
Dicoherb Super 750 SL	H	Nufarm GmbH & Co KG	0390	2	MCPA dikamba	660 g/l 90 g/l	30.04.2016.	152
Diqua	D	Sharda Europe b.v.b.a.	0338	2	dikvāts	200 g/l	31.12.2015.	42
Dithane NT	F	Indofil Industries Limited	0017	2/3	mankocebs	750 g/kg	30.06.2016.	78
Dividends Stārs 036 s.k.	K	Syngenta Crop Protection AG	0193	2	difenokonazols ciprokonazols	30 g/l 6.25 g/l	31.05.2015.	47
DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0108	2	2.4-D	55.3%	04.11.2017.	153
Dominators š.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0285	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2015.	153
Duets Ultra s.k.	F	BASF A/S	0319	2	epoksikonazols metil-tiofanāts	187 g/l 310 g/l	09.11.2018.	80
Duplozāns Super š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0084	2	dihlorprops-P MCPA mekoprops-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l	25.09.2016.	154
Effector	F	BASF A/S	0134	3	ditianons	700 g/kg	31.05.2015.	82
Efilor	F	BASF A/S	0372	2	boskalīds metkonazols	133 g/l 60 g/l	02.11.2021.	83
Elektis 75 d.g.	F	Gowan Comércio International e Serviços, Limitada	0179	2	zoksamīds mankocebs	83 g/kg 667 g/kg	31.03.2014.	83
Epox Extra	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0402	2	epoksikonazols folpets	50 g/l 375 g/l	30.09.2017.	84
Epox Top e.k.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0389	2	epoksikonazols fenpropidīns	40 g/l 100 g/l	10.01.2022.	85
Ergon	H	Rotam Agrochemical Europe Limited	0357	2	metil-metsulfurons metil-tifensulfurons	68 g/kg 682 g/kg	01.04.2020.	154
Estets 600 e.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0305	2	2.4-D	600 g/l	14.11.2017.	154
Falcon Forte	F	Bayer CropScience AG	0343	2	protiokonazols spiroksamīns tebukonazols	53 g/l 224 g/l 148 g/l	17.12.2019.	86
Falkons 460 e.k.	F	Bayer CropScience AG	0154	2	tebukonazols triadimenols spiroksamīns	167 g/l 43 g/l 250 g/l	28.02.2014.	86
Fandango	F	Bayer CropScience AG	0264	2	protiokonazols fluoksastrobīns	100 g/l 100 g/l	31.07.2018.	87

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fastac 50	I	BASF A/S	0250	2/3	alfa-cipermetrīns	50 g/l	21.02.2015.	211
Fenix	H	Bayer CropScience AG	0283	2/3	aklonifēns	600 g/l	28.12.2016.	155
Ferramol	L	W.Neudorff GmbH KG	0395	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	31.12.2015.	228
Fiesta T	H	BASF A/S	0174	2	hloridazons kvinmeraks	360 g/l 60 g/l	30.04.2015.	155
Flaits s.k.	H	BASF A/S	0292	2	pendimetalīns pikolīnafēns	330 g/l 7.5 g/l	13.03.2017.	156
Fleksiti s.k.	F	BASF A/S	0265	2	metrafenons	300 g/l	31.01.2017.	90
Flight Forte	H	BASF A/S	0293	2	pendimetalīns pikolīnafēns	320 g/l 16 g/l	13.03.2017.	156
Fokuss Ultra e.k.	H	BASF A/S	0065	2	cikloksidīms	100 g/l	08.05.2016.	156
Folikūrs 250 e.ū.	F	Bayer CropScience AG	0057	2	tebukonazols	250 g/l	01.05.2016.	38, 90
Fostoksīns tb.	I/F	Detia Degesch GmbH	0112	1	alumīnija fosfīds	56%	18.12.2017.	214
Fox 480 SC	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0375	2	bifenokss	480 g/l	25.05.2021.	157
Foxtrot 69 EW	H	Cheminova A/S	0408	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	31.12.2018.	157
Fungurāns OH 300 s.k.	F	Spiess-Urania Chemicals GmbH	0279	2	vara hidroksīds	487 g/l	04.01.2017.	92
Fury 100 EW	I	FMC Chemical, sprl	0256	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	06.07.2015.	214
Fusilade Forte 150 EC	H	Syngenta Limited	0182	2	butil-fluazifops-P	150 g/l	31.12.2015.	157
Galera š.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0313	2	klopīralīds piklorāms	267 g/l 67 g/l	05.05.2018.	158
GAT Stake 20 EC	H	GAT Microencapsulation AG	0392	2	fluoksipīrs	200 g/l	26.05.2015.	158
Glifogāns 360 š.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0114	2	glifosāts	360 g/l	18.12.2017.	159
Glifomaks š.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0175	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2015.	159
Glifomaks Plus š.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0316	2	glifosāts	360 g/l	13.11.2018.	160
Glifoss š.k.	H	Cheminova A/S	0012	2/3	glifosāts	360 g/l	22.04.2015.	161
Glifoss Suprīm š.k.	H	Cheminova A/S	0294	2	glifosāts	450 g/l	28.03.2017.	161
Glīns 75 d.g.	H	DuPont Finland Ltd.	0032	2	hlorsulfurons	750 g/kg	10.01.2016.	162
Gloria	F	Bayer CropScience AG	0213	2/3	fenamidons propamokarbs	75 g/l 314.1 g/l	15.11.2013.	92
Glyphomax 480	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0386	2	glifosāts	480 g/l	30.01.2022.	162
Goltiks 70 p.s.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0029	2	metamitrōns	700 g/kg	10.01.2016.	164
Goltiks 700 s.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0155	2	metamitrōns	700 g/l	31.08.2019.	164
Granstars Prēmija 50 š.g.	H	DuPont Finland Ltd.	0255	2	metil-tribenurōns	500 g/kg	06.07.2015.	164
Grasps 400 s.k.	H	Syngenta Crop Protection AG	0261	2	tralkoksīdīms	400 g/l	06.12.2015.	165
Grodils 75 d.g.	H	Bayer CropScience AG	0028	2	amidosulfurōns	75%	06.12.2015.	165
Gro-Stop HN k.k.f.	AR	Certis Europe B.V.	0222	1	hlorprofāms	300 g/l	21.06.2014.	39
Harmonijs 50 š.g.	H	DuPont Finland Ltd.	0300	2	metil-tifensulfurōns	500 g/kg	14.06.2017.	166
Hussar Activ OD	H	Bayer CropScience AG	0311	2	nātrija metil-jodosulfurōns 2.4-D 2-etilheksil esteris fluopikolīds	10 g/l 62.5 g/l	27.03.2018.	167
Imbrex	F	BASF A/S	0406	2	fluksapīroksāds	62.5 g/l	31.12.2022.	93
Impakts 25 s.k.	F	Cheminova A/S	0102	2	flutriafols	250 g/l	04.06.2017.	95
Impakts s.k.	F	Cheminova A/S	0101	2	flutriafols	125 g/l	04.06.2017.	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infinito	F	Bayer CropScience AG	0302	2/3	propamokarbs	523.8 g/l	30.09.2017.	95, 96
Input	F	Bayer CropScience AG	0266	2	protiokonazols spiroksamīns	160 g/l 300 g/l	31.12.2015.	97
Jablo š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0278	2/3	glifosāts	360 g/l	06.07.2015.	168
Juventus 90 š.k.	F	BASF A/S	0221	2	metkonazols	90 g/l	23.04.2014.	39, 99
Kaiso 50 EG	I	Nufarm GmbH & Co KG	0381	2	lambda- cihalotrīns	50 g/kg	09.11.2021.	217
Kalibre 50 š.g.	H	DuPont Finland Ltd.	0301	2	metil- tifensulfurons metil- tribenurons	333 g/kg 167 g/kg	14.06.2017.	168
Kalif 360 CS	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0409	2	klomazons	360 g/l	31.10.2018.	168
Kalif Mega	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0410	2	klomazons metazahlors	33 g/l 250 g/l	31.10.2018.	169
Kandits d.g.	F	BASF A/S	0197	2	metil- krezoksims	500 g/kg	31.12.2015.	100
Kapalo s.e.	F	BASF A/S	0327	2	epoksikonazols metrafenons fenpropimorfs	62.5 g/l 75 g/l 200 g/l	23.03.2019.	101
Karate Zeon 5 CS	I	Syngenta Limited	0207	2/3	lambda- cihalotrīns	50 g/l	25.04.2013.	218
Karis 10 CS	I	GAT Microencapsulation AG	0391	2	lambda- cihalotrīns	100 g/l	10.03.2015.	219
Kemikars T s.k.	K	Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited	0158	2	karboksīns tirāms	200 g/l 200 g/l	22.02.2016.	48
Kernels 480 š.k.	H	Cheminova A/S	0306	2	glifosāts	480 g/l	25.03.2016.	169
Kestac 50	I	BASF A/S	0251	2/3	alfa- cipermetrīns	50 g/l	21.02.2015.	220
Kinto s.k.	K	BASF A/S	0262	2	tritikonazols prohloraza vara hlorīds	20 g/l 60 g/l	06.12.2015.	48
Kliniks 360 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0215	2/3	glifosāts	360 g/l	15.11.2013.	170
K-Obiol	I	Bayer S.A.S	0394	2	deltametrīns	25 g/l	04.03.2020.	222
Komplet	H	Bayer CropScience AG	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	31.12.2018.	171
Korbels e.k.	F	BASF A/S	0044	2	fenpropimorfs	750 g/l	22.02.2016.	102
Lamardor	K	Bayer CropScience AG	0303	2	protiokonazols tebukonazols	250 g/l 150 g/l	28.02.2014.	49
Leander	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0397	2	fenpropidīns	750 g/l	31.12.2018.	102
Leimay SC	F	Nissan Chemical Europe S.A.R.L.	0346	2	amisulbroms	200 g/l	24.05.2013.	103
Legacy 500 SC	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0411	2	diflufenikans	500 g/l	31.12.2018.	171
Legacy Pro	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0415	2	diflufenikans pendimetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	31.12.2019.	171
Lentagrāns 45 p.s.	H	Belchim Crop Protection NV	0330	2	piridāts	450 g/kg	31.12.2015.	171
Lingo ZC	H	Belchim Crop Protection NV	0358	2	klomazons linurons	45 g/l 250 g/l	22.11.2020.	172
Lintūrs 70 d.g.	H	Syngenta Crop Protection AG	0136	2	triasulfurons dikamba	4.1% 65.9%	22.10.2018.	172
Logrāns 20 d.g.	H	Syngenta Crop Protection AG	0214	2	triasulfurons	200 g/kg	15.11.2013.	172
Lontrel 72 SG	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0388	2	klopīrālīds	720 g/kg	30.04.2017.	173
Magtoksīns tb.	I/A	Detia Degesch GmbH	0111	1	magnija fosfīds	66%	18.12.2017.	224
Maister OD	H	Bayer CropScience AG	0326	2	foramsulfurons nātrija metil- jodosulfurons	30 g/l 1 g/l	10.03.2019.	174

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maksims 025 s.k.	K	Syngenta Crop Protection AG	0089	2	fludioksonils	25 g/l	25.10.2016.	49
Maksims ekstra 50 s.k.	K	Syngenta Crop Protection AG	0272	2	difenokonazols fludioksonils	25 g/l 25 g/l	18.05.2016.	50
Maksims Stārs 025 s.k.	K	Syngenta Crop Protection AG	0150	2	fludioksonils ciprokonazols	18.75 g/l 6.25 g/l	31.05.2015.	50
Maredo 125 SC	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0373	2	epoksikonazols	125 g/l	15.05.2021.	103
Match 50 EC	I	Syngenta Crop Protection AG	0093	2	lufenurons	50 g/l	05.12.2016.	223
MCPA 750	H	Nufarm GmbH & Co KG	0135	2	MCPA	750 g/l	22.10.2018.	174
MCPA Super 500 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0119	2	MCPA	500 g/l	18.02.2018.	175
Medax Top	AR	BASF A/S	0347	2	kalcija proheksadions mepikvāta hlorīds	50 g/l 300 g/l	15.03.2020.	39
Menara 410 EC	F	Syngenta Crop Protection AG	0412	2	propikonazols ciprokonazols	250 g/l 160 g/l	31.01.2017.	105
Menno Florades š.k.	F/ B/V	Menno Chemie-Vestriebs GmbH	0254	3	benzoscābe	90 g/l	22.04.2015.	43
Metric ZC	H	Belchim Crop Protection NV	0344	2	metribuzīns klomazons	233 g/l 60 g/l	30.09.2017.	175
Mesurol	Lim	Bayer CropScience AG	0378	2	metiokarbs	20 g/kg	31.12.2021.	228
Mezzo d.g.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0322	2	metil- metsulfurons	200 g/kg	05.01.2019.	176
Milagro 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2018.	176
Milagro Extra 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	13.12.2020.	176
Mirāža 45 e.k.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0130	2	prohlorazs	450 g/l	04.06.2018.	105
Mistrāls 70 d.g.	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	30.09.2017.	176
Moddus 250 EC	AR	Syngenta Crop Protection AG	0183	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2017.	40
Monitors d.g.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0145	2	sulfosulfurons	75%	31.12.2015.	177
Mustangs s.e.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0184	2	florasulams 2,4-D (etil-heksil estera formā)	6.25 g/l 300.0 g/l	31.12.2015.	177
Mustangs Forte s.e.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0334	2	florasulams aminopiralīds 2,4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l	31.07.2013.	177
Mystic	F	Nufarm GmbH & Co KG	0362	2	tebukonazols	250 g/l	22.12.2020.	106
Nicogan	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0413	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2018.	178
Nimbus	H	BASF A/S	0328	2	metazahlors klomazons	250 g/l 33.3 g/l	23.03.2019.	178
Nimazals e.k.	I/A	Trifolio-M GmbH	0241	3	azadiraktīns-A	10 g/l	31.05.2015.	224
Nortrons 50 s.k.	H	Bayer CropScience AG	0013	2	etofumezāts	500 g/l	06.07.2015.	178
Nozomi p.s.	H	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0323	2	flumioksazīns	500 g/kg	16.12.2018.	179
Nuance 75 WG	H	Cheminova A/S	0403	2	metil- tribenurons	750 g/kg	28.02.2016.	179
Nufarm MCPA 750 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0045	2/3	MCPA	750 g/l	22.02.2016.	179, 180
Nuflon	H	Belchim Crop Protection NV	0366	2	linurons	450 g/l	21.03.2021.	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opera N	F	BASF A/S	0281	2	piraklostrobīns epoksikonazols	85.0 g/l 62.5 g/l	22.10.2016.	108
Optika Trio š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0248	2	mekoprops-P MCPA dihlorprops-P	130 g/l 160 g/l 310 g/l	26.11.2014.	180
Optimus	AR	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0399	2	etil-trineksapaks	175 g/l	30.04.2018.	40
Opus s.k.	F	BASF A/S	0190	2	epoksikonazols	125 g/l	30.04.2013.	109
Opus EC	F	BASF A/S	0367	2	epoksikonazols	83 g/l	28.03.2021.	109
Orius 250 e.ū.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0267	2	tebukonazols	250 g/l	14.03.2016.	111
Orvego	F	BASF A/S	0368	2	ametoktradīns dimetomorfs	300 g/l 225 g/l	27.03.2014.	112
Osiris	F	BASF A/S	0351	2	epoksikonazols metkonazols	37.5 g/l 27.5 g/l	27.06.2020.	112
Pantēra 4 e.k.	H	Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd.	0171	2	tefuril- kvizalofops-P	40 g/l	31.05.2014.	181
Penncozeb 75 DG	F	Cerexagri S.A.	0273	2/3	mankocebs	75%	30.06.2016.	113
Penncozeb 80 WP	F	Cerexagri S.A.	0180	2/3	mankocebs	80%	30.06.2016.	114
Perfekts 500 S e.k.	I/A	BASF A/S	0212	2	dimetoāts	500 g/l	23.09.2013.	225
Plenum 50 WG	I	Syngenta Crop Protection AG	0382	2	pimetrozīns	500 g/kg	18.01.2022.	226
Polytanol	Ro	Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG	0363	2	kalcija fosfīds	18 %	21.12.2020.	231
Premis 25 s.k.	K	BASF A/S	0153	2	tritikonazols	25 g/l	31.01.2017.	51
Previkurs E 840 š.k.	F	Bayer CropScience AG	0224	2/3	propamokarbs fosetils	530 g/l 310 g/l	21.06.2014.	114
Primus XL	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0387	2	florasulams fluroksipirs	5 g/l 100 g/l	20.09.2014.	181
Primuss s.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0172	2	florasulams	50 g/l	31.12.2015.	181
Prosaro	F	Bayer CropScience AG	0276	2	tebukonazols protiokonazols	125 g/l 125 g/l	31.07.2018.	115
Proteus OD	I	Bayer CropScience AG	0275	2	tiakloprīds deltametrīns	100 g/l 10 g/l	09.08.2016.	226
Protugan Super	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0414	2	izoproturons bifenokss mekoprops-P	300 g/l 150 g/l 145 g/l	31.12.2015.	182
Puma Universal	H	Bayer CropScience AG	0131	2	etil- fenoksaprops-P	69 g/l	04.06.2018.	182
Raksils Ekstra 515 š.k.	K	Bayer CropScience AG	0208	2	tebukonazols tirāms	15 g/l 500 g/l	16.06.2013.	51
Ranmans A s.k.	F	ISK Biosciences Europe S.A.	0243	2	ciazofamīds	400 g/l	26.11.2014.	116
Ranman Top	F	ISK Biosciences Europe S.A.	0355	2	ciazofamīds	160 g/l	01.08.2020.	117
Raundaps Eko š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0173	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2015.	183
Raundaps FL 360 š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0317	2	glifosāts	360 g/l	17.12.2018.	184
Raundaps Gold ST š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0318	2	glifosāts	450 g/l	17.12.2018.	184
Raundaps Klasiks š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0015	2/3	glifosāts	360 g/l	06.07.2015.	185
Raundaps Maks d.g.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0331	2	glifosāts	68 %	31.12.2016.	186
Reglons Super š.k.	D	Syngenta Limited	0087	2	dikvāts	150 g/l	25.10.2016.	42, 187
Reindžers š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0192	2/3	glifosāts	360 g/l	06.07.2015.	187
Revus 250 s.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0312	2	mandipropamīds	250 g/l	31.07.2013.	117
Ridomil Gold MZ 68 WG	F	Syngenta Crop Protection AG	0185	2/3	mankocebs metalaksils-M	64% 4%	31.12.2015.	117, 118

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riza 250 e.ū.	F	Cheminova A/S	0352	2	tebukonazols	250 g/l	20.05.2020.	119
Rodeo š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0159	2/3	glifosāts	360 g/l	06.07.2015.	188
Rosate 36 š.k.	H	Albaugh Europe SARL	0348	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2016.	188
Roundup ACE	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0205	2/3	glifosāts	450 g/l	03.03.2013.	190
Roundup FL 540	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0268	2/3	glifosāts	540 g/l	20.03.2016.	190
Roundup Garden	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0369	3	glifosāts	120 g/l	26.12.2021.	191
Roundup Quick	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0370	3	glifosāts	7.2 g/l	26.12.2021.	191
Rovral Aqua Flo	F/K	BASF A/S	0332	2	iprodions	500 g/l	10.06.2019.	52, 121
Sekators 375 OD s.k.	H	Bayer CropScience AG	0260	2	amidosulfurons Na-metil-jodosulfurons	100 g/l 25 g/l	10.10.2015.	192
Signum d.g.	F	BASF A/S	0269	2	boskalīds piraklostrobīns	26.7 % 6.7 %	31.05.2014.	121
Skors 250 e.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0001	2	difenokonazols	250 g/l	21.02.2015.	122
Sluxx	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0396	2	dzelzs (III) fosfāts	29.7 %	31.12.2015.	229
Sportak EW	F	BASF A/S	0008	2	prohlorazs	450 g/l	31.12.2015.	123
Stabilāns 750 š.k.	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0287	2	hlormekvāta hlors	750 g/l	31.11.2019.	40
Starane 180 e.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0140	2	fluroksipirs	180 g/l	31.12.2015.	192
Starane XL s.e.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0277	2	fluroksipirs florasulams	100 g/l 2.5 g/l	31.12.2015.	193
Stomps e.k.	H	BASF A/S	0007	2	pendimetalīns	330 g/l	21.02.2015.	193
Sultāns 500 s.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0245	2	metazahlors	500 g/l	26.11.2014.	194
Sumi-alfa 5 e.k.	I	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0148	2/3	esfenvalerāts	50 g/l	31.12.2015.	226
Svičs 62.5 d.g.	F	Syngenta Crop Protection AG	0244	2	fludioksonils ciprodinils	250 g/kg 375 g/kg	26.11.2014.	123
Swing Gold	F	BASF A/S	0356	2	dimoksistrobīns epoksikonazols	133 g/l 50 g/l	21.07.2020.	124
Symbol	H	United Phosphorus Limited	0364	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2016.	194
Širlāns 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0177	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2019.	124
Taifūns B š.k.	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0027	2/3	glifosāts	360 g/l	15.12.2015.	195
Tāngo Flex	F	BASF A/S	0359	2	metrafenons epoksikonazols	100 g/l 83 g/l	01.11.2020.	125
Tāngo Super s.e.	F	BASF A/S	0110	2	fenpropimorfs epoksikonazols	250 g/l 84 g/l	04.11.2017.	126
Tārga Super	H	Bayer CropScience AG	0383	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	31.12.2016.	196
Taspa 500 EC	F	Syngenta Crop Protection AG	0349	2	propikonazols difenokonazols	250 g/l 250 g/l	06.04.2019.	127
Tēridox 500 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0051	2	dimetahlors	500 g/l	22.02.2016.	196
Terpāls š.k.	AR	BASF A/S	0144	2	mepikvāta hlors etefons	305 g/l 155 g/l	28.02.2019.	41
Tilmor	F	Bayer CropScience AG	0353	2	protiokonazols tebukonazols	80 g/l 160 g/l	11.05.2020.	127
Tilts 250 e.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0105	2	propikonazols	250 g/l	04.11.2017.	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tiovits 80 d.g.	F	Syngenta Crop Protection AG	0056	2/3	sērs	80 %	21.03.2016.	130, 227
Titus 25 d.g.	H	DuPont Finland Ltd.	0059	2	rimsulfurons	250 g/kg	09.04.2016.	197
Tombo d.g.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0335	2	piroksulams florasulams aminopiralīds	50 g/kg 25 g/kg 50 g/kg	31.07.2013.	197
Tomigans 180 e.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0324	2	fluroksipirs	180 g/l	31.12.2015	197
Tooler	H	BASF A/S	0284	2	tritosulfurons	714 g/kg	30.11.2018.	198
Trimaxx	AR	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0398	2	etil-trineksapaks	175 g/l	30.04.2018.	41
Trimmers 50 š.g.	H	DuPont Finland Ltd.	0321	2	metil-tribenurons	500 g/kg	06.07.2015.	198
Topāzs 100 e.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0009	2/3	penkonazols	100 g/l	21.02.2015.	131
Toprex 375 SC	F/ AR	Syngenta Crop Protection AG	0400	2	difenokonazols paklobutrazols	250 g/l 125 g/l	31.12.2018.	41, 131
U 46 M š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0042	2	MCPA	750 g/l	22.02.2016.	199
Uragāns Sistem 4 š.k.	H	Syngenta Limited	0209	2/3	glifosāts	360 g/l	16.06.2013.	199
Vertimec 018 EC	A/I	Syngenta Crop Protection AG	0296	2	abamektīns	18 g/l	17.04.2017.	227
Vincits s.k.	K	Cheminova A/S	0106	2	flutriafols tiabendazols	25 g/l 25 g/l	04.11.2017.	52
Vista 228 s.e.	F	BASF A/S	0186	2	flukvinkonazols prohlorazs	54 g/l 174 g/l	31.12.2015.	132
Vitavakss 200 FF s.k.	K	Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited	0043	2	karboksīns tirāms	200 g/l 200 g/l	22.02.2016.	52
Viverda OD	F	BASF A/S	0384	2	boskalīds piraklostrobīns epoksikonazols	140 g/l 60 g/l 50 g/l	21.11.2021.	133
Zamirs 400 e.ū.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0314	2	tebukonazols prohlorazs	133 g/l 267 g/l	16.07.2018.	134
Zantara	F	Bayer CropScience AG	0374	2	biksafēns tebukonazols	50 g/l 166 g/l	12.05.2014.	135

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE
AUGU VAI DZĪVNIEKU VALSTS IZCELSMES
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrācijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausma š.k.	AAS	A/S "BIOLAT"	0236	3	priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	20%	21.06.2014.	37
Fitoekols IF 40 s.k.	F/I	A/S "BIOLAT"	0238	3	priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	40%	21.06.2014.	89, 213
Fitoekols IF	F/I	A/S "BIOLAT"	0239	3	priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	2%	21.06.2014.	89, 213
Plantskids š.p.	R	SIA American Equipment & Supply	0274	3	žāvētu asiņu milti	> 99%	10.05.2016.	230
Skuju pulveris SM 87	R	A/S "BIOLAT"	0237	3	priedes un egles ēteriskās eļļas	>0.05%	21.06.2014.	230
Timors e.k.	F	Biomor-Israel Ltd.	0233	3	Austrālijas tējas koka eļļa	500 g/l	21.06.2014.	130
Timorekss e.k.	F	Biomor-Israel Ltd.	0234	3	Austrālijas tējas koka eļļa	660 g/l	21.06.2014.	129
Timorekss d.š.	F	Biomor-Israel Ltd.	0235	3	Austrālijas tējas koka eļļa	7 g/l	21.06.2014.	129

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KAS SATUR SADZĪVĒ IZMANTOJAMAS VIELAS**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrācijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bordo maisījums	F	SIA "Ceļarāji"	0257	3	vara vitriols+ kaļķis = vara kompleksais savienojums	Attiecībā 1:1	06.07.2015.	71, 72
Bordo maisījums	F	SIA "Karaleks"	0227	3	vara vitriols+ kaļķis = kompleksais vara savienojums	attiecībā 1:1.5	21.06.2014.	71, 72
Cervacol extra	R	Stähler International GmbH & Co. KG	0337	3	kvarca smiltis	251 g/kg	07.10.2019.	230
Dzelzs vitriols k.v.	F/L/M	SIA "Karaleks"	0228	3	FeSO ₄ · 7 H ₂ O	96.5%	21.06.2014.	81
Lerāns š.k.	KBA	SIA "Karaleks"	0240	3	vara stearāts	4%	21.06.2014.	53
Vara vitriols k.v.	F	SIA "Karaleks"	0226	3	CuSO ₄ · 5 H ₂ O	98%	21.06.2014.	132

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE TREŠĀS REĢISTRĀCIJAS KLASES
ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Darbīgā viela	Reģistrācijas pieteicējs	Reģ. Nr.	Maksimālais iepakojums l, kg	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Acrobat Plus	F	dimetomorfs, mankocebs	BASF A/S	0156	1.0 kg	54
Actara 25 WG	K/I	tiametoksams	Syngenta Crop Protection AG	0167	0.004 kg	200, 201
Amega š.k.	H	glifosāts	Nufarm GmbH & Co KG	0288	1.0 l	139
Ausma š.k.	AAS	priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	A/S "BIOLAT"	0236	20.0 l	37
Ažils 100 e.k.	H	propakvizafops	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0003	0.1 l	141
Betanal	H	fenmedifams	Bayer CropScience AG	0291	1.0 l	148
Bordo maisījums	F	vara vitriols + kaļķis = kompleksais vara savienojums	SIA "Karaleks"	0227	0.3 kg + 0.5 kg	71, 72
Bordo maisījums	F	vara vitriols + kaļķis = kompleksais vara savienojums	SIA "Ceļarāji"	0257	0.2 kg	71, 72
Cervacol extra	R	kvarca smiltis	Stähler International GmbH & Co. KG	0337	5.0 kg	230
Čempions 50 p.s.	F	vara hidroksīds	Nufarm GmbH & Co KG	0139	10 kg	76
Dalgis š.k.	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0286	1.0 l	152
Decis 2.5 e.k.	I	deltametrīns	Bayer CropScience AG	0020	5.0 l	208
Decis Mega	I	deltametrīns	Bayer CropScience AG	0310	0.02 l	209, 210
Dithane NT	F	mankocebs	Indofil Industries Limited	0017	1.0 kg	78
Dominators š.k.	H	glifosāts	Dow AgroSciences Danmark A/S	0285	1.0 l	153
Dzelzs vitriols k.v.	F/ L/M	FeSO ₄ · 7 H ₂ O	SIA "Karaleks"	0228	0.3 kg	81
Effector	F	ditianons	BASF A/S	0134	1.0 kg	82
Fastac 50	I	alfa-cipermetrīns	BASF A/S	0250	0.1 l	211
Fenix	H	aklonifēns	Bayer CropScience AG	0283	1.0 l	155
Ferramol	Lim	dzelzs (III) fosfāts	W. Neudorff GmbH KG	0395	2.0 kg	228
Fitoekols IF	F/I	priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	A/S "BIOLAT"	0239	20.0 l	89, 213
Fitoekols IF 40 s.k.	F/I	priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	A/S "BIOLAT"	0238	20.0 l	89, 213
Glifomaks š.k.	H	glifosāts	Dow AgroSciences Danmark A/S	0175	1.0 l	159
Glifoss š.k.	H	glifosāts	Cheminova A/S	0012	1.0 l	161
Gloria	F	fenamidons, propamokarbs	Bayer CropScience AG	0213	1.0 l	92
Infinito	F	propamokarbs fluopikolīds	Bayer CropScience AG	0302	0.5 l	95, 96

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7
Jablo š.k.	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0278	1.0 l	168
Karate Zeon 5 CS	I	lambda-cihalotrīns	Syngenta Limited	0207	0.05 l	218
Kestac 50	I	alfa-cipermetrīns	BASF A/S	0251	0.1 l	220
Kliniks 360 š.k.	H	glifosāts	Nufarm GmbH & Co KG	0215	1.0 l	170
Lerāns š.k.	KBA	vara stearāts	SIA "Karaleks"	0240	0.3 kg	53
Menno Florades š.k.	F/ B/V	benzoscābe	Menno Chemie-Vestriebs GmbH	0254	30 l	43
Nimazals e.k.	I/A	azadiraktīns-A	Trifolio-M GmbH	0241	2.5 l	224
Nufarm MCPA 750 š.k.	H	MCPA	Nufarm GmbH & Co KG	0045	0.1 l	179, 180
Penncozeb 75 DG	F	mankocebs	Cerexagri S.A.	0273	1.0 kg	113
Penncozeb 80 WP	F	mankocebs	Cerexagri S.A.	0180	1.0 kg	114
Plantskids š.p.	R	žāvētu asiņu milti	SIA American Equipment & Supply	0274	1.0 kg	230
Previkurs E 840 š.k.	F	propamokarbs, fosetils	Bayer CropScience AG	0224	0.5 l	114
Raundaps Eko š.k.	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0173	1.0 l	183
Raundaps Klasiks š.k.	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0015	1.0 l	185
Reindžers š.k.	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0192	1.0 l	187
Ridomil Gold MZ 68 WG	F	mankocebs, metalaksils-M	Syngenta Crop Protection AG	0185	1.0 kg	117, 118
Rodeo š.k.	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0159	1.0 l	188
Roundup ACE	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0205	1.0 l	190
Roundup FL 540	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0268	1.0 l	190
Roundup Garden	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0369	0.28 l	191
Roundup Quick	H	glifosāts	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0370	1.0 l	191
Skuju pulveris SM 87	R	priedes un egles ēteriskās eļļas	A/S "BIOLAT"	0237	2.0 l	230
Sumi-alfa 5 e.k.	I	esfenvalerāts	Sumitomo Chemical Company Ltd.	0148	0.25 l	226
Taifūns B š.k.	H	glifosāts	Feinchemie Schwebda GmbH	0027	1.0 l	195
Tiovits 80 d.g.	F/A	sērs	Syngenta Crop Protection AG	0056	1.0 kg	130, 227
Timors e.k.	F	Austrālijas tējas koka eļļa	Biomor-Israel Ltd.	0233	1.0 l	130
Timorekss e.k.	F	Austrālijas tējas koka eļļa	Biomor-Israel Ltd.	0234	1.0 l	129
Timorekss d.š.	F	Austrālijas tējas koka eļļa	Biomor-Israel Ltd.	0235	1.0 l	129
Topāzs 100 e.k.	F	penkonazols	Syngenta Crop Protection AG	0009	0.1 l	131
Uragāns Sistem 4 š.k.	H	glifosāts	Syngenta Limited	0209	1.0 l	199
Vara vitriols k.v.	F	CuSO ₄ • 5H ₂ O	SIA "Karaleks"	0226	0.3 kg	132

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU DARBĪGĀS VIELAS**

Darbīgā viela	Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4
2.4-D	2.4-D Nufarm š.k.	600 g/l	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	55.3 %	153
	Estets 600 e.k.	600 g/l	154
	Mustangs Forte s.e.	180 g/l	177
2.4-D (etil-heksil estera formā)	Hussar Activ OD	377 g/l	167
	Mustangs s.e.	300 g/l	177
abamektīns	Vertimec 018 EC	18 g/l	227
aklonifēns	Fenix	600 g/l	155
alfa-cipermetrīns	AlfaStop 50 EC	50 g/l	202
	Fastac 50	50 g/l	211
	Golden Alpha 50 EC	50 g/l	215
	Kestac 50	50 g/l	220
alumīnija fosfīds	Fostoksīns tb.	56 %	214
ametoktradīns	Orvego	300 g/l	112
amidosulfurons	Grodils 75 d.g.	75 %	165
	Sekators 375 OD s.k.	100 g/l	192
aminopiralīds	Mustangs Forte s.e.	10 g/l	177
	Tombo d.g.	50 g/kg	197
amisulbroms	Leimay SC	200 g/l	103
amonija glufosināts	Basta	150 g/l	147
Austrālijas tējas koka eļļa	Timorekss d.š.	7 g/l	129
	Timorekss e.k.	660 g/l	129
	Timors e.k.	500 g/l	130
azadiraktīns-A	Nimazals e.k.	10 g/l	224
azoksistrobīns	Amistārs 250 s.k.	250 g/l	60
	Amistārs ekstra s.k.	200 g/l	62
	Amistārs Opti 480 s.k.	80 g/l	63
bentazons	Bazagrāns 480 š.k.	480 g/l	148
beta-ciflutrīns	Bulldoks 025 e.k.	25 g/l	205
benzoksābe	Menno Florades š.k.	90 g/l	43
bifenokss	Fox 480 SC	480 g/l	157
	Protugan Super	150 g/l	182
biksafēns	Zantara	50 g/l	135
boskalīds	Bell	233 g/l	69
	Bell Super OD	140 g/l	70
	Cantus	500 g/kg	73
	Efilor	133 g/l	83
	Signum d.g.	26.7 %	121
	Viverda OD	140 g/l	133
butil-fluazifops-P	Fusilade Forte 150 EC	150 g/l	157
ciazofamīds	Ranmans A s.k.	400 g/l	116
	Ranman Top	160 g/l	117
cikloksidīms	Fokuss Ultra e.k.	100 g/l	156
cipermetrīns	Ciperkils 250 e.k.	250 g/l	205
	Ciperkils 500 e.k.	500 g/l	206
ciprodinils	Akanto Prīma š.g.	300 g/kg	57
	Chorus 50 WG	500 g/kg	74
	Svičs 62.5 d.g.	375 g/kg	123
ciprokonazols	Amistārs ekstra s.k.	80 g/l	62
	Artea 330 e.k.	80 g/l	65
	Dividends Stārs 036 s.k.	6.25 g/l	47
	Maksims Stārs 025 s.k.	6.25 g/l	50
	Menara 410 EC	160 g/l	105

1	2	3	4
CuSO₄ · 5H₂O	Vara vitriols k.v.	98 %	132
deltametrīns	Decis 2.5 e.k.	25 g/l	208
	Decis Mega	50 g/l	209, 210
	K-Obiol	25 g/l	222
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	50 g/l	223
	Proteus OD	10 g/l	226
desmedifams	Betanal Expert	71 g/l	149
difenokonazols	Celest Trio 060 FS	25 g/l	46
	Dividends Stārs 036 s.k.	30 g/l	47
	Maksims ekstra 50 s.k.	25 g/l	50
	Skors 250 e.k.	250 g/l	122
	Taspa 500 EC	250 g/l	127
	Toprex 375 SC	250 g/l	41, 131
diflufenikans	Alister Grande OD	180 g/l	138
	Komplet	280 g/l	171
	Legacy 500 SC	500 g/l	171
	Legacy Pro	40 g/l	171
dihlorprops-P	Duplozāns Super š.k.	310 g/l	154
	Optika Trio š.k.	310 g/l	180
dikamba	Arrats d.g.	500 g/kg	140
	Banvels 4S š.k.	480 g/l	142
	Dicoherb Super 750 SL	90 g/l	152
	Lintūrs 70 d.g.	65.9 %	172
dikvāts	Diqua	200 g/l	42
	Reglons Super š.k.	150 g/l	42, 187
dimetahlors	Brasan 540 EC	500 g/l	149
	Teridox 500 EC	500 g/l	196
dimetoāts	Danadims 40 e.k.	400 g/l	47, 207
	Perfekts 500 S e.k.	500 g/l	225
dimetomorfs	Acrobat Plus	90 g/kg	54
	Orvego	225 g/l	112
dimoksistrobīns	Swing Gold	133 g/l	124
ditianons	Effector	700 g/kg	82
dzelzs (III) fosfāts	Ferramol	9.9 g/kg	228
	Sluxx	29.7 %	229
epoksikonazols	Adexar	62.5 g/l	55
	Allegro Super s.e.	83 g/l	58
	Bell	67 g/l	69
	Bell Super OD	50 g/l	70
	Ceriox	41.6 g/l	73
	Duets Ultra s.k.	187 g/l	80
	Epo Extra	50 g/l	84
	Epo Top e.k.	40 g/l	85
	Kapalo s.e.	62.5 g/l	101
	Maredo 125 SC	125 g/l	103
	Opera N	62.5 g/l	108
	Opus EC	83 g/l	109
	Opus s.k.	125 g/l	109
	Osiris	37.5 g/l	112
	Swing Gold	50 g/l	124
	Tango Flex	83 g/l	125
	Tango Super s.e.	84 g/l	126
	Viverda OD	50 g/l	133
esfenvalerāts	Sumi-alfa 5 e.k.	50 g/l	226
etefons	Cerone	480 g/l	37
	Golden Ethefon 480 SL	480 g/l	38
	Terpāls š.k.	155 g/l	41
etil-fenoksaprops-P	Foxtrot 69 EW	69 g/l	157
	Puma Universal	69 g/l	182

1	2	3	4
etil-kvizalofops-P	Targa Super	50 g/l	196
etil-trineksapaks	Golden Trinex 250 EC	250 g/l	39
	Moddus 250 EC	250 g/l	40
	Optimus	175 g/l	40
	Trimaxx	175 g/l	41
etofumezāts	Betanal Expert	112 g/l	149
	Nortrons 50 s.k.	500 g/l	178
FeSO₄ · 7H₂O	Dzelzs vitriols k.v.	96.5 %	81
fenamidons	Gloria	75 g/l	92
	Litagra Glorija 450 s.k.	75 g/l	103
fenmedifams	Betanal	160 g/l	148
	Betanal Expert	91 g/l	149
fenpropidīns	Archer Turbo 575 EC	450 g/l	64
	Epox Top e.k.	100 g/l	85
	Leander	750 g/l	102
fenpropimorfs	Allegro Super s.e.	317 g/l	58
	Kapalo s.e.	200 g/l	101
	Korbels e.k.	750 g/l	102
	Tango Super s.e.	250 g/l	126
fluazinams	Altima 500 s.k.	500 g/l	59
	Širlans 500 s.k.	500 g/l	124
florasulams	Axial One 50 EC	5 g/l	141
	Mustangs s.e.	6.25 g/l	177
	Mustangs Forte s.e.	5 g/l	177
	Primus XL	5 g/l	181
	Primuss s.k.	50 g/l	181
	Starane XL s.e.	2.5 g/l	193
	Tombo d.g.	25 g/kg	197
fludioksonils	Celest Trio 060 FS	25 g/l	46
	Cruiser OSR	8 g/l	46
	Maksims 025 s.k.	25 g/l	49
	Maksims ekstra 50 s.k.	25 g/l	50
	Maksims Stārs 025 s.k.	18.75 g/l	50
	Svičs 62.5 d.g.	250 g/kg	123
flufenacets	Komplet	280 g/l	171
fluksapiroksāds	Adexar	62.5 g/l	55
	Cerix	41.6 g/l	73
	Imbrex	62.5 g/l	93
flukvinkonazols	Vista 228 s.e.	54 g/l	132
flumioksazīns	Nozomi p.s.	500 g/kg	179
fluoksastrobīns	Bariton Ultra	112.5 g/l	45
	Fandango	100 g/l	87
fluopikolīds	Infinito	62.5 g/l	95, 96
fluroksipīrs	Ariane S	40 g/l	140
	GAT Stake 20 EC	200 g/l	158
	Primus XL	100 g/l	181
	Starane 180 e.k.	180 g/l	192
	Starane XL s.e.	100 g/l	193
	Tomigans 180 e.k.	180 g/l	197
flutriafols	Impakts 25 s.k.	250 g/l	95
	Impakts s.k.	125 g/l	94
	Vincits s.k.	25 g/l	52
folpets	Epox Extra	375 g/l	84
foramsulfurons	Maister OD	30 g/l	174
fosetils	Previkurs E 840 š.k.	310 g/l	114
fuberidazols	Baytan Universal	9 g/l	45

1	2	3	4
glifosāts	Amega š.k.	360 g/l	139
	Barbarian 360 š.k.	360 g/l	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	360 g/l	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	490 g/l	145
	Dalgis š.k.	360 g/l	152
	Dominators š.k.	360 g/l	153
	Glifogans 360 š.k.	360 g/l	159
	Glifomaks š.k.	360 g/l	159
	Glifomaks Plus š.k.	360 g/l	160
	Glifoss š.k.	360 g/l	161
	Glifoss Suprīm š.k.	450 g/l	161
	Glyphomax 480	480 g/l	162
	Kernels 480 š.k.	480 g/l	169
	Kliniks 360 š.k.	360 g/l	170
	MAC glifosāts 360 š.k.	360 g/l	174
	Jablo š.k.	360 g/l	168
	Raundaps Eko š.k.	360 g/l	183
	Raundaps FL 360 š.k.	360 g/l	184
	Raundaps Gold ST š.k.	450 g/l	184
	Raundaps Klasiks š.k.	360 g/l	185
	Raundaps Maks d.g.	68 %	186
	Reindžers š.k.	360 g/l	187
	Rodeo š.k.	360 g/l	188
	Rosate 36 š.k.	360 g/l	188
	Roundup ACE	450 g/l	190
	Roundup FL 540	540 g/l	190
	Roundup Garden	120 g/l	191
	Roundup Quick	7.2 g/l	191
	Symbol	360 g/l	194
	Taifūns B š.k.	360 g/l	195
	Uragāns Sistem 4 š.k.	360 g/l	199
hloridazons	Fiesta T	360 g/l	155
hlormekvāta hlorīds	CCC	750 g/l	37
	Cikocels 750 š.k.	750 g/l	38
	Stabilāns 750 š.k.	750 g/l	40
hlortalonils	Amistārs Opti 480 s.k.	400 g/l	63
hlortolurons	Legacy Pro	250 g/l	171
hlorprofams	Gro-Stop HN k.k.f.	300 g/l	39
hlorsulfurons	Glīns 75 d.g.	750 g/kg	162
imazalils	Baytan Universal	10 g/l	45
iprodions	Rovral Aqua Flo	500 g/l	52, 121
izoproturons	Arelons flussig s.k.	500 g/l	139
	Protugan Super	300 g/l	182
kalcija fosfīds	Polytanol	18 %	231
kalcija proheksadions	Medax Top	50 g/l	39
karboksīns	Kemikars T s.k.	200 g/l	48
	Vitavakss 200 FF s.k.	200 g/l	52
klomazons	Brasan 540 EC	40 g/l	149
	Kalif 360 CS	360 g/l	168
	Kalif Mega	33 g/l	169
	Lingo ZC	45 g/l	172
	Metric ZC	60 g/l	175
	Nimbus	33.3 g/l	178
klopīralīds	Ariane S	20 g/l	140
	Galera š.k.	267 g/l	158
	Golden Piccant 334 SL	267 g/l	163
	Hoder 720 SG	720 g/kg	166
	Lontrel 72 SG	720 g/kg	173
	Piccoli 334 SL	267 g/l	181
kvarca smiltis	Cervacol extra	251 g/kg	230
kvinmeraks	Butisan Star	83 g/l	150
	Fiesta T	60 g/l	155

1	2	3	4
lambda-cihalotrīns	Kaiso 50 EG	50 g/kg	217
	Karate Zeon 5 CS	50 g/l	218
	Karis 10 CS	100 g/l	219
linurons	Lingo ZC	250 g/l	172
	Nuflon	450 g/l	180
lufenurons	Match 50 EC	50 g/l	223
magnija fosfīds	Magtoksīns tb.	66 %	224
mandipropamīds	Revus 250 s.k.	250 g/l	117
mankocebs	Acrobat Plus	600 g/kg	54
	Dithane NT	750 g/kg	78
	Elektis 75 d.g.	667 g/kg	83
	Penncozeb 75 DG	75%	113
	Penncozeb 80 WP	80 %	114
	Ridomil Gold MZ 68 WG	64 %	117, 118
MCPA	Agroksons 75 š.k.	750 g/l	137
	Ariane S	200 g/l	140
	Ceridor MCPA 750 š.k.	750 g/l	151
	Chwastox 750 SL	750 g/l	151
	Dicoherb Super 750 SL	660 g/l	152
	Duplozāns Super š.k.	160 g/l	154
	MCPA 750	750 g/l	174
	MCPA Super 500 š.k.	500 g/l	175
	Nufarm MCPA 750 š.k.	750 g/l	179, 180
	Optika Trio š.k.	160 g/l	180
	U 46 M š.k.	750 g/l	199
MCPB	Butoksīns š.k.	400 g/l	150
mekoprops-P	Duplozāns Super š.k.	130 g/l	154
	Optika Trio š.k.	130 g/l	180
	Protugan Super	145 g/l	182
mepikvāta hlorīds	Medax Top	300 g/l	39
	Terpāls š.k.	305 g/l	41
metaflumizons	Alverde	240 g/l	205
metalaksīls-M	Cruiser OSR	32.3 g/l	46
	Ridomil Gold MZ 68 WG	4 %	117, 118
metamitrons	Goltiks 70 p.s.	700 g/kg	164
	Goltiks 700 s.k.	700 g/l	164
metazahlors	Butisan 400	400 g/l	150
	Butisan Star	333 g/l	150
	Golden Metaz 500 SC	500 g/l	163
	Kalif Mega	250 g/l	169
	Nimbus	250 g/l	178
	Sultāns 500 s.k.	500 g/l	194
metil-krezoksīms	Allegro Super s.e.	83 g/l	58
	Kandits d.g.	500 g/kg	100
metil-metsulfurons	Accurate 200 WG	200 g/kg	136
	Ergon	68 g/kg	154
	Mezzo d.g.	200 g/kg	176
	R-20	200 g/kg	182
metil-mezosulfurons	Alister Grande OD	6 g/l	138
metil-pirimifoss	Actellic 50 EC	50 %	202
metil-tifensulfurons	Harmonijs 50 š.g.	500 g/kg	166
	Ergon	682 g/kg	154
	Kalibre 50 š.g.	333 g/kg	168
metil-tiofanāts	Duets Ultra s.k.	310 g/l	80
metil-tribenurons	Granstars Prēmija 50 š.g.	500 g/kg	164
	Kalibre 50 š.g.	167 g/kg	168
	Nuance 75 WG	750 g/kg	179
	Trimmers 50 š.g.	500 g/kg	198
metiokarbs	Mesuroi	20 g/kg	228

1	2	3	4
metkonazols	Efilor	60 g/l	83
	Juventus 90 š.k.	90 g/l	39, 99
	Osiris	27.5 g/l	112
metrafenons	Fleksiti s.k.	300 g/l	90
	Kapalo s.e.	75 g/l	101
	Tango Flex	100 g/l	125
metribuzīns	Metric ZC	233 g/l	175
	Mistrāls 70 d.g.	700 g/kg	176
napropamīds	Devrinols s.k.	450 g/l	152
nātrija metil-jodosulfurons	Alister Grande OD	4.5 g/l	138
	Caliban Duo	10 g/kg	151
	Hussar Activ OD	10 g/l	167
	Maister OD	1 g/l	174
	Sekators 375 OD s.k.	25 g/l	192
Na-propoksikarbazons	Attribut	700 g/kg	140
	Caliban Duo	168 g/kg	151
nikosulfurons	Milagro 4 OD	40 g/l	176
	Milagro Extra 6 OD	60 g/l	176
	Nicogan	40 g/l	178
	Niklos 40 SC	40 g/l	178
paklobutrazols	Toprex 375 SC	125 g/l	41, 131
pendimetalīns	Activus 330 EC	330 g/l	137
	Flaits s.k.	330 g/l	156
	Flight Forte	320 g/l	156
	Legacy Pro	300 g/l	171
	Stomps e.k.	330 g/l	193
penkonazols	Topāzs 100 e.k.	100 g/l	131
piklorams	Galera š.k.	67 g/l	158
	Golden Piccant 334 SL	67 g/l	163
	Piccoli 334 SL	67 g/l	181
pikolīnafēns	Flaits s.k.	7.5 g/l	156
	Flight Forte	16 g/l	156
pimetrozīns	Plenum 50 WG	500 g/kg	226
pinoksadēns	Aksials 50 e.k.	50 g/l	138
	Axial One 50 EC	45 g/l	141
pikoksistrobīns	Akanto 250 s.k.	250 g/l	56
	Akanto Prima š.g.	80 g/kg	57
piraklostrobīns	Cerix	66.6 g/l	73
	Comet	250 g/l	75
	Comet Pro	200 g/l	76
	Opera N	85.0 g/l	108
	Signum d.g.	6.7 %	121
	Viverda OD	60 g/l	133
piridāts	Lentagrāns 45 p.s.	450 g/kg	171
piroksulams	Tombo d.g.	50 g/kg	197
priedes un egles skuju ekstrakti	Ausma š.k.	20%	37
ekstrakti un maisījums	Fitoekols IF 40 s.k.	40%	89, 213
	Fitoekols IF	2%	89, 213
priedes un egles ēteriskās eļļas	Skuju pulveris SM 87	> 0.05%	230
prohlorazs	Bampers Super e.k.	400 g/l	67
	Mirāža 45 e.k.	450 g/l	105
	Sportak EW	450 g/l	123
	Vista 228 s.e.	174 g/l	132
	Zamirs 400 e.ū.	267 g/l	134
prohloraza vara hlorīds	Kinto s.k.	60 g/l	48
propakvizafops	Ažils 100 e.k.	100 g/l	141
propamokarbs	Gloria	314.1 g/l	92
	Infinito	523.8 g/l	95, 96
	Litagra Glorija 450 s.k.	314.1 g/l	103
	Previkurs E 840 š.k.	530 g/l	114

1	2	3	4
propikonazols	Archer Turbo 575 EC	125 g/l	64
	Artea 330 e.k.	250 g/l	65
	Bampers 25 e.k.	250 g/l	66
	Bampers Super e.k.	90 g/l	67
	Barclay Bolt XL	250 g/l	68
	Golden Propiconazol 250 EC	250 g/l	93
	Menara 410 EC	250 g/l	105
	Taspa 500 EC	250 g/l	127
	Tilts 250 e.k.	250 g/l	128
prosulfokarbs	Bokseris 800 e.k.	800 g/l	149
protiokonazols	Bariton Ultra	112.5 g/l	45
	Falcon Forte	53 g/l	86
	Fandango	100 g/l	87
	Input	160 g/l	97
	Lamardor	250 g/l	49
	Prosaro	125 g/l	115
	Tilmor	80 g/l	127
rimulfurons	Titus 25 d.g.	250 g/kg	197
sērs	Tiovits 80 d.g.	80 %	130, 227
spiroksamīns	Falkons 460 e.k.	250 g/l	86
	Falcon Forte	224 g/l	86
	Input	300 g/l	97
sulfosulfurons	Monitors d.g.	75 %	177
tebukonazols	Celest Trio 060 FS	10 g/l	46
	Čambels s.k.	60 g/l	47
	Falkons 460 e.k.	167 g/l	86
	Falcon Forte	148 g/l	86
	Folikūrs 250 e.ū.	250 g/l	90
	Lamardor	150 g/l	49
	Mystic	250 g/l	106
	Orius 250 e.ū.	250 g/l	111
	Prosaro	125 g/l	115
	Raksils Ekstra 515 š.k.	15 g/l	51
	Riza 250 e.ū.	250 g/l	119
	Tilmor	160 g/l	127
	Zamirs 400 e.ū.	133 g/l	134
	Zantara	166 g/l	135
tefuril-kvizalofops-P	Pantēra 4 e.k.	40 g/l	181
tiabendazols	Vincits s.k.	25 g/l	52
tiakloprīds	Proteus OD	100 g/l	226
tiametoksams	Actara 25 WG	250 g/kg	200, 201
	Cruiser OSR	280 g/l	46
tirāms	Kemikars T s.k.	200 g/l	48
	Raksils Ekstra 515 š.k.	500 g/l	51
	Vitavakss 200 FF s.k.	200 g/l	52
tralkoksidīms	Grasps 400 s.k.	400 g/l	165
triadimenols	Baytan Universal	75 g/l	45
	Falkons 460 e.k.	43 g/l	86
triasulfurons	Lintūrs 70 d.g.	4.1 %	172
	Logrāns 20 d.g.	200 g/kg	172
tritikonazols	Kinto s.k.	20 g/l	48
	Premis 25 s.k.	25 g/l	51
tritosulfurons	Arrats d.g.	250 g/kg	140
	Tooler	714 g/kg	198
vara hidroksīds	Čempions 50 p.s.	77 %	76
	Fungurāns OH 300 s.k.	487 g/l	92
vara stearāts	Lerāns š.k.	4%	53
vara vitriols + kaļķis =	Bordo maisījums	attiecība 1: 1.5	71, 72
kompleksais vara savienojums	Bordo maisījums	attiecība 1:1	71, 72
zeta-cipermetrīns	Fury 100 EW	100 g/l	214
zoksamīds	Elektis 75 d.g.	83 g/kg	83
žāvētu asiņu milti	Plantkids š.p.	99%	230

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE MIKROBIOLOĢISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrācijas klase	Aktīvās sastāvdaļas nosaukums	Aktīvās sastāvdaļas saturs	Reģistrācijas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Rotstop SC	Verdera Oy	0401	3	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	$2 \times 10^6 - 10^7$ k.v.v./g	30.04.2019.	232
Rotstops p.s.	Verdera Oy	0295	3	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	$2 \times 10^6 - 10^7$ k.v.v./g	20.03.2017.	232

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE DZĪVOS ORGANISMUS SATUROŠIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrācijas klase	Aktīvās sastāvdaļas nosaukums	Reģistrācijas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Afidends	Koppert B.V.	0124	3	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	02.04.2018.	233
Afidiuss	IK "Ciklaneda BS"	0064	3	<i>Aphidius colemani</i>	09.04.2016.	233
Amblyseiuss	IK "Ciklaneda BS"	0063	3	<i>Amblyseius cucumeris</i>	09.04.2016.	233
Enkarsija	IK "Ciklaneda BS"	0061	3	<i>Encarsia formosa</i>	09.04.2016.	233
Enstrips	Koppert B.V.	0125	3	<i>Encarsia formosa</i>	02.04.2018.	233
Entomits	Koppert B.V.	0142	3	<i>Hypoaspis aculeifer</i>	16.12.2018.	234
Fitosējuluss	IK "Ciklaneda BS"	0060	3	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	09.04.2016.	234
Minekss	Koppert B.V.	0126	3	<i>Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea</i>	02.04.2018.	234
Mirikals	Koppert B.V.	0127	3	<i>Macrolophus caliginosus</i>	02.04.2018.	234
Pangodiņš	IK "Ciklaneda BS"	0062	3	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	09.04.2016.	235
Spidekss	Koppert B.V.	0128	3	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	02.04.2018.	235
Trihogramma	SIA "Bioefekts"	0143	3	<i>Trichogramma embryophagum</i>	16.12.2018.	235
Tripekss (Tripekss pluss)	Koppert B.V.	0129	3	<i>Amblyseius cucumeris</i>	02.04.2018.	236

IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PARALĒLAJAI TIRDZNIECĪBAI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Atļaujas īpašnieks	Atļaujas Nr.	Reģistrācijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Atļauja derīga no	Atļaujas derīguma termiņš	Identiskais Latvijas Repub- likā reģistrētais augu aizsardzības līdzeklis		Lpp.
									Nosau- kums	Reģistrā- cijas Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AlfaStop 50 EC	I	ProEuro Sp z.o.o	11.	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	27.03.2012.	21.02.2015.	Fastac 50	0250	202
Golden Alpha 50 EC	I	Goldengrass Ltd	5.	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	22.06.2012.	21.02.2015.	Fastac 50	0250	215
Golden Ethefon 480 SL	AR	Goldengrass Ltd	6.	2	etefons	480 g/l	24.02.2012.	02.04.2018.	Cerone	0122	38
Golden Metaz 500 SC	H	Goldengrass Ltd	7.	2	metazahloris	500 g/l	22.06.2012.	26.11.2014.	Sultāns 50 s.k.	0245	163
Golden Piccant 334 SL	H	Goldengrass Ltd	8.	2	klopīralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	22.06.2012.	05.05.2018.	Galera s.k.	0313	163
Golden Propiconazol 250 EC	F	Goldengrass Ltd	9.	2	propikonazols	250 g/l	22.06.2012.	22.10.2018.	Bampers 25 s.k.	0133	93
Golden Trinex 250 EC	AR	Goldengrass Ltd	10.	2	etil-trineksapaks	250 g/l	07.08.2012.	30.04.2017.	Moddus 250 EC	0183	39
Hoder 720 SG	H	ProEuro Sp z.o.o	13.	2	klopīralīds	720 g/kg	12.04.2012.	30.04.2017.	Lontrel 72 SG	0388	166
Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"	15.	3	deltametrīns	50 g/l	19.07.2012.	17.12.2017.	Decis Mega	0310	223
Litagra Glorija 450 s.k.	F	UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"	2.	3	fenamidons propamokarbs	75 g/l 314.1 g/l	26.05.2009.	15.11.2013.	Gloria	0213	103
MAC glifosāts 360 š.k.	H	MAC GmbH	3.	2	glifosāts	360 g/l	14.01.2010.	06.07.2015.	Raundaps Klasiks š.k.	0015	174
Niklos 40 SC	H	ProEuro Sp z.o.o	14.	2	nikosulfurons	40 g/l	03.05.2012.	21.06.2014.	Milagro 4 s.k.	0223	178
Piccoli 334 SL	H	ProEuro Sp z.o.o	12.	2	klopīralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	27.03.2012.	05.05.2018.	Galera š.k.	0313	181
R-20	H	Advagro Ltd	16.	2	metil-metsulfurons	200 g/kg	21.11.2012.	05.01.2019.	Mezzo d.g.	0322	182

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS, KURIEM 2012. GADĀ IZMAINĪTS NOSAUKUMS

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Reģ. Nr.	Reģistrācijas īpašnieks	Augu aizsardzības līdzekļa jaunais nosaukums	Lpp.
1	2	3	4	5
Betanāls 160 s.e.	0291	Bayer CropScience AG	Betanal	148
Fuzilāds Forte 150 e.k.	0182	Syngenta Crop Protection AG	Fusilade Forte 150 EC	157
Huzārs Aktīvs OD 417 s.k.	0311	Bayer CropScience AG	Hussar Aktiv OD	167
Komēta e.k.	0198	BASF A/S	Comet	75
Moduss 250 e.k.	0183	Syngenta Crop Protection AG	Moddus 250 EC	40
Pikona s.k.	0293	BASF A/S	Flight Forte	156

1	2	3	4	5
Raundaps 540 š.k.	0268	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	Roundup FL 540	190
Raundaps Gold š.k.	0205	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	Roundup ACE	190
Ridomils Gold MC 68 d.g.	0185	Syngenta Crop Protection AG	Ridomil Gold MZ 68 WG	117, 118
Sportaks 45 e.ū.	0008	BASF A/S	Sportak EW	123
Sultāns 50 s.k.	0245	Makhteshim-Agan Holland B.V.	Sultāns 500 s.k.	194

2011. un 2012. GADĀ AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ ANULĒTIE IERAKSTI ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrā- cijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arčers Top 400 e.k.	F	Syngenta Crop Protection AG	0203	2	fenpropidīns propikonazols	275 g/l 125 g/l	30.06.2013.	30.06.2014.
Folpans 80 d.g.*	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0297	2	folpets	80 %	–	30.03.2013.
Kruizers 70 p.s.	K	Syngenta Crop Protection AG	0201	2	tiametoksams	700 g/kg	–	–
Lontrels 300 š.k.*	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0033	2	klopīralīds	300 g/l	–	20.06.2013.
Opera s.e.	F	BASF A/S	0189	2	piraklostrobīns epoksikonazols	133 g/l 50 g/l	–	07.08.2013.
Previkurs 607 š.k.*	F	Bayer CropScience AG	0030	2/3	propamokarbs	607 g/l	–	30.03.2013.
Pyramin Turbo	H	BASF A/S	0066	2	Hloridazons	520 g/l	30.06.2013.	30.06.2014.
Sfēra 267.5 e.k.*	F	Bayer CropScience AG	0210	2	ciprokonazols trifloksistrobīns	80.0 g/l 187.5 g/l	–	30.05.2013.
Tānos 50 d.g.	F	DuPont Finland Ltd.	0194	2/3	famoksadons cimoksanils	250 g/kg 250 g/kg	–	23.10.2013.
Tātū 550 s.k.*	F	Bayer CropScience AG	0092	2/3	propamokarbs mankocebs	207.7 g/l 301.6 g/l	–	30.03.2013.
Zenkors 70 d.g.*	H	Bayer CropScience AG	0242	2	metribuzīns	700 g/kg	–	30.03.2013.

* 2011. gadā anulētie augu aizsardzības līdzekļi

2011. un 2012. GADĀ ANULĒTĀS ATĻAUJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PARALĒLAJAI TIRDZNIECĪBAI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Atļaujas īpašnieks	Atļaujas Nr.	Reģistrā- cijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izplatīšanas un izlieto- šanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
1	2	3	4	5	6	7	8	
Litagra Infinito 687.5 s.k.	F	UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"	4.	3	fluopikolīds propamokarbs	62.5 g/l 523.8 g/l	01.03.2013.	01.03.2014.
Litagra Previkurs 607 š.k.*	F	UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"	1.	3	propamokarbs	607 g/l	–	30.03.2013.

* 2011. gadā anulētais augu aizsardzības līdzeklis

2010. GADĀ ANULĒTIE IERAKSTI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ

AUGU VAI DZĪVNIEKU VALSTS IZCELSMES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrācijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EkoFits e.k.	I	IU"Dārza Apgāds"	0230	3	piretrīni ekstrahēti no <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	1.5 g/l 950 g/l	31.12.2014.	237
EkoFits d.š.	I	IU"Dārza Apgāds"	0231	3	piretrīni ekstrahēti no <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	0.0015 % 2 %	31.12.2014.	237
Silgards 20 s.k.	K	IU"Dārza Apgāds"	0229	3	Austrālijas tējas koka eļļa priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums	200 g/l 800 g/l	31.12.2014.	238

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KAS SATUR SADZĪVĒ IZMANTOJAMAS VIELAS

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģistrācijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sērs p.	F/A	SIA "Bioefekts"	0246	3	sērs	90 %	31.12.2014.	238
Zaļās ziepes e.k.	I	SIA "Bioefekts"	0247	3	tauskābju kālija sāls	12 %	31.12.2014.	239

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS ATSEVIŠKĀS KULTŪRĀS NEDRĪKST LIETOT TUVĀK PAR 40 M
NO ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Frāze AAL marķējuma tekstā	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Decis Mega*	I	Bayer CropScience AG	0310	2	deltametrīns	50 g/l	17.12.2017.	“SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”	209, 210
Dithane NT	F	Indofil Industries Limited	0017	2/3	mankocebs	750 g/kg	30.06.2016.	“Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”	78

* Augu aizsardzības līdzekļi, kam jāpiemēro gan 40 m aizsargjosla, gan jāievēro drošības pasākumi bitēm

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS NEDRĪKST LIETOT TUVĀK PAR 20 M
NO ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr./ Atļaujas Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Altima 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0176	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2019.	59
Archer Turbo 575 EC	F	Syngenta Crop Protection AG	0407	2	propikonazols fenpropidīns	125 g/l 450 g/l	31.01.2017.	64
Arelons flussig s.k.	H	Stähler International GmbH & Co. KG	0329	2	izoproturons	500 g/l	31.12.2018.	139
Bokseris 800 e.k.	H	Syngenta Crop Protection AG	0271	2	prosulfokarbs	800 g/l	18.05.2016.	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brasan 540 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	09.11.2018.	149
Butisan Star	H	BASF A/S	0258	2	metazahlor kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	10.10.2015.	150
Ciperkils 250 e.k.^B	I	Agriphar S.A.	0307	2	cipermetrīns	250 g/l	27.01.2018.	205
Ciperkils 500 e.k.^{B, ***}	I	Agriphar S.A.	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	08.02.2020.	206
Decis 2.5 e.k.^B	I	Bayer CropScience AG	0020	3	deltametrīns	25 g/l	10.10.2015.	208
Epox Top e.k.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0389	2	epoksikonazols fenpropidīns	40 g/l 100 g/l	10.01.2022.	85
Falcon Forte	F	Bayer CropScience AG	0343	2	protiokonazols spiroksamīns tebukonazols	53 g/l 224 g/l 148 g/l	17.12.2019.	86
Fenix	H	Bayer CropScience AG	0283	2/3	aklonifēns	600 g/l	28.12.2016.	155
Flaits s.k.	H	BASF A/S	0292	2	pendimetalīns pikolīnafēns	330 g/l 7.5 g/l	13.03.2017.	156
Flight Forte	H	BASF A/S	0293	2	pendimetalīns pikolīnafēns	320 g/l 16 g/l	13.03.2017.	156
Gloria	F	Bayer CropScience AG	0213	2/3	fenamidons propamokarbs	75 g/l 314.1 g/l	15.11.2013.	92
Kaiso 50 EG^B	I	Nufarm GmbH & Co KG	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	09.11.2021.	217
Karate Zeon 5 CS^B	I	Syngenta Limited	0207	2/3	lambda-cihalotrīns	50 g/l	25.04.2013.	218
Leander	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0397	2	fenpropidīns	750 g/l	31.12.2018.	102
Litagra Glorija 450 s.k.	F	UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"	2.	3	fenamidons propamokarbs	75 g/l 314.1 g/l	15.11.2013.	103
Mistrāls 70 d.g.^{*****}	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	30.09.2017.	176
Signum d.g.^{**}	F	BASF A/S	0269	2	piraklostrobīns boskalīds	6.7 % 26.7 %	31.05.2014.	121
Stomps e.k.	H	BASF A/S	0007	2	pendimetalīns	330 g/l	21.02.2015.	193
Sumi-alfa 5 e.k.^{B, ****}	I	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0148	2/3	esfenvalerāts	50 g/l	31.12.2015.	226
Širlans 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0177	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2019.	124
Teridox 500 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0051	2	dimetahlors	500 g/l	22.02.2016.	196
Vertimec 018 EC^B	A/I	Syngenta Crop Protection AG	0296	2	abamektīns	18 g/l	17.04.2017.	227
Viverda OD	F	BASF A/S	0384	2	boskalīds piraklostrobīns epoksikonazols	140 g/l 60 g/l 50 g/l	21.11.2021.	133

^B Augu aizsardzības līdzekļi, kam jāpiemēro gan 20 m aizsargjosla, gan jāievēro drošības pasākumi bitēm

^{**} Ķiršu un plūmju stādījumos nelietot tuvāk par 20 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

^{***} Krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

^{****} Rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos un krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

^{*****} Kartupeļu stādījumos nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS NEDRĪKST LIETOT TUVĀK PAR 12 / 14 / 15 / 16 VAI 25 M
NO ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nedrīkst lietot tuvāk par 12 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm								
Dithane NT	F	Indofil Industries Limited	0017	2/3	mankocebs	750 g/kg	30.06.2016.	78
Frāze AAL marķējuma tekstā	“Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”.							
Nedrīkst lietot tuvāk par 14 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm								
Sumi-alfa 5 e.k.	I	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.	0148	2	esfenvalerāts	50 g/l	31.12.2015.	226
Frāze AAL marķējuma tekstā	“Spe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu , rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos, un krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”							
Nedrīkst lietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm								
Chorus 50 WG	F	Syngenta Crop Protection AG	0339	2	ciprodinils	500 g/kg	28.10.2019.	74
Frāze AAL marķējuma tekstā	“Spe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”							
Legacy Pro	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0415	2	diflufenikans pendimetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	31.12.2019.	171
Frāze AAL marķējuma tekstā	“Spe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”							
Nedrīkst lietot tuvāk par 16 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm								
Comet Pro	F	BASF A/S	0354	2	piraklostrobīns	200 g/l	21.07.2020.	76
Frāze AAL marķējuma tekstā	“Spe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”							
Nedrīkst lietot tuvāk par 25 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm								
Karis 10 CS	I	GAT Microencapsulation AG	0391	2	lambda-cihalotrīns	100 g/l	10.03.2015.	219
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe 3. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”							

CITI LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arelons flussig s.k.	H	Stähler International GmbH & Co. KG	0329	2	izoproturons	500 g/l	31.12.2018.	139
Frāze AAL markējuma tekstā	“SPE 2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, / nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnes, kurās augsnes organisko vielu saturs ir <1%/ nelietot augsnes ar māla saturu ≥30%/ nelietot drenētās augsnes.”							
Komplet	H	Bayer CropScience AG	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	31.12.2018.	171
Frāze AAL markējuma tekstā	“SPE 3. Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi virs 2% un virszemes ūdeņiem, ievērot 12 m ar augiem blīvi apaugušu aizsargjoslu”.							
Mesurool	Lim	Bayer CropScience AG	0378	2	metiokarbs	20 g/kg	31.12.2021.	228
Frāze AAL markējuma tekstā	“SPE 2. Nelietot drenētās platībās laikā no 1.novembra līdz 15.martam.” “SPE 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi virs 2% un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.”							

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURI IR KAITĪGI BITĒM

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Pasākumi bišu aizsardzībai	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Actara 25 WG	I	Syngenta Crop Protection AG	0167	2/3	tiametoksams	250 g/kg	①	200, 201
AlfaStop 50 EC	I	ProEuro Sp z.o.o	11.*	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	①; R	202
Bulldoks 025 e.k.	I	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0090	2	beta-ciflutrīns	25 g/l	①; R	205
Ciperkils 250 e.k.	I	Agriphar S.A.	0307	2	cipermetrīns	250 g/l	①; R	205
Ciperkils 500 e.k.	I	Agriphar S.A.	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	①; R	206
Danadims 40 e.k.	I/A	Cheminova A/S	0211	2	dimetoāts	400 g/l	①; ②	47, 207
Decis 2.5 e.k.	I	Bayer CropScience AG	0020	3	deltametrīns	25 g/l	①; R	208
Decis Mega	I	Bayer CropScience AG	0310	2/3	deltametrīns	50 g/l	①; R	209, 210
Fastac 50	I	BASF A/S	0250	2/3	alfa-cipermetrīns	50 g/l	①; R	211
Fury 100 EW	I	FMC Chemical, sprl	0256	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	①; R	214
Golden Alpha 50 EC	I	Goldengrass Ltd	5.*	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	①; R	215
Kaiso 50 EG	I	Nufarm GmbH & Co KG	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	①; R	217
Karate Zeon 5 CS	I	Syngenta Limited	0207	2/3	lambda-cihalotrīns	50 g/l	①; R	218
Karis 10 CS	I	GAT Microencapsulation AG	0391	2	lambda-cihalotrīns	100 g/l	①; R	219
Kestac 50	I	BASF A/S	0251	2/3	alfa-cipermetrīns	50 g/l	①; R	220
Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	UAB “Litagros Prekyba” filiāle “Litagra Latvija”	15.*	3	deltametrīns	50 g/l	①	223

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perfekts 500 S e.k.	I/A	BASF A/S	0212	2	dimetoāts	500 g/l	①; ②	225
Plenum 50 WG	I	Syngenta Crop Protection AG	0382	2	pimetrozīns	500 g/kg	①; R	226
Proteus OD	I	Bayer CropScience AG	0275	2	tiakloprīds deltametrīns	100 g/l 10 g/l	①	226
Sumi-alfa 5 e.k.	I	Sumimoto Chemical Company Ltd.	0148	2/3	esfenvalerāts	50 g/l	①; R	226
Vertimec 018 EC	A/I	Syngenta Crop Protection AG	0296	2	abamektīns	18 g/l	①	227

① – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie bišu aizsardzības pasākumi;

② – AAL lietotājs trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes ar šo līdzekli brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādes vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanas noteiktajā kārtībā.

R – Augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts arī lietojumam rapsī

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS LIETOJOT, IR JĀIEVĒRO AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BLAKUSKULTŪRĀM
UN CITIEM AR LIETOJUMU NESAISTĪTIEM ORGANISMIEM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Aizsardzības pasākumi	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Accurate 200 WG	H	Cheminova A/S	0342	2	metil-metsulfurons	200 g/kg	31.12.2015.	A	136
Actara 25 WG	I	Syngenta Crop Protection AG	0167	2/3	tiametoksams	250 g/kg	31.01.2017.	K	200, 201
Activus 330 EC	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0341	2	pendimetalīns	330 g/l	31.12.2013.	A	137
Alister Grande OD	H	Bayer CropScience AG	0315	2	Nātrija metil-jodosulfurons metil-mezosulfurons diflufenikans	4,5 g/l 6 g/l 180 g/l	12.10.2018.	A	138
Arelons flussig s.k.	H	Stähler International GmbH & Co. KG	0329	2	izoproturons	500 g/l	31.12.2018.	A	139
Ariane S	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0188	2	fluoksipīrs klopiralīds MCPA	40 g/l 20 g/l 200 g/l	30.04.2017.	A	140
Axial One 50 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0371	2	pinoksadēns florasulams	45 g/l 5 g/l	13.07.2014.	A	141
Betanal Expert	H	Bayer CropScience AG	0350	2	desmedifams fenmedifams etofumezāts	71 g/l 91 g/l 112 g/l	25.02.2019.	A	149
Brasan 540 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0320	2	dimetahlor klofazons	500 g/l 40 g/l	09.11.2018.	A	149
Butoksions š.k.	H	Nufarm Limited	0138	2	MCPB	400 g/l	16.12.2018.	A	150
Caliban Duo	H	Stähler International GmbH & Co. KG	0360	2	Na propoksi-karbazons Na metil-jodosulfurons	168 g/kg 10 g/kg	31.12.2018.	A	151
Chwastox 750 SL	H	Zakłady Chemiczne "Organika Sarzyna" S.A.	0376	2	MCPA	750 g/l	08.02.2020.	A	151
Čambels s.k.	K	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0309	2	tebukonazols	60 g/l	27.04.2018.	P	47
Decis Mega	I	Bayer CropScience AG	0310	2/3	deltametrīns	50 g/l	17.12.2017.	K	209, 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dicoherb Super 750 SL	H	Nufarm GmbH & Co KG	0390	2	MCPA dikamba	660 g/l 90 g/l	30.04.2016.	A	152
Efilor	F	BASF A/S	0372	2	boskalīds metkonazols	133 g/l 60 g/l	02.11.2021.	A	83
Elektis 75 d.g.	F	Gowan Comércio International e Serviços, Limitada	0179	2	zoksamīds mankocebs	83 g/kg 667 g/kg	31.03.2014.	K	83
Epox Top e.k.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0389	2	epoksikonazols fenpropidīns	40 g/l 100 g/l	10.01.2022.	A	85
Ergon	H	Rotam Agrochemical Europe Limited	0357	2	metil-metsulfurons metil-tifensulfurons	68 g/kg 682 g/kg	01.04.2020.	A	154
Estets 600 e.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0305	2	2,4-D	600 g/l	14.11.2017.	A	154
Foxtrot 69 EW	H	Cheminova A/S	0408	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	31.12.2018	A	157
GAT Stake 20 EC	H	GAT Microencapsulation AG	0392	2	fluoroksipīrs	200 g/l	26.05.2015.	A	158
Fusilade Forte 150 EC	H	Syngenta Limited	0182	2	butil-fluazifops-P	150 g/l	31.12.2015.	A	157
Golden Metaz 500 SC	H	Goldengrass Ltd	7.*	2	metazahlors	500 g/l	26.11.2014.	A	163
Goltiks 700 s.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0155	2	metamitrons	700 g/l	31.08.2019.	A	164
Hussar Activ OD	H	Bayer CropScience AG	0311	2	nātrija metil-jodosulfurons 2,4-D 2-etilheksil esteris	10 g/l 377 g/l	27.03.2018.	A	167
Kaiso 50 EG	I	Nufarm GmbH & Co KG	0381	2	lambda cihalotrīns	50 g/kg	09.11.2021.	K	217
Kalibre 50 š.g.	H	Du Pont Finland Ltd.	0301	2	metil-tifensulfurons metil-tribenurons	333 g/kg 167 g/kg	14.06.2017.	A	168
Kalif 360 CS	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0409	2	klomazons	360 g/l	31.10.2018.	A	168
Kalif Mega	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0410	2	klomazons metazahlors	33 g/l 250 g/l	31.10.2018	K	169
Karis 10 CS	I	GAT Microencapsulation AG	0391	2	lambda-cihalotrīns	100 g/l	10.03.2015.	K	219
Komplet	H	Bayer CropScience AG	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	31.12.2018.	A	171
Legacy Pro	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0415	2	diflufenikans pendimetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	31.12.2019.	A	171
Lentagrāns 45 p.s.	H	Belchim Crop Protection NV	0330	2	piridāts	450 g/kg	31.12.2015.	A	171
Lingo ZC	H	Belchim Crop Protection NV	0358	2	klomazons linurons	45 g/l 250 g/l	22.11.2020.	A	172
Lontrel 72 SG	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0388	2	klopiralīds	720 g/kg	30.04.2017.	A	173
Maister OD	H	Bayer CropScience AG	0326	2	foramsulfurons nātrija metil-jodosulfurons	30 g/l 1 g/l	10.03.2019.	A	174
Maredo 125 SC	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0373	2	epoksikonazols	125 g/l	15.05.2021.	A	103
Mesurol	Lim	Bayer CropScience AG	0378	2	metiokarbs	20 g/kg	31.12.2021.	P, K	228
Metric ZC	H	Belchim Crop Protection NV	0344	2	metribuzīns klomazons	233 g/l 60 g/l	30.09.2017.	A	175
Milagro 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2018.	A	176
Milagro Extra 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	13.12.2020.	A	176

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mistrāls 70 d.g.	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	30.09.2017.	A	176
Mustangs Forte s.e.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0334	2	florasulams aminopiralīds 2.4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l	31.07.2013.	A	177
Mystic	F	Nufarm GmbH & Co KG	0362	2	tebukonazols	250 g/l	22.12.2020.	A	106
Nicogan	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0413	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2018	A	178
Nimbus	H	BASF A/S	0328	2	metazahlors klomazons	250 g/l 33.3 g/l	23.03.2019.	A	178
Nuance 75 WG	H	Cheminova A/S	0403	2	metil-tribenurons	750 g/kg	28.02.2016.	A	179
Nuflon	H	Belchim Crop Protection NV	0366	2	linurons	450 g/l	21.03.2021.	A	180
Opus EC	F	BASF A/S	0367	2	epoksikonazols	83 g/l	28.03.2021.	A	109
Polytanol	Ro	Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG	0363	2	kalcijs fosfīds	18 %	21.12.2020.	P	231
Protugan Super	H	Feinchemie Schwebda GmbH	0414	2	izoproturons bifenokss mekoprops-P	300 g/l 150 g/l 145 g/l	31.12.2015.	A, K	182
Puma Universal	H	Bayer CropScience AG	0131	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	04.05.2018.	A	182
Stomps e.k.	H	BASF A/S	0007	2	pendimetalīns	330 g/l	21.02.2015.	A	193
Sultāns 500 s.k.	H	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0245	2	metazahlors	500 g/l	26.11.2014.	A	194
Sumi-alfa 5 e.k.	I	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.	0148	2	esfenvalerāts	50 g/l	31.12.2015.	K	226
Targa Super	H	Bayer CropScience AG	0383	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	31.12.2016.	A	196
Tombo d.g.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0335	2	piroksulams florasulams aminopiralīds	50 g/kg 25 g/kg 50 g/kg	31.07.2013.	A	197
Zamirs 400 e.ū.	F	Makhteshim-Agan Holland B.V.	0314	2	tebukonazols prohlorazs	133 g/l 267 g/l	16.07.2018.	K	134
Zantara	F	Bayer CropScience AG	0374	2	biksafēns tebukonazols	50 g/l 166 g/l	12.05.2014.	A	135

A – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie aizsardzības pasākumi ar lietojumu nesaistītiem augiem un citiem kultūraugiem;

P – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie aizsardzības pasākumi putniem;

K – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie aizsardzības pasākumi ar lietojumu nesaistītiem kukaiņiem/posmkājiem.

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOJUMI

AUGU AUGŠANAS REGULATORI

Apstrādājamā kultūra	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6

1. Ausma š.k.

Reģ. Nr. 0236, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 20 %.

Augu augšanas stimulators.

A/S "BIOLAT"

Sēklas, sīpoli, gumi, spraudēņi		2	Mērcēt sēklas, sīpolus, gumus un spraudēņus pirms sējas vai stādīšanas 24 stundas	–	1
Dārzeni, krāšņumaugi, kokaugi		0.15–0.20	Apliet augus pirmo reizi pēc sadīgšanas, augu augšanas un ziedēšanas veicināšanai. Atkārtoti apliet ik pēc 15–20 dienām. Darba šķidruma patēriņš 1 l/m ²	–	5
		0.15–0.20	Apliet augus stādīšanas laikā ieaugšanās un apsākšanās veicināšanai. Darba šķidruma patēriņš 1 l/m ²	–	1

2. CCC

Reģ. Nr. 0147, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.

Pretveldres preparāts.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši un tritikāle	1.0 –1.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, cerošanas stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Drikt apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju	–	1
Vasaras kvieši	0.3–1.0 atkarībā no šķirnes			–	1
Rudzi	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, cerošanas stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Drikt apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju	–	1
Mieži	0.6			–	1
Auzas	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu mezglu stadiju līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	–	1

3. Cerone

Reģ. Nr. 0122, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.

Pretveldres preparāts.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši	0.50–0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz pēdējās lapas maksts uzbrīšanas stadijai (AS 37–45)	42	1
Tritikāle	1.0			42	1
Ziemas rudzi	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 37–49)	42	1
Vasaras mieži	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no otrā mezgla līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	42	1
Ziemas mieži	0.75 – 1.00			42	1

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4. Cikocels 750 š.k.

Reģ. Nr. 0096, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.

Pretveldres preparāts.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.5–1.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī kultūrauga cerošanas fāzē līdz stiebrošanas sākumam (AS 21–30)	–	1
Rudzi	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī kultūrauga cerošanas fāzē līdz divu mezglu stadijai (AS 21–32)	–	1
Tritikāle	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes vidus līdz stiebrošanas sākumam (AS 25–30)	–	1
Auzas	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga divu mezglu stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai (AS 32–47)	–	1

5. Folikūrs 250 e.ū.

Reģ. Nr. 0057, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Bayer CropScience AG

Ziemas rapsis	0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī 5–6 lapu attīstības stadijā (AS 15–16)	56	1
	0.75		Apsmidzināt sējumus rudenī 7–8 lapu attīstības stadijā (AS 17–18)		
	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)		
Vasaras rapsis	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)	56	1

6. Golden Ethefon 480 SL

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 6, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.

Pretveldres preparāts.

Goldengrass Ltd

Ziemas kvieši	0.50–0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 37–45)	42	1
Tritikāle	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 37–49)	42	1
Ziemas rudzi	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no otrā mezgla līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	42	1
Vasaras mieži	0.5			42	1
Ziemas mieži	0.75–1.00			42	1

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

7. Golden Trinex 250 EC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 10, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Pretveldres preparāts.

Goldengrass Ltd

Ziema kvieši	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37)	–	1
Vasaras kvieši	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	–	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cirošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37)	–	1
Tritikāle, rudzi	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33–39)	–	1
Auzas	0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30–32)	–	1

8. Gro-Stop HN k.k.f.

Reģ. Nr. 0222, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: hlorprofams, 300 g/l.

Augu augšanas regulators.

Certis Europe B. V.

Kartupeļi (pārstrādei)	0.02–0.03 l/t		<u>1. lietošanas variants</u> Izmiglot ar speciālu iekārtu tieši kartupeļu glabāšanas telpā, 2–4 nedēļas pēc kartupeļu iepildīšanas glabātuvē, ar intervālu 4–6 nedēļas, pirms asnu parādīšanās kartupeļu bumbulēm	28	2
	0.06 l/t		<u>2. lietošanas variants</u> Izmiglot ar speciālu iekārtu tieši kartupeļu glabāšanas telpā, 2–4 nedēļas pēc kartupeļu iepildīšanas glabātuvē pirms asnu parādīšanās kartupeļu bumbulēm	28	1

9. Juventus 90 š.k.

Reģ. Nr. 0221, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.

Augu augšanas regulators.

BASF A/S

Ziema rapsis, vasaras rapsis	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)	56	1
------------------------------	---------	--	--	----	---

10. Medax Top

Reģ. Nr. 0347, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: kalcijs proheksadions, 50 g/l,

mepikvāta hlorīds, 300 g/l.

Augu augšanas regulators.

BASF A/S

Ziema kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
--	----------	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

11. Moddus 250 EC

Reģ. Nr. 0183, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37)	–	1
Vasaras kvieši	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	–	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37)	–	1
Tritikāle, rudzi	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33–39)	–	1
Auzas	0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30–32)	–	1

12. Optimus

Reģ. Nr. 0399, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.

Augu augšanas regulators.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši	0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37)	–	1
Vasaras kvieši	0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	–	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.3–0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37)	–	1

13. Stabilāns 750 š.k.

Reģ. Nr. 0287, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.

Pretveldres preparāts.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši un tritikāle	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, cerošanas stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Driest apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju	–	1
Vasaras kvieši	0.3–1.0 atkarībā no šķirnes			–	1
Rudzi	1.5–2.0			–	1
Mieži	0.6			–	1
Auzas	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu mezglu stadiju līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	–	1

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

14. Terpāls š.k.

Reģ. Nr. 0144, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds, 305 g/l,
etefons, 155 g/l.

Pretveldres preparāts.

BASF A/S

Rudzi	1.0 –1.5		Apsmidzināt sējumus graudaugu 2 mezglu stadijā līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	–	1
Mieži, ziemas kvieši	0.5 –1.5				

15. Toprex 375 SC

Reģ. Nr. 0400, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 250 g/l,
paklobutrazols, 125 g/l.

Augu augšanas regulators.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas rapsis	0.3		Apsmidzināt sējumus rudenī, rapša četru lapu līdz sešu lapu stadijā (AS 14–16)	–	1
	0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā starpmezglu posma attīstības līdz stadijai, kad starp lapām redzami ziedpumpuri (AS 31–50)	100	1

16. Trimaxx

Reģ. Nr. 0398, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.

Augu augšanas regulators.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši	0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37)	–	1
Vasaras kvieši	0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	–	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.3–0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37)	–	1

DESIKANTI

Apstrādājamā kultūra	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6

1. Diqua

Reģ. Nr. 0338, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dikvāts, 200 g/l.

Sharda Europe b.v.b.a.

Kartupeļi	4.0		Apsmidzināt stādījumus bumbuļu veidošanās perioda beigās	14	1
Rapsis	3.0		Apsmidzināt sējumus, kad sēklas nogatavojušās	7	1
Zirņi	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus, kad sēklas nogatavojušās	10	1
Pupas (lopbarībai)	3.0		Apsmidzināt sējumus, kad sēklas nogatavojušās	7	1
Mieži, auzas (lopbarībai)	2.0-4.0		Apsmidzināt veldrē sakritušus sējumus graudu pilngatavības stadijā	7	1
Baltais āboliņš, sarkanais āboliņš (sēklu lauki)	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus, kad sēklas nogatavojušās	3	1
Lini	3.0		Apsmidzināt sējumus, kad sēklas nogatavojušās	20	1

2. Reglons Super š.k.

Reģ. Nr. 0087, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dikvāts, 150 g/l.

Syngenta Limited

Kartupeļi	2.0-4.0		Apsmidzināt stādījumus bumbuļu veidošanās perioda beigās	14	1
Mieži, auzas (lopbarībai)	2.0		Apsmidzināt nezālainus saveldrētus kultūraugu sējumus, graudaugu pilngatavības stadijā	7	1
Kāpostu sēklinieki	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus sēklu bioloģiskās gatavības sākumā,	8	1
Burkānu sēklinieki	2.5-3.0		kad sēklu mitrums mazāks par 50%	8	1
Lopbarības biešu sēklinieki	4.0-6.0		Apsmidzināt stādījumus, kad nogatavojušies 20-40% sēklu	8	1
Cukurbiešu sēklinieki	5.0-10.0		kamoliņu	8	1
Lopbarības pupas	4.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, kad apakšējās pākstis dzeltē (sēklu nabiņa melna)	7	1
Āboliņa sēklinieki	2.0-4.0		Apsmidzināt sējumus, kad nobrūnējuši 75-80% galviņu	5	1
Rapsis, lini	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus, kad nogatavojušās sēklas	7	1
Lupīna	2.0-4.0			10	1
Eļļas lini	2.0-3.0			20	1
Zirņi	2.0			7	1

DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Ieteicamā darba šķidruma konc. %	Ekspozīcijas laiks	Apstrādes veids, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās
1	2	3	4	5	6

1. Menno Florades š.k.

Reģ. Nr. 0254, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: benzoscābe, 90 g/l.

Baktericīds, fungicīds, viricīds, viroicīds.

Menno Chemie-Vertrieb GmbH

Virsmas	Virusi: ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV	1	16 h	Salaistīt apstrādājamo virsmu pēc rūpīgas tās notīrīšanas. Darba šķidruma patēriņš – cietas virsmas 0.2 l/m ² , ūdeni uzsūcošas virsmas – 2 l/m ²	–
	Virusi: ORSV, CyMV, PepMV	2	16 h		
	Virusi: TMV, ToMV	4	16 h		
	Sēnes: <i>Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhizopus etc</i> Baktērijas: <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia</i> ; (dekoratīvajā dārzkopībā)	1	16 h		
	Sēnes: <i>Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhizopus etc</i> Baktērijas: <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia</i> ; (dārzenkopībā/sēņkopībā)	2	16 h		
Podi, tara	Virusi: ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV	1	16 h	Mērcēt darba šķidrumā	–
	Virusi: ORSV, CyMV, PepMV	2	16 h		
	Virusi: TMV, ToMV	4	16 h		
	Sēnes: <i>Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhizopus etc</i> Baktērijas: <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia</i> ; (dekoratīvajā dārzkopībā)	1	16 h		
	Sēnes: <i>Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhizopus etc</i> Baktērijas: <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia</i> ; (dārzenkopībā/sēņkopībā)	2	16 h		
	Baktērijas: Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensis</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Ralstonia solanacearum</i>) Sēnes: Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>), (augkopībā/kartupeļu noliktavās)	2	4 h		

1	2	3	4	5	6
Naži, darbarīki	Vīrusi: ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV3	2	3 min.	Iemērkot darba šķīdumā	—
	Vīrusi: ORSV, CyMV, PepMV	3	3 min.		
	Vīrusi: TMV, ToMV	3	3 min.		
	Sēnes: <i>Pythium</i> , <i>Botrytis</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Cylindrocladium</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Mucor</i> , <i>Thielaviopsis</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Rhizopus</i> etc Baktērijas: <i>Xanthomonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Erwinia</i> , <i>Clavibacter</i> , <i>Ralstonia</i> ; (dekoratīvajā dārzkopībā)	1	3 min.		
	Sēnes: <i>Pythium</i> , <i>Botrytis</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Cylindrocladium</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Mucor</i> , <i>Thielaviopsis</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Rhizopus</i> etc Baktērijas: <i>Xanthomonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Erwinia</i> , <i>Clavibacter</i> , <i>Ralstonia</i> ; (dārzenkopībā/sēņkopībā)	2	3 min.		
	Baktērijas: Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensi</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Ralstonia solanacearum</i>) Sēnes: Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melns kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>), (augkopībā/kartupeļu noliktavās)	2	3 min.		
	Vīroīdi: (PSTYd, CSVd)	1	3 min		
Kartupeļu noliktava (grīda, sienas, ventilēšanas kanāli), konteineri, iekraušanas iekārtas, lauksaimniecības tehnika	Baktērijas: Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensi</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Ralstonia solanacearum</i>) Sēnes: Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melns kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2	4h	Apsmidzināt apstrādājamo virsmu. Darba šķīduma patēriņš 0.6-0.8 l/m ²	—

KODNES

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/t	Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, l/t	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
1	2	3	4	5

1. Baytan Universal

Reģ. Nr. 0220, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: imazalils, 10 g/l,
fuberidazols, 9 g/l,
triadimenols, 75 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	3.0–4.0	5.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	3.0–4.0	5.0–10.0	
Tritikāle	Labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	3.0–4.0	5.0–10.0	
Ziemas mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	3.0–4.0	5.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

2. Bariton Ultra

Reģ. Nr. 0336, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluoksastrobīns, 112.5 g/l,
protiokonazols, 112.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), melnie graudi (<i>Claviceps purpurea</i>)	0.5	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), melnie graudi (<i>Claviceps purpurea</i>)	0.5	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), melnie graudi (<i>Claviceps purpurea</i>)	0.5	6.0–10.0	Kodina sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Celest Trio 060 FS

Reģ. Nr. 0380, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fludioksonils, 25 g/l,
difenokonazols, 25 g/l,
tebukonazols, 10 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), kviešu pundurmelnplauka (<i>Tilletia controversa</i>)	2.0	6–10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>)	2.0	6–10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	2.0	6–10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>)	1.5	5.5–9.5	Kodināt sēklas pirms sējas

4. Cruiser OSR

Reģ. Nr. 0195, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tiametoksams, 280.0 g/l,
fludioksonils, 8.0 g/l,
metalaksils-M, 32.3 g/l.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas un vasaras rapsis	<u>Kaitēkļi:</u> Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Psylliodes chrysocephala</i>) <u>Slimības:</u> Neistā miltresa (<i>Peronospora parasitica</i>), dīgstu puve (<i>Pythium spp.</i>), krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), melnkāja (<i>Rhizoctonia solani</i>)	12.0–15.0	Lieto neatšķaidītu suspensijas koncentrātu	Kodināt sēklas pirms sējas
Kartupeļi	<u>Kaitēkļi:</u> Sprakšķu kāpuri (<i>Elateridae</i>), maijvaboļu kāpuri (<i>Melolontha melolontha</i>), kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphididea</i>), cikādes (<i>Cicadinea</i>)	0.15	2.0–5.0	Kodināt stādāmo materiālu īsi pirms izstādīšanas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. Čambels s.k.

Reģ. Nr. 0309, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 60 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>Fusarium graminearum</i>)	0.5	5.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>)	0.5	5.5	Kodināt sēklas pirms sējas

6. Danadims 40 e.k.

Reģ. Nr. 0211, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetoāts, 400 g/l.

Sistēmas, pieskares un zarnu indes iedarbība.

Cheminova A/S

Sīpolpuķes	Sakņu ērces (<i>Rhizoglyphus echinopus</i>), narcīšu lielā ziedmuša (<i>Lampetia equestris</i>), sīpolu ziedu muša (<i>Eumerus strigatus</i>)	–	–	Sīpolus pirms izstādīšanas uz 15 minūtēm iemērc 0.1 % šķīdumā
------------	---	---	---	---

7. Dividends Stārs 036 s.k.

Reģ. Nr. 0193, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 30.00 g/l,
ciprokonazols, 6.25 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Vasaras kvieši	Kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries/foetida</i>), graudaugu sakņu puve (<i>Fusarium culmorum</i>), tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.0–1.5	5.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas un vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), graudaugu sakņu puve (<i>Fusarium culmorum</i>), tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>)	1.5	5.0–10.0	
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>), auzu cietā melnplauka (<i>Ustilago laevis</i>), graudaugu sakņu puve (<i>Fusarium culmorum</i>), tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>)	1.5	5.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

8. Kemikars T s.k.

Reģ. Nr. 0158, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: karboksīns, 200 g/l,
tirāms, 200 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Cietā melnplauka (<i>Tilletia spp.</i>), putošā melnplauka (<i>Ustilago spp.</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Cochliobolus sativus</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sēklu pelējums (<i>Alternaria spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)	2.5–3.0	7.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Lini	Linu iedegas (<i>Colletotrichum lini</i>)	1.5–2.0	3.0–5.0	

9. Kinto s.k.

Reģ. Nr. 0262, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tritikonazols, 20 g/l,
prohloraza vara hlorīds, 60 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.5–2.0	1.5–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>), auzu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. Lamardor

Reģ. Nr. 0303, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tebukonazols, 150 g/l,
protiokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	0.15	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	0.2	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

11. Maksims 025 s.k.

Reģ. Nr. 0089, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	1.5–2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Mieži	Miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	1.5–2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	1.5–2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Zirņi	Zirņu iedegas (<i>Ascochyta spp.</i>), zirņu sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5–2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Kartupeļi	Melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>), sudrabotais kraupis (<i>Helminthosporium solani</i>), fuzarioze, sausā puve (<i>Fusarium spp.</i>), fomoze (<i>Phoma exigua</i>), paugurainais kraupis (<i>Polyscytalum pustulans</i>), parastais kraupis (<i>Streptomyces scabies</i>)	0.2	2.0–5.0	Apstrādāt stādīšanai paredzētos bumbuļus pavasarī pirms stādīšanas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

12. Maksims ekstra 50 s.k.

Reģ. Nr. 0272, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 25 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia contraversa</i> , <i>Tilletia foetida</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0–1.5	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>)	1.0–1.5	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu cietā melnplauka (<i>Ustilago kolleri</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0–1.5	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas

13. Maksims Stārs 025 s.k.

Reģ. Nr. 0150, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fludioksonils, 18.75 g/l,
ciprokonazols, 6.25 g/l.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas un vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	1.0–1.5	4.0–7.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Mieži	Miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), graudaugu sakņu puve (<i>Fusarium culmorum</i>)	1.5–2.0	3.5–7.0	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

14. Premis 25 s.k.

Reg. Nr. 0153, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tritikonazols, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas un vasaras kvieši, rudzi, mieži, auzas, tritikāle	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>), graudaugu sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.5–2.0	–	Apstrādāt graudaugu sēklas pirms sējas ar neatšķaidītu kodni vai arī to atšķaidīt šādi: 1.0 l preparātam pievienot 2.0–4.0 l ūdens
--	---	---------	---	--

15. Raksils Ekstra 515 š.k.

Reg. Nr. 0208, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tebukonazols, 15 g/l,

tirāms, 500 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	2.0	6.0–10.0	
Tritikāle	Labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	2.0	6.0–10.0	
Ziemas mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

16. Rovral Aqua Flo

Reģ. Nr. 0332, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: iprodions, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

BASF A/S

Vasaras rapsis, ziemas rapsis, galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles kāposti, brokoļi	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i>), krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	5.0	Lieto neatšķaidītu suspensijas koncentrātu	Kodināt sēklas pirms sējas
Kartupeļi (sēklas)	Melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.2	2	Kodināt kartupeļu stādāmo materiālu pirms stādīšanas

17. Vincits s.k.

Reģ. Nr. 0106, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: flutriafols, 25 g/l,
tiabendazols, 25 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	2.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>)	2.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>), auzu cietā melnplauka (<i>Ustilago laevis</i>)	2.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

18. Vitavakss 200 FF s.k.

Reģ. Nr. 0043, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: karboksīns, 200 g/l,
tirāms, 200 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Cietā melnplauka (<i>Tilletia spp.</i>), putošā melnplauka (<i>Ustilago spp.</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Cochliobolus sativus</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sēklu pelējums (<i>Alternaria spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)	2.5–3.0	7.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Lini	Linu iedegas (<i>Colletotrichum lini</i>)	1.5–2.0	3.0–5.0	

KOKU BRŪČU AIZSARGLĪDZEKĻI

Apstrādājamā kultūra	Lietošanas mērķis	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogai- dišanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5

1. Lerāns š.k.

Reģ. Nr. 0240, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: vara stearāts, 4 %.

Koku brūču aizsarglīdzeklis.

SIA "Karaleks"

Augļu koki	Aizsargāt augļu kokus no inficēšanās ar sēnīšu, bakteriālajām un vīrusu slimībām caur brūcēm, kuras radušās sala, dzīvnieku bojājumu vai zaru apgriešanas rezultātā. Lietojams arī brūču apstrādei, kuras radušās izgriežot augļu koku vēzi	Apstrādāt svaigus griezumus vai mizas bojājuma vietas, uzklājot šķidruma koncentrātu uz brūces	–	1
------------	---	--	---	---

FUNGICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1.1. Acrobat Plus

Reģ. Nr. 0156, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetomorfs, 90 g/kg,
mankocebs, 600 g/kg.

Pieskares un lokāla sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, vai pirms lakstu sakļaušanās vagās. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4
Sīpoli, ķiploki	Sīpolu neīstā milttrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai pēc brīdinājuma par sagaidāmo slimības parādīšanos līdz sīpola bumbulis sasniedzis >50% no vēlamā izmēra un sakņu kakls ir pilnībā izveidojies (AS 46). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām	14	3

1.2. Acrobat Plus

Reģ. Nr. 0156, reģ. klase 3., iepakojumi 1.0 kg un mazāki.

Darbīgās vielas: dimetomorfs, 90 g/kg,
mankocebs, 600 g/kg.

Pieskares un lokāla sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	20		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, vai pirms lakstu sakļaušanās vagās. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 250 m ²	7	4

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli, ķiploki	Sīpolu neistā miltrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	20		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai pēc brīdinājuma par sagaidāmo slimības parādīšanos līdz sīpola bumbulis sasniedzis >50% no vēlamā izmēra un sakņu kakls ir pilnībā izveidojies (AS 46). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 250 m ²	14	3

2. Adexar

Reģ. Nr. 0404, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 62.5 g/l,
epoksikonazols, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>) kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>) graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

3. Akanto 250 s.k.

Reģ. Nr. 0308, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pikoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

DuPont Finland Ltd.

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.25–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1 l/ha	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.25–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1 l/ha	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.25–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1 l/ha	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.25–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1 l/ha	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.25–0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz pilnziedam (AS 60–65)	56	1

4. Akanto Prīma š.g.

Reģ. Nr. 0340, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pikoksistrobīns, 80 g/kg,
ciprodinils, 300 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

DuPont Finland Ltd.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādo- ties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graud- augu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	45	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), vārpu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1.5 kg/ha		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	45	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parā- doties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graud- augu stiebrošanas sākuma līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1.5 kg/ha		
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parā- doties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graud- augu stiebrošanas sākuma līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1.5 kg/ha	45	2

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	45	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1.5 kg/ha		
Tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	45	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), vārpu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65). Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 1.5 kg/ha		

5. Allegro Super s.e.

Reģ. Nr. 0270, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-krezoksims, 83 g/l,
epoksikonazols, 83 g/l,
fenpropimorfs, 317 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75–1.50		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 30–55)	35	2
		0.75 + 0.75–1.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (30–37) 2. reizi, sākot no kultūrauga attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 39–55)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi, tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75–1.50		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 30–55)	35	2
		0.75+ 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (30–37) 2. reizi, sākot no kultūrauga attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 39–55)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5–1.0 vai 0.5+0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas sākumam (AS 30–51)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas sākumam (AS 30–51)	35	2

6. Altima 500 s.k.

Reģ. Nr. 0176, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

Neliotot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

ISK Biosciences Europe N.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
-----------	--	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
7. Amistārs 250 s.k. Reģ. Nr. 0187, reģ. klase 2. Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l. Sistēmas iedarbība. Syngenta Limited						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīkplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	2
Rudzi, tritikāle	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), neīstā miltasas (<i>Peronospora brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5–0.75		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	37	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.75		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no rapša ziedēšanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60% ziedu (AS 60–65)		
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi	Kāpostu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>), krustziežu neīstā miltasas (<i>Peronospora parasitica</i>), krustziežu īstā miltasas (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), krustziežu baltkreves (<i>Albugo candida</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus parādīties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no kultūrauga galviņas veidošanās sākuma (AS 41)	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti	Kāpostu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>), krustziežu neistā miltāsa (<i>Peronospora parasitica</i>), krustziežu istā miltāsa (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), krustziežu baltkreves (<i>Albugo candida</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	21	2
Selerijas sakņu, selerijas kātu	Seleriju lapu gaišplankumainība (<i>Septoria apicola</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	14	2
Burkāni	Burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>), čēmurziežu istā miltāsa (<i>Erysiphe heraclei</i>), burkānu lapu brūnplankumainība (<i>Cercospora carotae</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	10	2
Sīpoli	Sīpolu neistā miltāsa (<i>Peronospora destructor</i>), sīpolu kakla puve (<i>Botryotinia squamosa</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādotes pirmajām slimības pazīmēm	14	2
Puravi	Sīpolu rūsa (<i>Puccinia allii</i>), melns sodrējums (<i>Cladosporium allii</i>), lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	21	2
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)	Gurķu neistā miltāsa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.08	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādotes pirmajām slimības pazīmēm	3	2
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)	Ķirbjaugu istā miltāsa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), kvēpainā miltāsa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		0.08	Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm		
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)		0.1	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādotes pirmajām slimības pazīmēm	3	2
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu istā miltāsa (<i>Oidium lycopersici</i>), tomātu lapu brūnais pelējums (<i>Cladosporium fulvum</i>), tomātu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.1	Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm		
Skuju koki kokaudzētavās	Skujbire (<i>Lophodermium spp.</i>)	0.8–1.0	0.1	Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām	–	2
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Lapu koki kokaudzētavās	Rūsas (<i>Puccinia spp.</i>), bērzu tumšbrūnā plankumainība (<i>Marssonina betulae</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), istā milttrasa (<i>Erysiphe spp.</i>), iedegas (<i>Colletotrichum spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>)	0.8–1.0	0.1	Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām	–	2
Krāšņumaugi	Rūsas (<i>Puccinia spp.</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), istā milttrasa (<i>Erysiphe spp.</i>), iedegas (<i>Colletotrichum spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>)	0.8–1.0	0.1	Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām	–	2
Zāliens, zāliens golfa laukumā	Fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt zālienu rudēni profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 10–14 dienām	–	2

8. Amistārs ekstra s.k.

Reģ. Nr. 0219, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 200 g/l,
ciprokonazols, 80 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāju milttrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia strii- formis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>), vārpu fuzariozes (<i>Fusarium spp.</i>)	0.5–1.0		<u>1. lietošanas variants:</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	45	1
		0.4+0.4		<u>2. lietošanas variants:</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm: 1. reizi, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39) 2. reizi, sākot no kultūrauga vārpošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 51–59)	45	2
Vasaras mieži	Graudzāju milttrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	0.50–0.80		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	45	1

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.50–0.80		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	45	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), neistā miltrasa (<i>Peronospora brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5–0.75		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	37	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no rapša ziedēšanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60 % ziedu (AS 60–65)		

9. Amistārs Opti 480 s.k.

Reģ. Nr. 0325, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 80 g/l,
hlortalonils, 400 g/l.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5–2.0		<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	45	2
		1.0+1.0		<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39) 2.reizi, sākot no vārpošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 51–59)		
Rudzi	Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	45	2

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	45	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas sākumam (AS 29–51)	45	1

10. Archer Turbo 575 EC

Reģ. Nr. 0407, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propikonazols, 125 g/l,
fenpropidīns, 450 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	42	2
		1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga trīs mezglu stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 33–65)		
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 29–65)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	42	2
		1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga trīs mezglu stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 33–65)		
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 29–65)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 29–65)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	42	2
		1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga trīs mezglu stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 33–65)		
	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 29–65)		

11. Artea 330 e.k.

Reģ. Nr. 0169, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propikonazols, 250 g/l,
ciprokonazols, 80 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), graudzāļu baltplankumainība (<i>Ascochyta spp.</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3–5 nedēļām, ja slimību risks turpinās vai parādās jaunas slimības	42	2
Vasaras mieži, ziemas mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu baltplankumainība (<i>Ascochyta spp.</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas sākumam (AS 29–51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3–5 nedēļām, ja slimību risks turpinās vai parādās jaunas slimības	42	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.25–0.35		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimību pirmajām pazīmēm, maisījumā ar piemērotu preparātu (AS 29–32)	42	1
Cukurbietes	Biešu miltresa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu sarmplankumainība (<i>Ramularia betae</i>), biešu rūsa (<i>Uromyces betae</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	30	2

12. Bampers 25 e.k.

Reģ. Nr. 0133, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: propikonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

13. Bampers Super e.k.

Reģ. Nr. 0217, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propikonazols, 90 g/l,
prohlorazs, 400 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B. V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	42	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporium herbarum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām AS (29 –59)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	42	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporium herbarum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	42	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām AS(29–59)		

1	2	3	4	5	6	7
Cukurbietes	Biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu sarmplankumainība (<i>Ramularia betae</i>), biešu joslainā plankumainība (<i>Phoma betae</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	42	2

14. Barclay Bolt XL

Reģ. Nr. 0379, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: propikonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Barclay Chemicals (R&D) Limited

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	2
Stiebrzāles (lopbarībai)	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm	28	1
Stiebrzāles (sēklai)	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm sēklu ievākšanas gadā	35	2

1	2	3	4	5	6	7
15. Bell						
Reģ. Nr. 0290, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: boskalīds, 233 g/l,						
epoksikonazols, 67 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
BASF A/S						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		
		0.75 + 0.75		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (30–37) 2. reizi, sākot no kultūrauga attīstītas karoglapas stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 39–61)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		
Tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplanku- mainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2

16. Bell Super OD

Reģ. Nr. 0377, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 140 g/l,
epoksikonazols, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)	35	2

17. Bordo maisījums

Reģ. Nr. 0257, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: vara kompleksais savienojums ($[Ca(OH)_2]_3 \cdot CuSO_4$ (vara vitriols + kaļķis)).

Pieskares iedarbība.

SIA “Cēlarāji”

Ābeles, bumbieres	Kraupis (<i>Venturia spp.</i>), augļu puves (<i>Monilia spp.</i>)		1.0–3.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms lapu plaukšanas	–	1
Ābeles, bumbieres	Kraupis (<i>Venturia spp.</i>), augļu puves (<i>Monilia spp.</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	15	4
Jānogas, ērkšķogas, upenes, avenes	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), lapu sīkplankumainība (<i>Mycosphaerella ribis</i>)		1.0–3.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms lapu plaukšanas	–	1
Jānogas, ērkšķogas, upenes, avenes	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), lapu sīkplankumainība (<i>Mycosphaerella ribis</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	25	3
Zemenes	Zemeņu lapu baltplankumainība (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt lapu ataugšanas laikā un pēc ražas novākšanas	–	2

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	15	3
Tomāti	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>), tomātu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	8	3
Gurķi	Gurķu neistā miltasas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	8	3
Krāšņumaugi	Lapu plankumainības (<i>Marssonina spp.</i>), neistās miltasas (<i>Peronospora spp.</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	–	3

18. Bordo maisījums

Reģ. Nr. 0227, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: vara kompleksais savienojums ($[Ca(OH)_2]_3 \cdot CuSO_4$ (vara vitriols + kaļķis)).

Pieskares iedarbība.

SLA “Karaleks”

Ābeles, bumbieres	Kraupis (<i>Venturia spp.</i>), augļu puves (<i>Monilia spp.</i>)		1.0–3.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms lapu plaukšanas	–	1
	Kraupis (<i>Venturia spp.</i>), augļu puves (<i>Monilia spp.</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	15	4
Plūmes, ķirši	Kauleņkoku sausplankumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>), ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapi</i>), augļu puves (<i>Monilia spp.</i>)		1.0–3.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms lapu plaukšanas	–	1
Plūmes, ķirši	Kauleņkoku sausplankumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>), ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapi</i>), augļu puves (<i>Monilia spp.</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	15	4
Jānogas, ērkšķogas, upenes, avenas	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>)		1.0–3.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms lapu plaukšanas	–	1
	lapu sikplankumainība (<i>Mycosphaerella ribis</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm	25	3
Zemenes	Zemeņu lapu baltplankumainība (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt lapu ataugšanas laikā un pēc ražas novākšanas	–	2

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt veģetācijas periodā profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm	15	3
Tomāti	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>), tomātu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.5–1.0		8	3
Gurķi	Gurķu neistā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.5–1.0		8	3
Krāšņumaugi	Lapu plankumainības (<i>Marssonina spp.</i>), neistās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i>)		0.5–1.0		–	3

19. Cantus

Reģ. Nr. 0280, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša agrā ziedēšanas stadijā līdz pilnas ziedēšanas stadijā, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60 % ziedu (AS 63–65)	56	1
-------------------------------	--	-----	--	--	----	---

20. Ceriax

Reģ. Nr. 0405, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 41.6 g/l,

epoksikonazols, 41.6 g/l,

piraklostrobīns, 66.6 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
-------------------------------	--	---------	--	---	----	---



1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2

21. Chorus 50 WG

Reģ. Nr. 0339, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ciprodinils, 500 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Syngenta Crop Protection AG

Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	0.3–0.45		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūrauga peļausu stadijas (AS 55). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	7	3
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	0.45		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūrauga peļausu stadijas (AS 55). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	7	3

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši	Kaulenķoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>)	0.45		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	7	3
Plūmes	Augļu puves (<i>Monilinia spp.</i>)	0.45		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	14	3

22. Comet

Reģ. Nr. 0198, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piraklostrobīns, 250 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga attīstītas karoglapas stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 39–61)	35	2
Rudzi, tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0			35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnplankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga attīstītas karoglapas stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 39–61)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.0			35	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

23. Comet Pro

Reģ. Nr. 0354, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piraklostrobīns, 200 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 16 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2

24. Čempions 50 p.s.

Reģ. Nr. 0139, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: vara hidroksīds, 77 %.

Fungicīds, baktericīds.

Pieskares iedarbība.

Nufarm GmbH&Co KG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lakstu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus pēc apstrādes ar sistēmas iedarbības fungicīdu, atkārtoti pēc 7–10 dienām	7	3
Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	3.0–4.5	0.50–0.75	Apsmidzināt stādījumus pavasarī pirms kraupja asku sporu izlidošanas (no pumpuru briešanas līdz “peļautiņu” stadijai)	–	1
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>)	3.0–4.5	0.50–0.75		–	1
Ābeles, bumbieres	Augļu koku stumbru un zaru vēzis (<i>Nectria galligena</i>), bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas spp.</i>)	10–13	0.3–0.5	Apsmidzināt augļu kokus rudenī pēc lapu nobiršanas vai pavasarī miera periodā pēc zaru apgriešanas līdz zaļā konusa stadijai	–	1
	Ābeļu un bumbieru stumbru un zaru iedegas (<i>Cryptosporiopsis curvispora</i>)				–	1
	Sakņu kakla puve (<i>Phytophthora spp.</i>)		0.5	Kokaudzētavās aplaistīt augļu kociņu stumbru pamatni	–	1



1	2	3	4	5	6	7
Ķirši, plūmes, aprikozes	Kauleņkoku sausplankumainība (<i>Stigmia carpophila</i>), kauleņkoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>)	3.0–4.5		Apsmidzināt stādījumus agri pavasarī pirms ziedēšanas	–	1
	Bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas spp.</i>)	13		Apsmidzināt stādījumus rudenī pēc lapu nobiršanas	–	1
Lazdas	Bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas spp.</i>)	13		Apsmidzināt stādījumus pavasarī no pumpuru briešanas līdz lapu plaukšanai vai rudenī pēc ražas novākšanas vai lapbires laikā	–	1
Upenes, jānogas, ērkšķogas	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), lapu sīkplankumainība (<i>Mycosphaerella ribis</i>)	3.0–4.5		Apsmidzināt stādījumus pavasarī pirms lapu plaukšanas vai rudenī pēc ražas novākšanas	–	1
Avenes, kazenes	Avenāju mizas plaisāšana (<i>Didymella applanata</i>), avenāju iedegas (<i>Elsinoe veneta</i>)	3.0–4.5			–	1
Dzērvenes	Ogu puves: melnās puves (<i>Allantophomopsis cytispora</i> , <i>Allantophomopsis lycopodina</i> , <i>Strasseria geniculata</i>), riņķveida puve (<i>Godronia cassandrae</i>), ogu agrā puve (<i>Botryosphaeria vaccinii</i> , <i>Phyllosticta vaccinii</i>), ogu cietā puve (<i>Monilinia oxycocci</i>), ogu rūgtā puve (<i>Glomerella cingulata</i>)	3.0–4.5		Apsmidzināt stādījumus pēc ziedēšanas, atkārtoti pēc nedēļas	–	2
Krūmmellenes	Bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas spp.</i>)	3.0–4.5		Apsmidzināt stādījumus vēlu rudenī	–	1
Vīnogas	Vīnkoku istā miltrasa (<i>Uncinula necator</i>), neistā miltrasa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus pavasarī, sākot no pumpuru plaukšanas līdz ziedēšanai, atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Apiņi	Neistā miltrasa (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus pavasarī pēc apgriešanas, pirms uzsiešanas, atkārtoti pēc 10 dienām	–	2
Krāšņumaugi siltumnīcās: filodendroni, arālijas	Lapu plankumainības (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Cercospora spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7–14 dienām	–	2
Acālijas	Lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), sakņu puve (<i>Phytophthora spp.</i>)				–	2
Jukas	Lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i> , <i>Septoria spp.</i>)				–	2
Rozes – siltumnīcās un atklātā lauka kultūrā	Miltrasa (<i>Sphaerotheca spp.</i>), rožu lapu tumšplankumainība (<i>Marssonina rosae</i>)				–	2
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Neļķes – siltumnīcās un atklātā lauka kultūrā	Lapu plankumainības (<i>Alternaria spp.</i> , <i>Pseudomonas sp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7–14 dienām	–	2
Begonijas – siltumnīcās un atklātā lauka kultūrā	Bakterioze (<i>Xanthomonas sp.</i>), iedegas (<i>Glomerella cingulata</i>)				–	2
Krizantēmas – siltumnīcās un atklātā lauka kultūrā	Lapu plankumainība (<i>Septoria spp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)				–	2
Lilijas, tulpes, gladiolas	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)				–	2
Klitenes					–	2
Pirakantas, segļiņi, efejas	Bakterioze (<i>Xanthomonas sp.</i>), iedegas (<i>Glomerella cingulata</i> , <i>Colletotrichum spp.</i>), kraupis (<i>Sphaceloma spp.</i>)				–	2

25. Dithane NT

Reģ. Nr. 0017, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: mankocebs, 750 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Augļu dārzā, ogulāju stādījumos un dekoratīvo kokaugu stādījumos nelietot tuvāk par 40 m un vīnogu stādījumos tuvāk par 12 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Indofil Industries Limited

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
Sīpoli, ķiploki (atklātā laukā)	Sīpolu neīstā mltrasa (<i>Peronospora destructor</i>), rūsa (<i>Puccinia allii</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām	28	4
Puravi (atklātā laukā)	Puravu neīstā mltrasa (<i>Phytophthora porri</i>), rūsa (<i>Puccinia allii</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām	60	3
Burkāni	Burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga dīgstu stadiju. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	30	4
Ziedkāposti, brokoļi (atklātā laukā)	Neīstā mltrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	30	4

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar graudaugu viena mezgla stadiju līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37). Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	60	2
Pupas, zirņi	Neistās miltrasas (<i>Peronospora viciae</i> , <i>Phytophthora phaseoli</i>), rūsas (<i>Uromyces appendiculatus</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 50% no pākstīm sasniegušas pilno garumu	28	1
Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru piebriešanas stadiju līdz kraupja sporu izplatīšanās beigām. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	28	4
Bumbieres	Bumbieru-kadiķu rūsa* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	2.0		Apsmidzināt bumbieres pumpuru plaukšanas laikā un atkārtoti pēc 14 dienām līdz primārās infekcijas uzliesmojuma beigām	28	4
Plūmes, ķirši	Plūmju rūsa (<i>Tranzschelia discolor</i>), kauleņkoku sausplankumainība (<i>Stigmata carpophila</i>), vējplūmes (<i>Taphrina pruni</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādies slimības pirmajām pazīmēm, kad pirmās lapas ir pilnīgi izplaukušas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	30	4
Vinogas	Neistā miltrasa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	56	4
Upenes, jānogas, ērkšķogas	Ogulāju lapu iedegas (<i>Pseudopeziza ribis</i>)	2.0		Apsmidzināt ērkšķogas ziedēšanas sākumā, upenes un jānogas pēc ziedēšanas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām. Ja nepieciešams, apsmidzināt arī pēc ražas novākšanas	30	4
Sīpolpuķes: hiacintes, tulpes, krokusi, narcises, gladiolas, īrisi, lilijas (atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski, kad augi 1–2.5 cm gari. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām. Veikt divas apstrādes pēc ziedēšanas	–	4
Pelargonijas, nelķes, ģerānijas, magones u.c. krāšņumaugi (atklātā laukā)	Neistās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādies slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām	–	4
Rozes (atklātā laukā)	Rožu lapu tumšplankumainība (<i>Diplocarpon rosae</i>), rožu rūsa (<i>Phragmidium mucronatum</i>)	2.0		Apsmidzināt parādies slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām	–	4

1	2	3	4	5	6	7
Dekoratīvie kokaugi un krūmi	Neīstās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	–	4
Priedes (kokaudzētavās un jaunaudzēs)	Priežu skujbire (<i>Lophodermium pinastri</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski īsi pirms slimības ierosinātāja izplatības sākuma. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības ierosinātāja izplatības intensitātes	–	4
Egles (kokaudzētavās un jaunaudzēs)	Egļu skujbire (<i>Lophodermium macrosporum</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski, īsi pirms slimības ierosinātāja izplatības sākuma. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības ierosinātāja izplatības intensitātes	–	4

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51. punktu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem

26. Duets Ultra s.k.

Reģ. Nr. 0319, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 187 g/l,
metil-tiofanāts, 310 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.3–0.6		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.3+0.3		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39) 2. reizi, sākot no vārpošanas stadijas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 55–69)		



1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

27. Dzelzs vitriols k.v.

Reg. Nr. 0228, reg. klase 3.

Darbīgā viela: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 96.5 %.

Pieskares iedarbības fungicīds, lihenicīds un muscicīds.

SIA "Karaleks"

Augļu koki	Sūnas, ķērpji uz stumbriem un zariem. Slimību izraisītāju ziemojošās stadijas		1.0–1.5	Apsmidzināt agri pavasarī pirms veģetācijas sākuma vai vēl rudenī, miera periodā	–	1
------------	--	--	---------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

28. Effector

Reģ. Nr. 0134, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: ditianons, 700 g/kg.

Pieskares iedarbība.

BASF A/S

Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), zaru un stumbru iedegas, augļu rūgtā puve (<i>Gloeosporium spp.</i>) u. c., augļu parastā puve (<i>Monilinia = Monilia spp.</i>), rūsa (<i>Gymnosporangium juniperi-virginiana</i>), augļu koku vēzis (<i>Nectria spp.</i>) u. c.		0.05–0.10	1. un 2. smidzinājums: apsmidzināt askusporu izlidošanas laikā un ziedēšanas beigās	21	6
			0.050–0.075	3. smidzinājums un pārējie: atkārtoti pēc 8–14 dienām		
Bumbieres	Augļu parastā puve (<i>Monilinia = Monilia spp.</i>)		0.1	Apsmidzināt pumpuru plaukšanas laikā un atkārtoti pēc 7–14 dienām līdz primārās infekcijas uzliesmojuma beigām	21	6
	Rūsa (<i>Gymnosporangium sabinae</i>), alternarioze (<i>Alternaria kikuchiana</i>)		0.075–0.100			
	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>)		0.075–0.100	1. un 2. smidzinājums: apsmidzināt askusporu izlidošanas laikā un ziedēšanas beigās		
			0.050–0.075	3. smidzinājums un pārējie: atkārtoti pēc 8–14 dienām		
Ķirši	Augļu parastā puve (<i>Monilinia = Monilia spp.</i>)		0.075–0.100	Apsmidzināt, kad tikko sākusies ziedēšana, ziediem nobirstot un 4 nedēļas pirms ražas novākšanas	28	6
	Ķiršu lapbire (<i>Coccomyces hiemalis = Blumeriella jaapii</i>)		0.050–0.075	Apsmidzināt pirms ziedēšanas un ziedēšanas beigās, atkārtoti pēc 14 dienām		
	Ķiršu kraupis (<i>Venturia cerasi</i>)			Apsmidzināt pumpuriem plaukstot, atkārtoti pēc 14 dienām		
	Kauleņkoku sausplankumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>)		0.050–0.075	Apsmidzināt rudenī, kad birst lapas, atkārtoti pavasarī, sākoties ziedēšanai	–	
Plūmes	Plūmju rūsa (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>)		0.075–0.100	Apsmidzināt, sākoties auglaizmetņu biršanai, atkārtoti pēc 1 mēneša, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms ražas novākšanas	28	3
Upenes, jāņogas, ērkšķogas	Rūsa (<i>Cronartium ribicola</i>), lapu plankumainība (<i>Drepanopeziza ribis</i>)		0.050–0.075	Apsmidzināt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, pirms ziedēšanas un pēc ražas novākšanas	28	3
Avenes	Avenāju mizas plaisāšana (<i>Didymella applanata</i>), dzinumu iedegas (<i>Sphaceloma necator</i>)		0.075–0.100	Apsmidzināt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	–	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

29. Efilor

Reģ. Nr. 0372, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 133 g/l,
metkonazols, 60 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu stublāju puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 7 lapu stadijas līdz rapša pilnas ziedēšanas stadijai, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 17–65)	42	1
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 7 lapu stadijas līdz rapša pilnas ziedēšanas stadijai, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 17–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no agra ziedēšanas stadijas līdz rapša ziedēšanas fāzes vidum, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 63–65)		

30. Elektis 75 d.g.

Reģ. Nr. 0179, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: zoksamīds, 83 g/kg,
mankocebs, 667 g/kg.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Gowan Comércio Internacional e Servicios, Limitada

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	1.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma signāla par lakstu puves parādīšanos vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
-----------	--	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

31. Epox Extra

Reģ. Nr. 0402, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 50 g/l,
folpets, 375 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

32. Epox Top e.k.

Reģ. Nr. 0389, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 40 g/l,
fenpropidīns, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

33. Falkons 460 e.k.

Reģ. Nr. 0154, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tebukonazols, 167 g/l,
triadimenols, 43 g/l,
spiroksamīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Vasaras mieži, ziemass mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.6		Apsmidzināt pirms slimību parādīšanās (pēc prognozes) vai parādīties pirmajām slimības pazīmēm, atkārtoti ne vēlāk kā līdz ziedēšanas sākumam (AS 61)	35	2
Ziemass kvieši, vasarass kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Ophiobolus graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	0.6			35	2
Rudzi, tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i> , f. <i>secalis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), rudzu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria secalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Ophiobolus graminis</i>)	0.6		Apsmidzināt pirms slimības parādīšanās (pēc prognozes) vai parādīties pirmajām slimības pazīmēm. Tritikālei ieteicams smidzināšanu veikt līdz cerošanas beigām (AS 29), rudziem – līdz ziedēšanas sākumam (AS 61)	35	2

34. Falcon Forte

Reģ. Nr. 0343, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 53 g/l,
spiroksamīns, 224 g/l,
tebukonazols, 148 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Bayer CropScience AG

Ziemass kvieši, vasarass kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), vārpu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29–69)	35	2
------------------------------------	---	---------	--	---	----	---

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29–69)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 29–61)	35	2

35. Fandango

Reģ. Nr. 0264, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 100 g/l,
fluoksastrobīns, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Parastā sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		



1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Parastā sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Tritikāle	Parastā sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Parastā sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

36. Fitoekols IF

Reģ. Nr. 0239, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 2 %.

Pieskares iedarbība.

A/S "BIOLAT"

Gurķi	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), neīstā miltasas (<i>Peronospora cubensis</i>), īstā miltasas (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	–	2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Tomāti	Lapu brūnais pelējums (<i>Cladosporium fulvum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	–	2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Neļķes	Miltasas (<i>Oidium dianthi</i>)	–	2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Krizantēmas	Miltasas (<i>Oidium chrysanthemi</i>)	–	2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Krāšņumaugu sīpolu un gumu apstrāde	Puves (<i>Botrytis spp.</i>)	–	2	Sīpolus un gumus pirms izstādīšanas vai novietošanas glabāšanā iemērk darba šķīdumā uz 30–40 minūtēm	–	1

37. Fitoekols IF 40 s.k.

Reģ. Nr. 0238, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 40 %.

Pieskares iedarbība.

A/S "BIOLAT"

Gurķi	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), neīstā miltasas (<i>Peronospora cubensis</i>), īstā miltasas (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	–	1–2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Tomāti	Lapu brūnais pelējums (<i>Cladosporium fulvum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	–	1–2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Neļķes	Miltasas (<i>Oidium dianthi</i>)	–	1–2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Krizantēmas	Miltasas (<i>Oidium chrysanthemi</i>)	–	1–2	Apsmidzināt augus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
Krāšņumaugu sīpolu un gumu apstrāde	Puves (<i>Botrytis spp.</i>)	–	2	Sīpolus un gumus pirms izstādīšanas vai novietošanas glabāšanā iemērk darba šķīdumā uz 30–40 minūtēm	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

38. Fleksiti s.k.

Reģ. Nr. 0265, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metrafenons, 300 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30–65)	35	2
---	---	-----	--	---	----	---

39. Folikūrs 250 e.ū.

Reģ. Nr. 0057, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	56	3
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 13–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 13–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

40. Fungurāns OH 300 s.k.

Reģ. Nr. 0279, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: varš, 300 g/l (vara hidroksīds, 487 g/l).

Pieskares iedarbība.

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	3.0–3.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	14	4
Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>)	1.25–1.50		Apsmidzināt stādījumus pavasār pirms kraupja asku sporū izlidošanas, sākot no kultūrauga pumpuru piebriešanas attīstības stadijas līdz “peļausu” attīstības stadijai (AS 51–54)	–	1

41. Gloria

Reģ. Nr. 0213, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: fenamidons, 75 g/l,

propamokarbs, 314.1 g/l (hidrohlora formā, 375 g/l).

Sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Bayer CropScience AG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pirms slimības pazīmju parādīšanās (pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos). Atkārtoti pēc 7–14 dienām	7	3
-----------	--	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

42. Golden Propiconazol 250 EC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 9, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: propikonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Goldengrass Ltd

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2

43. Imbrex

Reģ. Nr. 0406, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

44. Impakts s.k.

Reģ. Nr. 0101, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: flutriafols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–55)	30	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	30	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

45. Impakts 25 s.k.

Reģ. Nr. 0102, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: flutriafolis, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	30	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	30	1
Cukurbietes	Biešu lapu sausplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu sarmplankumainība (<i>Ramularia betae</i>), biešu joslainā plankumainība (<i>Phoma betae</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm	28	1

46.1. Infinito

Reģ. Nr. 0302, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propamokarbs, 523.8 g/l (propamokarba hidrohlorīds, 626 g/l),
fluopikolīds, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.2–1.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–12 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neistā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā milttrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.14	Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	1	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi	Krustziežu neīstā milttrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga trešo īsto lapu līdz kāpostu galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo izmēru, formu un stingrību (AS 13–49). Atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	3
Sīpoli	Sīpolu neīstā milttrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar loku kakliņa pārsnāšanās stadiju līdz, kad 10% lapas ir atliekušas (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	7	3
Puravi	Puravu neīstā milttrasa (<i>Phytophthora porri</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar lapu pamatnes uzbriešanu un pagarināšanos līdz stadijai, kad stublājs sasniedzis 70% no plānotā garuma un diametra (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	14	2

46.2. Infinito

Reģ. Nr. 0302, reģ. klase 3., iepakojumiem 0.5 kg un mazākiem.

Darbīgās vielas: propamokarbs, 523.8 g/l (propamokarba hidrohlors, 626 g/l), fluopikolīds, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/ 100m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc. %	Apstrādes laiks, norādījumi, iezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	12–16		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–12 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neīstā milttrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	3	3



1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.14	Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	1	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi	Krustziežu neīstā miltrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga trešo īsto lapu līdz kāpostu galviņa sasniesi šķirnei raksturīgo izmēru, formu un stingrību (AS 13–49). Atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	3
Sīpoli	Sīpolu neīstā miltrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar loku kakliņa pāresnīšanās stadiju līdz, kad 10% lapas ir atliekušas (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	7	3
Puravi	Puravu neīstā miltrasa (<i>Phytophthora porri</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar lapu pamatnes uzbriešanu un pagarināšanos līdz stadijai, kad stublājs sasniedzis 70% no plānotā garuma un diametra (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	14	2

47. Input

Reģ. Nr. 0266, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 160 g/l,
spiroksamīns, 300 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu kakla puve (<i>Rhizoctonia cerealis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	42	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu kakla puve (<i>Rhizoctonia cerealis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	42	2
	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsā (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu kakla puve (<i>Rhizoctonia cerealis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	42	2
	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsā (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu kakla puve (<i>Rhizoctonia cerealis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	42	2
	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsā (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

48. Juventus 90 š.k.

Reģ. Nr. 0221, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga divu mezglu stadijas līdz vārpošanas beigām (AS 32–59)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākoties kultūraugu ziedēšanai līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 60–65)		
Ziemas rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), rudzu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm kultūrauga vārpošanas sākumā (AS 51–53)	35	1
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm kultūrauga vārpošanas sākumā (AS 51–53)	35	1
Vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga divu mezglu stadijas līdz vārpošanas beigām (AS 32–59)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu brūnplankumainība (<i>Drechslera avenae</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga divu mezglu stadijas līdz vārpošanas beigām (AS 32–59)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	56	2
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50–60 % ziedu atvērušies (AS 63–64)		

49. Kandits d.g.

Reģ. Nr. 0197, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-krezoksims, 500 g/kg.

Lokāla sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>)	0.15–0.25		Apsmidzināt saskaņā ar izstrādāto kraupja apkaršanas programmu, sākot no kultūrauga pumpuru uzbriešanas attīstības stadijas līdz pastāv inficēšanās risks. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām	35	3
Ābeles	Ābeļu mltrasa (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.15–0.25		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām		
Upenes, jānogas, ērķšķogas	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), ērķšķogu Amerikas mltrasa (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>), ogulāju stabiņrūsa (<i>Cronartium ribicola</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām	21	2
Zemenes	Zemeņu mltrasa (<i>Sphaerotheca macularis</i>), zemeņu lapu baltplankumainība (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, pirms kultūrauga ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām		
Rozes (atklātā laukā un segtās platībās)	Rožu istā mltrasa (<i>Sphaerotheca pannosa</i>), rožu lapu tumšplankumainība (<i>Marssonina rosae</i>)	–	0.02	Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	1
Begonijas (atklātā laukā un segtās platībās)	Begoniju istā mltrasa (<i>Oidium begoniae</i>)	–	0.02		–	1
Krizantēmas (atklātā laukā un segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	–	0.1		–	1
Nelķes (atklātā laukā un segtās platībās)	Nelķu rūsa (<i>Uromyces dianthi</i>)	–	0.1		–	1
Gerberas (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu kakla puve (<i>Phytophthora cryptogea</i>)	–	0.1	Apliet dēstus pēc izstādīšanas. Uz vienu augu izlietot 60 ml 0.1 % darba šķidruma	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

50. Kapalo s.e.

Reģ. Nr. 0327, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 62.5 g/l,
metrafenons, 75 g/l,
fenpropimorfs, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)	1.0–2.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
		1.0–2.0 + 1.0–2.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37) 2. reizi, sākot no vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 49–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)	35	2

51. Korbels e.k.

Reģ. Nr. 0044, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fenpropimorfs, 750 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	35	2
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi	Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm		

52. Leander

Reģ. Nr. 0397, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fenpropidīns, 750 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

53. Leimay SC

Reģ. Nr. 0346, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: amisulbroms, 200 g/l.

Pieskares iedarbība.

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	6
-----------	---	-----	--	---	---	---

54. Litagra Glorija 450 s.k.

Paralēlā importa atļauja Nr. 2., reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: fenamidons, 75 g/l,

propamokarbs, 314.1 g/l (hidrohlorīda formā, 375 g/l).

Sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	20		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pirms slimības pazīmju parādīšanās (pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos). Atkārtoti pēc 7–14 dienām	7	3

55. Maredo 125 SC

Reģ. Nr. 0373, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	2
-------------------------------	---	---------	--	---	----	---

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplanku- mainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 32–65)	35	2
Rudzi	Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplanku- mainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplanku- mainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–65)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), plankumainības (<i>Septoria spp.</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Cukurbietes	Biešu sarmplankumainība (<i>Ramularia betae</i>), biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu miltrasa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu rūsa (<i>Uromycae betae</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm.	28	2
Galda bietes		0.5–0.75				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

56. Menara 410 EC

Reģ. Nr. 0412, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propikonazols, 250 g/l,
ciprokonazols, 160 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši,	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	42	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	42	2
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	42	2

57. Mirāža 45 e.k.

Reģ. Nr. 0130, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prochlorazs, 450 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	30	2
	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)		



1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	30	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	30	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)		

58. Mystic

Reģ. Nr. 0362, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Drechslera teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		
Rudzi, tritikāle	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Leptosphaeria maculans</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	3
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Leptosphaeria maculans</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	2
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		

1	2	3	4	5	6	7
59. Opera N						
Reģ. Nr. 0281, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: piraklostrobīns, 85.0 g/l, epoksikonazols, 62.5 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
BASF A/S						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0–2.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	35	2
		1.0+1.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē: 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (30–37) 2. reizi, sākot no kultūrauga attīstītas karoglapas stadijas līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 39–65)		
Rudzi, tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 30–59)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnplankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 29– 59)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.75–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 29–59)	35	2
Kukurūza	Kukurūzas lapu plankumainība (<i>Helminthosporium turcicum</i>)	1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kukurūzas divu mezglu stadijas līdz skaras veidošanās sākumam (AS 32–51)	84	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

60. Opus s.k.

Reģ. Nr. 0190, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Rudzi, tritikāle	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 32–55)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnplankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)					
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)					
Cukurbietes	Biešu miltresa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu rūsa (<i>Uromyces betae</i>), biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu sarmplankumainība (<i>Ramularia betae</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	28	2

Fungicīdi

61. Opus EC

Reģ. Nr. 0367, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 83 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	38	2
----------------------------------	---	----------	--	--	----	---

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplanku- mainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplanku- mainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	38	2
Tritikāle	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplanku- mainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	38	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

62. Orius 250 e.ū.

Reģ. Nr. 0267, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makhteshim-Agan Holland B. V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 55–61)		

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas stadijas beigām (AS 13–69)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobīršanai (AS 65)		

63. Orvego

Reģ. Nr. 0368, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: ametoctradīns, 300 g/l,
dimetomorfs, 225 g/l.

Lokāla sistēmas un pieskares iedarbība.

BASF A/S

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.8		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5–10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	3
-----------	---	-----	--	---	---	---

64. Osiris

Reģ. Nr. 0351, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 37.5 g/l,
metkonazols, 27.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5–3.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
----------------------------------	--	---------	--	--	----	---



1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	3.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)	35	2
Ziemas mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–3.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–3.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.5–3.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	3.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		
Vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

65. Penncozeb 75 DG

Reģ. Nr. 0273, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: mankocebs, 75 %.

Pieskares iedarbība.

Cerexagri S.A.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
-----------	--	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

66. Penncozeb 80 WP

Reģ. Nr. 0180, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: mankocebs, 80 %.

Pieskares iedarbība.

Cerexagri S.A.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
-----------	--	-----	--	---	---	---

67. Previkurs E 840 š.k.

Reģ. Nr. 0224, reģ. klase 2., iepakojumiem 0.5 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: propamokarbs, 530 g/l, fosetils, 310 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Tomāti, gurķi, paprika, kāposti	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	250 ml/m ³	1.25	Salaistīt substrātu 2–7 dienas pirms dārzeņu sējas vai dēstu stādīšanas un rūpīgi pārlāpstot. Darba šķidruma patēriņš 20 l/m ³	–	1
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.15	Salaistīt izklieģētu substrātu. Darba šķidruma patēriņš 2–3 l/m ²	–	1
Tomāti, gurķi, paprika	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.10–0.15	Apliet dēstus pēc izpīķēšanas vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Darba šķidruma patēriņš 2–3 l/m ²	–	1
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.10–0.15	Apliet dēstus pēc izstādīšanas vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Darba šķidruma patēriņš 1 litrs uz 4–5 augiem	–	1
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.015–0.030	Laistīt augus pilienvēidā, izlietojot 1–2 litri preparāta uz 25 tūkstošiem augu	3	2
	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>), neīstās miltrasas (<i>Peronospora tabacina</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt augus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Atkārtoti pēc 7–14 dienām	3	2
Krāšņumaugi	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.20–0.25	Apliet dēstus pēc izstādīšanas vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Darba šķidruma patēriņš 2–6 l/m ² . Atkārtoti apliet augus pēc 7–14 dienām	–	2
	Neīstās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i> , <i>Plasmopara spp.</i>)		0.15–0.20	Apsmidzināt augus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Atkārtoti pēc 7–14 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6	7
68. Prosaro						
Reģ. Nr. 0276, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: protiokonazols, 125 g/l, tebukonazols, 125 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
Bayer CropScience AG						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59–61)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 13–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

69. Ranmans A s.k.

Reģ. Nr. 0243, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ciazofamīds, 400 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Biosciences Europe S.A.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.2		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pirms slimības pazīmju parādīšanās (pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos). Atkārtoti pēc 7–10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu – 0.15 l/ha Ranmans B š.k.	7	6
-----------	---	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

70. Ranman Top

Reģ. Nr. 0355, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ciazofamīds, 160 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Biosciences Europe S.A.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	6
-----------	--	-----	--	---	---	---

71. Revus 250 s.k.

Reģ. Nr. 0312, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5–0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, vēlākais – īsi pirms lakstu sakļaušanās rindās, atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	2
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5–0.6		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	2
Gurķi (segtās platībās)	Neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.5–0.6		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	2

72.1. Ridomil Gold MZ 68 WG

Reģ. Nr. 0185, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mankocebs, 64%,
metalaksils-M, 4%.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sauspilnkumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, vai īsi pirms lakstu sakļaušanās rindās. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	2
Tomāti (atklātā laukā un segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	3	2

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Neistā mltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	7	2
Sīpoli	Neistā mltrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām. Lokus pārtikai nelietot	28	2
Krāšņumaugi: rozes, lefkojas	Neistās mltrasas (<i>Peronospora sparsa</i> , <i>Peronospora mathiolae</i>)	2.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2

72.2. Ridomil Gold MZ 68 WG

Reģ. Nr. 0185, reģ. klase 3., iepakojumiem 1.0 kg un mazākiem.

Darbīgās vielas: mankocebs, 64%,
metalaksils-M, 4%.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva g/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	25		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, vai īsi pirms lakstu sakļaušanās rindās. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	2
Tomāti (atklātā laukā un segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	25		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	3	2
Gurķi (segtās platībās)	Neistā mltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	25		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	7	2
Sīpoli	Neistā mltrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām. Lokus pārtikai nelietot	28	2
Krāšņumaugi: rozes, lefkojas	Neistās mltrasas (<i>Peronospora sparsa</i> , <i>Peronospora mathiolae</i>)	25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

73. Riza 250 e.ū.

Reģ. Nr. 0352, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporiu spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 29–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 29–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 29–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 29–60)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 29–60)	35	2
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	2
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobīršanas sākumam (AS 14–65)	56	3
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		

74. Rovral Aqua Flo

Reg. Nr. 0332, reg. klase 2.

Darbīgā viela: iprodions, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

BASF A/S

Briseles kāposti	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm 4–6 nedēļas pirms ražas novākšanas	14	2
Burkāni	Burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādīties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtota apstrāde pēc 14 dienām	28	2
Zemenes	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde pēc 10–14 dienām	14	2

75. Signum d.g.

Reg. Nr. 0269, reg. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 26.7%,
piraklostrobīns, 6.7%.

Sistēmas iedarbība.

Ķiršu un plūmju stādījumos nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

BASF A/S

Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	0.25		Apsmidzināt stādījumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7–14 dienām	3	4
Galviņkāposti, Briseles kāposti	Kāpostu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i>), krustziežu lapu baltplankumainība (<i>Pseudocercospora capsellae</i>), krustziežu baltkreves (<i>Albugo candida</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pēc 3–4 nedēļām	21	2
Sīpoli	Puves (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i> , <i>Fusarium oxysporum</i>), sīpolu baltā puve (<i>Sclerotinia cepivorum</i>), melnais sodrējums (<i>Alternaria porri</i> , <i>Cladosporium allii-cepae</i>)	1.5		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5–10 dienām	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Burkāni	Čemurziežu melnā puve (<i>Alternaria radicina</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.75		Apsmidzināt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pēc 2 nedēļām	14	2
Zirņi	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zirņu gaišplankumu iedegas (<i>Ascochyta pisi</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski ziedēšanas sākumā vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pākstu veidošanās sākumā	14	2
Plūmes, ķirši	Kaulenķoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>), augļu parastā puve (<i>Monilinia fructigena</i>), rūgtā puve (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), ķiršu lapbīre (<i>Blumeriella jaapii</i>)	0.75–1.00		Apsmidzināt stādījumus ziedēšanas sākumā un atkārtoti apsmidzināt pēc 5–10 dienām	–	2
Zemenes	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zemeņu miltrasa (<i>Sphaerotheca macularis</i>), zemeņu lapu baltplankumainība (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	1.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā, atkārtoti pēc 10–14 dienām	3	2
Dzērvenes	Vertikālo dzinumu galu atmiršana (<i>Phomopsis vaccini</i>), ogu puves (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Botryosphaeria vaccinii</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām	–	2
Krūmmellenes	Lapu un dzinumu bojājumi (<i>Phomopsis vaccinii</i> , <i>Botryosphaeria</i> spp.), dzinumu vēzis (<i>Gloeosporium minus</i>), ogu puve (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtoti apsmidzināt ziedēšanas beigās	–	2

76. Skors 250 e.k.

Reģ. Nr. 0001, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ābeles, bumbieres	Kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), miltrasa (<i>Podospaera leucotricha</i>)	0.15–0.20	0.01–0.05	Apsmidzināt 2 reizes pirms un 2 reizes pēc ziedēšanas	20	4
-------------------	--	-----------	-----------	---	----	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

77. Sportak EW

Reģ. Nr. 0008, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prochlorazs, 450 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplan- kumainību (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu lapu tīkl- plankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz lapas maksts atvēršanās stadijai (AS 29–49)		

78. Svičs 62.5 d.g.

Reģ. Nr. 0244, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: ciprodinils, 375 g/kg,
fludioksonils, 250 g/kg.

Sistēmas un pieskares fungicīds.

Syngenta Crop Protection AG

Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8–1.2	0.08–0.10	Apsmidzināt stādījumus pirms ziedēšanas un pēc ziedēšanas	7	2
Avenes	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), aveņu iedegas (<i>Elsinoe veneta</i>), stublāju mizas plaisāšana (<i>Didymella applanata</i>)	0.8–1.2	0.08–0.10	Apsmidzināt stādījumus pirms ziedēšanas un pēc ziedēšanas	14	2
Tomāti (atklātā laukā un segtais platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8–1.2		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	7	2
Gurķi (segtais platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8–1.2		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	7	2

1	2	3	4	5	6	7
Zāliens (golfa laukumā)	Sārtais sniega pelējums (<i>Fusarium nivale</i>), pelēkais sniega pelējums (<i>Typhula incarnata</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.2		Apsmidzināt zālienu profilaktiski rudenī (oktobrī–novembrī) vai parādies pirmajām slimības pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	3
Skuju koki, lapu koki, dekoratīvie krūmi kokaudzētavās	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), plankumainības (<i>Cylindrocladium spp.</i>)	0.8–1.2		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Krāšņumaugi: rozes, pelargonijas, fuksijas, ciklamēnas, pīrūlās, atraitnītes, krizantēmas, gerberas	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0	0.10–0.12	Apsmidzināt, parādies pirmajām slimības pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām	–	3

79. Swing Gold

Reģ. Nr. 0356, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 50 g/l,
dimoksistrobīns, 133 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 49–65)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		

80. Širlans 500 s.k.

Reģ. Nr. 0177, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

ISK Biosciences Europe N.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
-----------	---	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

81. Tango Flex

Reģ. Nr. 0359, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metrafenons, 100 g/l,
epoksikonazols, 83 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

82. Tango Super s.e.

Reģ. Nr. 0110, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 84 g/l,
fenpropimorfs, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75		1. <u>lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, dalītā apstrādē. 1. reizi, sākot no kultūrauga stiebrošanas fāzes sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	35	2
	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.50		2. reizi, sākot no kultūrauga vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 49–61)		
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.50		2. <u>lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga karoglapas parādīšanās stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 37–61)	35	1
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75–1.50		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga pirmā mezgla stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31–49)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)	0.75–1.50			35	2
Auzas	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.75–1.50			35	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

83. Taspā 500 EC

Reģ. Nr. 0349, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propikonazols, 250 g/l,
difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Vasaras kvieši, ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 51–61)	35	1
----------------------------------	---	-----	--	---	----	---

84. Tilmor

Reģ. Nr. 0353, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 80 g/l,
tebukonazols, 160 g/l.

Sistēmas iedarbības fungicīds.

Bayer CropScience AG

Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus rudeni, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas (AS 14)	56	2
		1.0		Apsmidzināt sējumus pavasārī atkārtoti, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)		
	Krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60)		
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus rapša ziedēšanas sākumā – pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 62–65)		

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 14–55)	56	2
	Krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60)		
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus rapša ziedēšanas sākumā – pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 62–65)		

85. Tilts 250 e.k.

Reģ. Nr. 0105, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: propikonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu stiebru rūsa (<i>Puccinia graminis</i>), tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium herbarum</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu stiebru rūsa (<i>Puccinia graminis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium herbarum</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	42	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

86. Timorekss d.š.

Reģ. Nr. 0235, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: Austrālijas tējas koka eļļa, 7.0 g/l.

Biomor – Israel Ltd.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5
Gurķi (segtajās platībās)	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Apsmidzināt profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām	–	6
Gurķi, ķirbji, kabači	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		–	6
Tomāti	Īstā miltrasa (<i>Leveillula taurica</i>)		–	6
Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		–	6
Krāšņumaugi	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>), neīstās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i> , <i>Plasmopara spp.</i>)		–	6

87. Timorekss e.k.

Reģ. Nr. 0234, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: Austrālijas tējas koka eļļa, 660 g/l.

Biomor – Israel Ltd.

Gurķi (segtajās platībās)	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.75–1.0	Apsmidzināt profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām	–	6
Gurķi, ķirbji, kabači	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.75–1.0		–	6
Tomāti	Īstā miltrasa (<i>Leveillula taurica</i>)		0.75–1.0		–	6
Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.75–1.0		–	6
Krāšņumaugi	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>), neīstās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i> , <i>Plasmopara spp.</i>)		0.5–1.0		–	6

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

88. Timors c.k.

Reģ. Nr. 0233, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: Austrālijas tējas koka eļļa, 500 g/l.

Biomor – Israel Ltd.

Gurķi (segtajās platībās)	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		0.75–1.0	Apsmidzināt profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām	–	6
Gurķi, ķirbji, kabači	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		0.75–1.0		–	6
Tomāti	Īstā miltrasa (<i>Leveillula taurica</i>)		0.75–1.0		–	6
Krāšņumaugi	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)		0.5–1.0		–	6

89. Tiovits 80 d.g.

Reģ. Nr. 0056, reģ. klase 2., iepakojumiem 1 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: sērs, 80 %.

Pieskares iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ābeles, bumbieres	Īstā miltrasa (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	3.0–7.5	0.75	Apsmidzināt augļu kokus pirms ziedēšanas	–	1
		3.0–7.5	0.3–0.5	Apsmidzināt augļu kokus sārtu pumpuru stadijā, atkārtoti pēc 5–10 dienām	7	4
Plūmes, ķirši	Kaulenķoku lapu sauspilnkumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>)	3.0–5.0	0.75	Apsmidzināt augļu kokus pirms ziedēšanas	–	1
		3.0–5.0	0.5	Apsmidzināt augļu kokus pēc ziedēšanas	7	2
Upenes	Ērkšķogu Amerikas miltrasa (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)	2.0–3.0	0.4–0.5	Apsmidzināt, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	7	3
Graudaugi, bietes	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Erysiphe betae</i>)	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	35	2
Zemenes	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	2.0–3.0	0.2–0.4	Apsmidzināt stādījumus pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	–	3
Dārzeni un krāšņumaugi	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	2.0–3.0	0.50–0.75	Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm	35	3
Dārzeni un krāšņumaugi	Dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>), krustziežu sakņu augoņi (<i>Plasmodiophora brassicae</i>)	6 g/m ²		Dēstu audzētavās iestrādāt augsnes virskārtā 3 dienas pirms sējas	–	1
Lapu koki kokaudzētavās un jaunos stādījumos	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	1.2		Apsmidzināt, parādotes pirmajām slimības pazīmēm un atkārtoti pēc 10–14 dienām pavasarī un vasarā	–	3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

90. Topāzs 100 e.k.

Reģ. Nr. 0009, reģ. klase 2., iepakojumiem 0.1 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: penkonazols, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Gurķi segtās platībās	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	0.250–0.375			3	4
Tomāti segtās platībās	Īstā miltrasa (<i>Leveillula taurica</i>)	0.25–0.50			4	4
Rozes	Rožu lapu tumšplankumainība (<i>Marssonina rosae</i>), rožu īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt slimības agrīnā attīstības stadijā	–	4
Neļķes	Neļķu rūsa (<i>Uromyces dianthi</i>)					
Krizantēmas	Krizantēmu rūsa (<i>Puccinia tanacetii</i>), krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)					
Mežvītenī	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe polygoni</i>)					
Flokši, miķeļi	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)					
Ābeles	Ābeļu miltrasa (<i>Podospaera leucotricha</i>)	0.375–1.000		Apsmidzināt, slimībām parādoties, atkārtoti pēc 2 nedēļām	14	3
Ķirši	Ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapii</i>)	0.375–1.000		Apsmidzina pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	–	3
Upenes	Ogulāju stabiņrūsa (<i>Cronartium ribicola</i>), ērkšķogu Amerikas miltrasa (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)	0.25–0.50		Apsmidzināt slimības agrīnā attīstības stadijā	20	3
Vilkābeles	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.5–1.0			–	4
Ozoli	Īstā miltrasa (<i>Microspora alphitoides</i>)					
Kļavas	Īstā miltrasa (<i>Uncinula bicornis</i>)					

91. Toprex 375 SC

Reģ. Nr. 0400, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 250 g/l,
paklobutrazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.3		Apsmidzināt sējumus rudenī rapša četru lapu līdz sešu lapu stadijā (AS 14–16)	–	1
		0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā starpmezglu posma attīstības līdz stadijai, kad starp lapām redzami ziedpumpuri (AS 31–50)	100	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

92. Vara vitriols k.v.

Reģ. Nr. 0226, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 98 %.

Pieskares iedarbība.

SLA "Karaleks"

Augļu koki	Kraupis (<i>Venturia spp.</i>), parastā augļu puve (<i>Monilia spp.</i>), kauleņkoku pelēkā puve (<i>Monilia spp.</i>)	15–20	0.5–1.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms veģetācijas sākuma		1
Ogulāji	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), lapu sīkplankumainība (<i>Mycosphaerella ribis</i>)	8–10	0.5–1.0			1
Ābeles, bumbieres	Ķērpji	15–20	1.0	Apsmidzināt pirms pumpuru plaukšanas		1
Augļu koki	Augļu koku vēzis (<i>Nectria spp.</i>)		3–5	Dezinficēt zāģējuma brūces un brūces, kuras veidojas izgriežot augļu koku vēzi		1

93. Vista 228 s.e.

Reģ. Nr. 0186, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: flukvinkonazols, 54 g/l,
prohlorazs, 174 g/l.

Sistēmas iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), rudzu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria secalis</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas sākumam (AS 30–50)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas un vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miežu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas sākumam (AS 29–50)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

94. Viverda OD

Reģ. Nr. 0384, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 140 g/l,
piraklostrobīns, 60 g/l,
epoksikonazols, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

BASF A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazi- mēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpo- šanas beigām (AS 25–59)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

95. Zamirs 400 e.ū.

Reģ. Nr. 0314, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tebukonazols, 133 g/l,
prohlorazs, 267 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Makteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.2–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu pirmā mezgla stadijas līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 31–65)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.2–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu pirmā mezgla stadijas līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 31–65)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.2–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu pirmā mezgla stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 31–61)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.2–1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu pirmā mezgla stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 31–61)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, no ziedēšanas sākuma līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 61–65)	63	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

96. Zantara

Reģ. Nr. 0374, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: biksafēns, 50 g/l,
tebukonazols, 166 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.9–1.2		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.9–1.2		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.9–1.2		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.9–1.2		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

HERBICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidrums konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. 2.4-D Nufarm š.k.

Reģ. Nr. 0095, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: 2.4-D, 600 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju graudaugi (kvieši, rudzi)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus labības cerošanas fāzē	–	1
Vasarāju graudaugi (kvieši, mieži, auzas)		0.7–1.5			–	1
Griķi		0.7–1.2		Apsmidzināt lauku pa nezāļu dīgstiem pirms griķu dīgšanas	–	1
Kukurūza		0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–5 lapu fāzē	–	1
Baltais āboliņš		0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus sējas gadā pēc pirmās istās lapas parādīšanās	–	1
Lopbarības stiebrzāļu sēklu lauki: pļavu lapsaste, bezakotu laucauza		0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu cerošanas fāzē	–	1
kamolzāle		0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus kamolzāles cerošanas fāzes sākumā	–	1
dižauza		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2–4 lapu fāzē	–	1
timotiņš		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2–3 lapu fāzē	–	1
pļavu skarene		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus sējas gadā, kultūrauga 1–2 lapu fāzē	–	1
pļavu auzene, kas pasēta miežiem		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus sējas gadā, miežu cerošanas fāzē	–	1
pļavu auzene		1.5		Apsmidzināt sējumus sēklas ievākšanas gadā, kultūrauga cerošanas fāzē	–	1

2. Accurate 200 WG

Reģ. Nr. 0342, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Cheminova A/S

Ziema kvieši, ziema mieži, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.030		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39)	60	1
Elļas lini	Divdīgļlapju nezāles	0.030		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri, līdz 30 cm augstumam, vai pirms ziedpumpuri kļūst redzami, atkarībā no tā, kas notiek agrāk	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3. Activus 330 EC

Reģ. Nr. 0341, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pendimetalīns, 330 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas vai pēc sadīgšanas, līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29) un pirms nezāļu sadīgšanas	–	1
Vasaras mieži, zirņi, vasaras miežu un zirņu mistri	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt pēc kultūrauga sējas, pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1
Kukurūza (lopbarībai)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.5		Apsmidzināt pēc sējas, līdz kultūrauga 4 lapu stadijai un pirms nezāļu sadīgšanas	–	1
Sīpoli, puravi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt pēc sējas vai sīksīpolu izstādīšanas, līdz kultūrauga un nezāļu sadīgšanai (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2.5 cm)	–	1
Burkāni, pastinaki	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt pēc sējas, līdz kultūrauga un nezāļu sadīgšanai (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm)	–	1
Galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles kāposti, brokoļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādīšanai sagatavotu augsni pirms kultūrauga izstādīšanas. Stādot kultūraugus, izvairīties no apstrādātas augsnes nokļūšanas sakņu zonā	–	1
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt augsni, brīvu no nezālēm, agri pavasarī, kultūrauga miera stāvoklī	–	1
Jāņogas, ērkšķogas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt augsni, brīvu no nezālēm, agri pavasarī, pirms kultūrauga pumpuru plaukšanas	–	1
Avenes, kazenes, aveņu-kazeņu hibrīdi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt augsni, brīvu no nezālēm, rudenī vai agri pavasarī, līdz pumpuru plaukšanai	–	1
Zemenes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt augsni, brīvu no nezālēm, rudenī pēc kultūrauga ziedpumpuru aizmetņu izveidošanās, vai pavasarī līdz ziedkopas pumpura parādīšanās sākumam cera centrā	–	1

4. Agroksons 75 š.k.

Reģ. Nr. 0048, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju un vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājos – atjaunojoties veģetācijai, vasarājos – kad graudaugiem 3–4 lapas, līdz stiebrošanai	–	1
-------------------------------	-----------------------------	---------	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem 3–4 lapas (āboliņam 1–2 lapas), līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne, tīruma mikstpiene	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mikstpienei izveidojusies lapu rozete (spēcīgākie augi 15–25 cm augsti), līdz graudaugu stiebrošanai	–	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad lini 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš	Divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības un pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt laukus pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	20	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušas 3–4 lapas	–	1

5. Aksials 50 e.k.

Reģ. Nr. 0304, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pinoksadēns, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži	Parastā rudzuzmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	0.8–0.9 (rudēnī) 0.8–1.0 (pavasārī)		Apsmidzināt sējumus rudēnī vai pavasarī, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz divu mezglu stadijai	–	1
	Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	0.6–0.9		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz attīstītas karoglapas stadijai		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	0.6–0.9		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz attīstītas karoglapas stadijai	–	1
	Parastā rudzuzmilga (<i>Apera spica-venti</i>), parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz divu mezglu stadijai		

6. Alistar Grande OD

Reģ. Nr. 0315, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: nātrija metil-jodsulfurons, 4.5 g/l,

metil-mezosulfurons, 6 g/l,

diflufenikans, 180 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām vai dīgstiem.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt kultūraugus rudēnī, sākot no 3 lapu attīstības stadijas, līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13–29), kad sadīgušās rudēnī dīgstošās nezāles	–	1
---------------------------------	--	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

7. Amega š.k.

Reģ. Nr. 0288, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Nufarm GmbH & Co KG

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanai	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas		2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno skuju kociņu skujas un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	1

8. Arelons flussig s.k.

Reģ. Nr. 0329, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: izoproturons, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Stähler International GmbH & Co. KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle	Rudzumilga, peļastišu lapsaste, kumelītes, parastā virza	3.0		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz cerošanas fāzes beigām (AS 11–29)	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle	Rudzumilga, peļastišu lapsaste, kumelītes, parastā virza	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz cerošanas fāzes beigām (AS 29)	–	
Rudzi	Rudzumilga, peļastišu lapsaste, kumelītes, parastā virza	3.0		Apsmidzināt rudenī, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju, līdz cerošanas fāzes beigām (AS 11–29)	–	1
Rudzi	Rudzumilga, kumelītes, parastā virza	2.0		Apsmidzināt pavasarī, līdz cerošanas fāzes beigām (AS 29)	–	
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Rudzumilga, peļastišu lapsaste, kumelītes, parastā virza	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju, līdz cerošanas fāzes beigām (AS 11–29)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

9. Ariane S

Reģ. Nr. 0188, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluoksipirs, 40 g/l,
klopīralīds, 20 g/l,
MCPA, 200 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai. (AS 31)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas		2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu, līdz pirmā mezgla stadijai. (AS 21–31)	–	1
Stiebrzāļu sēklu lauki		3.0–3.5		Apsmidzināt sējumus no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21–31)	–	1
Ganības		3.0–3.5		Apsmidzināt ganības no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21–31)	30	1

10. Arrats d.g.

Reģ. Nr. 0249, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dikamba, 500 g/kg,
tritosulfurons, 250 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

BASF A/S

Ziemas kvieši, mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.20		Apsmidzināt pavasarī, tikko veģetācija atjaunojusies, līdz kultūrauga cerošanas fāzes beigām (AS 29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, mieži, auzas		0.15		Apsmidzināt, sākot no kultūrauga 2–3 lapu stadijas, līdz cerošanas fāzes vidum (AS 13–25). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Kukurūza		0.20		Apsmidzināt kultūrauga divu lapu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

11. Attribut

Reģ. Nr. 0191, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: Na-propoksikarbazons, 700 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, tritikāle	Viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.06–0.10		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz graudaugu otrā mezgla stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši		0.06			–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

12. Axial One 50 EC

Reģ. Nr. 0371, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pinoksadēns, 45 g/l,
florasulams, 5 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga (<i>Apera spica- venti</i>), peļastišu lapsaste (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas (AS 13)	–	1
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga (<i>Apera spica- venti</i>), vējauza (<i>Avena fatua</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32)		
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, peļastišu lapsaste (<i>Alopecurus myosuroides</i>), daudzziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>)	1.3		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, vējauza (<i>Avena fatua</i>), parastā rudzusmilga (<i>Apera spica- venti</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas, līdz divu mezglu stadijai (AS 12–32)	–	1

13. Ažils 100 e.k.

Reģ. Nr. 0003, reģ. klase 2., iepakojumiem 0.1 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: propakvizafops, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Kartupeļi	Labības – sārņaugi	0.5		Apsmidzināt, sākot no sārņaugu 3 la- pu stadijas, līdz cerošanas sākumam	42	1
		1.0		Apsmidzināt cerošanas fāzē		
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt, sākot no nezāļu 3 lapu stadijas, līdz cerošanas sākumam		
		1.2		Apsmidzināt nezāļu cerošanas fāzē		
	Ložņu vārpata	1.0–1.5		Apsmidzināt, kad vārpata 15–20 cm gara		
Cukurbietes, rapsis, lini, ķimenes, kāposti, burkāni, puravi, pupas, zirņi, sīpoli, ķiploki, divdīgļlapju krāšņumaugi	Labības – sārņaugi	0.5		Apsmidzināt, sākot no 3 lapu stadijas, līdz cerošanas sākumam	30	1
		1.0		Apsmidzināt cerošanas fāzē		
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt, sākot no nezāļu 3 lapu stadijas, līdz cerošanas sākumam		
		1.2		Apsmidzināt nezāļu cerošanas fāzē		
	Ložņu vārpata	1.0–1.5		Apsmidzināt, kad vārpata 15–20 cm gara		

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Augļu koku un ogulāju stādījumi, augļu koku un meža kultūru stādu audzētavas	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt līdz nezāļu stiebrošanai	30	2
	Ložņu vārpata	1.0–1.5		Apsmidzināt, kad vārpata 15–20 cm gara		
Zemenes	Ložņu vārpata	1.0–1.5		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas	–	1

14. Banvels 4S š.k.

Reģ. Nr. 0038, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dikamba, 480 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, mieži, rudzi, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.15–0.25 (vai 0.15–0.20 maisījumā ar piemērotu prep.)		Apsmidzināt sējumus pavasarī, graudaugu cerošanas fāzē (AS 21–29)	–	1
Kukurūza		0.4–0.8		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–6 lapu stadijā (auga garums 10–20 cm)	60	1
Ganības, zālāji		1.6–2.0		Apsmidzināt platības pavasarī, īsmūža nezāļu 2–4 lapu stadijā, daudzgadīgajām nezālēm, kad rozetes diametrs 5 cm	28	1
Dzelzceļi		0.75–1.00 (maisījumā ar piemērotu prep.)		Apsmidzināt platības nezāļu aktīvas augšanas laikā	–	1
Papuves		0.75 (maisījumā ar piemērotu prep.)			–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības		0.5–2.0 (maisījumā ar piemērotu prep.)			–	1

15. Barbarian 360 š.k.

Reģ. Nr. 0298, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi graudiem, lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus pirms ražas novākšanas, pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Rapsis, eļļas lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm divas istās lapas	–	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas	–	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	–	1
Koku jaunaudzes, pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles.	4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
	Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes	4.0		Apsmidzināt kokaugus –sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumību nobriešanas un pirms lapu novecošanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanas, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
	Virši (kūdras augsne)	4.0		Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi		10	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi		20	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Koku retināšana mežā, injicējot stumbrā	Lapu koki, skuju koki	2 ml vienā cirtiena reizē		Injicējot koku stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Koki ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma un injicēti 2 ml katrā reizē	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem	–	1

16. Barbarian Biograde 360 š.k.

Reģ. Nr. 0299, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi graudiem, lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt sējumus pirms ražas novākšanas, pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis, eļļas lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm divas istās lapas	–	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas	–	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī, pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Pirms koku jaunaudzju ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	–	1
Koku jaunaudzes, pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles.	4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
	Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes	3.0		Apsmidzināt kokaugus – sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanas, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
	Virši	4.0–6.0		Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi		10	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi		20	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam	–	1
Koku retināšana mežā, injicējot stumbrā	Lapu koki, skuju koki	2 ml vienā cirtiena reizē		Injicējot koku stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Kokiem ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma un injicēti 2 ml katrā reizē	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem	–	1

17. Barbarian Hi-Aktiv š.k.

Reģ. Nr. 0289, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 490 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi graudiem, lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sipoli, puravi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.1		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt sējumus pirms plaušanas pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1

1	2	3	4	5	6	7
Rapsis, eļļas lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.1		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm divas istās lapas	–	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas	–	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–4.4		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.1–4.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.7		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Mežā, pirms koku jaunaudzies ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.7		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	–	1
Mežā, pēc koku jaunaudzies ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.9		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
	Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes	2.2		Apsmidzināt kokaugus – sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas, ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanas, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
	Virši	2.9–4.4		Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi		7.5	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi		15	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Koku retināšana mežā, injicējot stumburā	Lapu koki, skuju koki	1.5 ml vienā cirtiena reizē		Injicējot koku stumburā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Kokiem ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma un injicēti 1.5 ml katrā reizē	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.9–4.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem	–	1

18. Basta

Reģ. Nr. 0200, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: amonija glufosināts, 150 g/l.

Nav selektīvs, pieskares iedarbība, augi uzņem caur augu zaļajām daļām.

Bayer CropScience AG

Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā pirms/pēc kultūrauga ziedēšanas. Atkārtoti pēc vajadzības	14	2
Ķirši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles.	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles un nevēlamās kultūrauga atvases to aktīvas augšanas periodā pēc kultūrauga ziedēšanas un pēc ražas novākšanas	14	2
Plūmes	Nevēlamās kultūrauga atvases	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles un nevēlamās kultūrauga atvases to aktīvas augšanas periodā pēc kultūrauga ziedēšanas. Atkārtoti pēc vajadzības	14	2
Upenes, jāņogas, ērkšķogas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā pēc kultūrauga ziedēšanas un pēc ražas novākšanas	14	2
Krūmciņonijas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevēlamie kultūrauga dzinumi	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles un kultūrauga nevēlamos dzinumus to aktīvas augšanas periodā pēc kultūrauga ziedēšanas. Atkārtoti pēc vajadzības	14	2
Avenes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevēlamie kultūrauga dzinumi	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles un kultūrauga nevēlamos dzinumus to aktīvas augšanas periodā pirms kultūrauga ziedēšanas un pēc ražas novākšanas	–	2
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Zemeņu stīgas	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles un kultūrauga stīgas to aktīvas augšanas periodā pēc ražas novākšanas	–	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

19. Bazagrāns 480 š.k.

Reģ. Nr. 0024, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: bentazons, 480 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbība.

BASF A/S

Graudaugi ar āboliņa, lucernas vai daudzgadīgo stiebrzāļu pasēju	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12 – 29). Tauriņziežiem un stiebrzālēm jābūt ar 3 lapām, vai arī pasēju veic pēc sējumu apsmidzināšanas	–	1
Zirņi, zirņu un graudaugu mistri	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.5–4.0		Apsmidzināt sējumus zirņu 3–6 lapu stadijā (3–8 cm augsti)	40	1
Dārza pupas, dārza pupiņas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5+1.5 vai 2.0+1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar pupu pirmo īsto lapu stadiju līdz 3 īsto lapu stadijai (līdz 15 cm augstas): <u>1. lietošanas variants</u> Dalītā apstrādē pirmo apstrādi veikt nezāļu dīgļlapu stadijā līdz divām īstajām lapām, atkārtoti pēc jaunu nezāļu dīgšanas pēc 7–10 dienām	49	2
		3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Vienā paņēmienā apstrādi veikt, ja nezāles sasniegušas 4–6 lapu stadiju		1
Lauka pupas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5+1.5 vai 2.0+1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar pupu 1–2 īsto lapu stadiju līdz 3 īsto lapu stadijai (līdz 15 cm augstas): <u>1. lietošanas variants</u> Dalītā apstrādē pirmo apstrādi veikt nezāļu dīgļlapu stadijā līdz divām īstajām lapām, atkārtoti pēc jaunu nezāļu dīgšanas pēc 7–10 dienām	49	2
		3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Vienā paņēmienā apstrādi veikt, ja nezāles sasniegušas 4–6 lapu stadiju		1
Āboliņš, lucerna	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Sējas gadā sējumus apsmidzināt kultūraugu 3 īsto lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti	40	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt sējumus linu “egļītes” fāzē (3–10 cm gari)	–	1

20. Betanal

Reģ. Nr. 0291, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: fenmedifams, 160 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbība.

Bayer CropScience AG

Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	2.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles, līdz zemeņu ziedēšanas sākumam, nezāļu dīgļlapu stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5–14 dienām	–	3
Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles, līdz zemeņu ziedēšanas sākumam, nezāļu pirmo īsto lapu stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5–14 dienām	–	2



1	2	3	4	5	6	7
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus nezāļu dīgļlapu stadijā neatkarīgi no biešu attīstības stadijas, ne vēlāk kā biešu 8 lapu attīstības stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5–14 dienām	–	3

21. Betanal Expert

Reģ. Nr. 0350, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: desmedifams, 71 g/l,
fenmedifams, 91 g/l,
etofumezāts, 112 g/l.

Selektīvs, sistēmas un pieskares iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Bayer CropSciences AG

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē nezāļu dīgļlapu stadijā, neatkarīgi no biešu attīstības stadijas cukurbiešu un lopbarības biešu sējumos, galda bietēm jābūt vismaz dīgļlapu attīstības stadijā. Atkārtoti pēc 5–10 dienām	90	3
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāles	1.3 atkārtoti 1.7		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, kad bietēm vismaz 2 īstās lapas (ne vēlāk kā nezāļu 2 īsto lapu stadijā). Atkārtoti pēc 5–10 dienām	90	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt sējumus, kad bietēm vismaz 4 īstās lapas	90	1

22. Bokseris 800 e.k.

Reģ. Nr. 0271, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumu.

Neliotot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz divu lapu stadijai (AS 12)	–	1
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0		Apsmidzināt stādījumu pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu dīgšanas un līdz pirmie dīgsti ir 5 cm augsti (AS 11)	–	1
Ķīmenes, lupīna	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1
Zirņi					75	1

23. Brasan 540 EC

Reģ. Nr. 0320, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetahlor, 500 g/l,
klomazons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

Neliotot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Pieļaujama maksimālā darbīgās vielas dimetahlor daudzums ir 1 kg/ha reizi trijos gados tajā pašā laukā	–	1
-------------------------------	--	-----	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

24. Butisan 400

Reģ. Nr. 0037, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metazahlori, 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

BASF A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pēc rapša sējas vai pēc rapša sadīgšanas nezāļu dīgšanas laikā vai, vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā. Pieļaujamais maksimālais kopējais darbīgās vielas metazahlori daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laikā posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlori	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus pēc rapša sējas vai pēc rapša sadīgšanas nezāļu dīgšanas laikā vai, vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā. Pieļaujamais maksimālais kopējais darbīgās vielas metazahlori daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laikā posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlori	–	1
Galviņkāposti, ziedkāposti, lopbarības kāposti	Īsmūža divdīgļlapju un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas, stādījumus apsmidzināt 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas. Pieļaujamais maksimālais kopējais darbīgās vielas metazahlori daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laikā posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlori	–	1

25. Butisan Star

Reģ. Nr. 0037, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlori, 333 g/l,

kvinmeraks, 83 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

BASF A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas vai pēc rapša sadīgšanas, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai. Pieļaujamais maksimālais kopējais darbīgās vielas metazahlori daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laikā posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlori	–	1
-------------------------------	--	---------	--	---	---	---

26. Butoksone š.k.

Reģ. Nr. 0138, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPB, 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Zirņi, pupas, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš, galega	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, kad zirņiem 3–6 lapas, āboliņam 3 īstās lapiņas	–	1
--	---	---------	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

27. Caliban Duo

Reģ. Nr. 0360, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: Na –propoksikarbazons, 168 g/kg,

Na metil-jodosulfurons, 10 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Stähler Interanational GmbH & Co. KG

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdiġllapju nezāles, parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	0.250		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz graudaugu cerošanas beigām (AS 29)		
Ziemas kvieši, tritikāle	Īsmūža divdiġllapju nezāles, peļastīšu lapsate (<i>Alopecurus myosuroides</i>), ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	0.333		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz graudaugu cerošanas beigām (AS 29)	–	1

28. Ceridor MCPA 750 š.k.

Reģ. Nr. 0345, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju un vasarāju graudaugi	Īsmūža divdiġllapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājos – atjaunojoties veģetācijai, vasarājos – kad graudaugiem ir 3–4 lapas, līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdiġllapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem ir 3–4 lapas, (āboliņam 1–2 lapas), līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdiġllapju nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete (spēcīgākie augi 15–25 cm augsti), līdz graudaugu stiebrošanai	–	1
Lini	Īsmūža divdiġllapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš	Īsmūža divdiġllapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības un pļavas	Divdiġllapju nezāles	2.0		Apsmidzināt laukus pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	20	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdiġllapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus, pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušas 3–4 lapas	–	1

29. Chwastox 750 SL

Reģ. Nr. 0376, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Zakłady Chemiczne “Organika Sarzyna” S.A.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdiġllapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdiġllapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

30. Dalgis š.k.

Reģ. Nr. 0286, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, 7 dienas pirms plaušanas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaušanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skujas un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršanai pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

31. Devrinols s.k.

Reģ. Nr. 0252, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: napropamīds, 450 g/l.

Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm.

United Phosphorus Limited

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2–3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	–	1
-------------------------------	-----------------------------	-----	--	--	---	---

32. Dicoherb Super 750 SL

Reģ. Nr. 0390, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: MCPA, 660 g/l,

dikamba, 90 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūraugu cerošanas fāzes beigām (AS 29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13–29)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

33. DMA 6 2.4-D Retro š.k.

Reģ. Nr. 0108, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: 2.4-D, 55.3 %.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas rudzi	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam	–	1
Vasaras kvieši, mieži, rudzi, auzas		1.0– 1.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar 4–6 lapu stadiju kviešiem, miežiem un 3–4 lapu stadiju auzām, līdz stiebrošanas fāzes sākumam	–	1
Lopbarības stiebrzāļu sēklu lauki: timotiņš		1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu cerošanas fāzē	–	1
Kamolzāle		0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus kamolzāles cerošanas fāzes sākumā	–	1
Plāvas lapsaste, bezakotu lācauza		1.0		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu cerošanas fāzē	–	1
Plāvas auzene, ganību airene	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 2–4 lapu stadijā vai cerošanas fāzē	–	1
Plāvas skarene (sējas gadā)		1.2		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu cerošanas fāzē	–	1
Ganības	Divdīgļlapju nezāles	0.6– 1.2		Apsmidzināt ganības pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgās nezāles lapu rozetes stadijā)	7	1
Baltais āboliņš (sējas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0– 1.2		Apsmidzināt sējumus sējas gadā pēc āboliņa pirmās īstās lapas parādīšanās	–	1
Kukurūza		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–5 lapu fāzē (kukurūza 5–20 cm gara)	–	1

34. Dominators š.k.

Reģ. Nr. 0285, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu un rapša sējumu apstrāde pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0	2	Kviešus, miežus, auzas – apsmidzināt 7 dienas pirms plaujas, to pilngatavības stadijā. Eļļas rapsi – 14 dienas pirms plaujas (graudu mitrums mazāks par 30 %). Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Augļu dārzi un skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt tos aktīvas augšanas periodā	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršanai pēc nociršanas	–	20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

35. Duplozāns Super š.k.

Reģ. Nr. 0084, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dihlorprops-P, 310 g/l,
mekoprops-P, 130 g/l,
MCPA, 160 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju graudaugi	Divdīgļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt pavasarī nezāļu dīgļlapu vai 2–4 īsto lapu stadijā	–	1
Vasarāju graudaugi (arī ar stiebrzāļu pasēju)		1.5–2.0		Apsmidzināt nezāļu dīgļlapu vai 2–4 īsto lapu stadijā		

36. Ergon

Reģ. Nr. 0357, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 68 g/kg,
metil-tifensulfurons, 682 g/kg.

Sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Rotam Agrochemical Europe Limited

Ziemas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.010		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju līdz pirmā mezgla stadijai (AS 13–31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

37. Estets 600 e.k.

Reģ. Nr. 0305, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: 2.4-D, 600 g/l, (905 g/l 2.4-D 2-etilheksil estera formā).

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atjaunojoties līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 4 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 14–32)	–	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no kukurūzas 2 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 12–16)	–	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz karoglapas maksts paplašināšanās stadijai (AS 21–41)	–	1
Ganības, pļavas (bez tauriņziežiem)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Pavasarī, no kultūraugu cerošanas līdz karoglapas maksts paplašināšanās stadijai (AS 21–41), daudzgadīgās nezāles agrīnā attīstības stadijā vai kad tām izveidojusies lapu rozete	28	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

38. Fenix

Reģ. Nr. 0283, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 litrs un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: aklonifēns, 600 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbība, augi dīgstot, uzņem caur hipokotilu, koleoptili un dīgļlapām.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Bayer CropScience AG

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt stādījumus vismaz vienu nedēļu pirms kartupeļu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Zirņi, lauka pupas	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt sējumus vismaz vienu nedēļu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Burkāni	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pirms burkānu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
		1.5+1.0		<u>2. lietošanas variants</u> 1. reizi, pirms burkānu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2. reizi, burkānu 2 īsto lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	–	2
Sīpoli	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pirms sīpolu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5+1.0		<u>2. lietošanas variants</u> 1. reizi, pirms sīpolu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2. reizi, sīpolu 1–2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	–	2
Pastinaki, sakņu pētersīļi, ķimenes, ķiploki	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus vismaz vienu nedēļu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Egles, priedes, lapegles kokaudzētavās	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus agri pavasarī, kad vēl nav sākusies jauno dzinumu augšana, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1

39. Fiesta T

Reģ. Nr. 0174, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: hloridazons, 360 g/l,

kvinmeraks, 60 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

BASF A/S

Cukurbietes, lopbarības bietes	Īmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.5–6.0		Apsmidzināt augsni pirms sējas (iestrādā augsni līdz ar sējas darbiem) vai pēc sējas pirms kultūrauga sadīgšanas. Pieļaujamais maksimālais darbīgās vielas hloridazons daudzums ir 2.6 kg/ha reizi trijos gados tajā pašā laukā	–	1
--------------------------------	---	---------	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

40. Flaits s.k.

Reģ. Nr. 0292, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pendimetalīns, 330 g/l,
pikolīnafēns, 7.5 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, kultūrauga 1–3 lapu stadijā (AS 11–13), kad nezāles ir dīgllapu līdz pirmo īsto lapu stadijā	–	1
---	---	---------	--	---	---	---

41. Flight Forte

Reģ. Nr. 0293, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pendimetalīns, 320 g/l,
pikolīnafēns, 16 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, kultūrauga 1–3 lapu stadijā (AS 11–13), kad nezāles ir dīgllapu līdz pirmo īsto lapu stadijā	–	1
---	---	---------	--	---	---	---

42. Fokuss Ultra e.k.

Reģ. Nr. 0065, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cikloksidīns, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

BASF A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes, kartupeļi, kāposti, burkāni, zirņi, lini	Ložņu vārpata	1.5–2.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt, kad vārpatai ir 3–5 lapas. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dašs 0.5–1.0 l/ha	–	1
		1.0–1.5		<u>2. lietošanas variants</u> Pirmo reizi apsmidzināt, kad vārpatai ir 3–5 lapas, atkārtoti, kad vārpata ir ataugusi. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dašs 0.5–1.0 l/ha	–	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Rudzu smilga, vējauza u.c. īsmūža stiebrzāles (izņemot maura skareni)	1.0–1.5		Apsmidzināt nezāļu 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dašs 0.5–1.0 l/ha	–	1
Lini	Linu airene	1.0–1.5		Apsmidzināt linu aireni 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dašs 0.5–1.0 l/ha	–	1
Zemenes	Ložņu vārpata	1.0–1.5		Apsmidzināt pēc vārpatas sadīgšanas pirms zemeņu ziedēšanas sākuma un pēc ražas novākšanas. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dašs 0.5–1.0 l/ha	40	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

43. Fox 480 SC

Reģ. Nr. 0375, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: bifenokss, 480 g/l.

Pieskares iedarbības herbicīds.

Feinchemie Schwebda GmbH

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdiģļlapju nezāles	0.75–1.0		<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 3 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS13–16)	–	1
		0.5		<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 3 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS13–16), nezāļu diģļlapu līdz divu īsto lapu stadijā. Atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

44. Foxtrot 69 EW

Reģ. Nr. 0408, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l.

Selektīvs pieskares un sistēmas iedarbības herbicīds.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas īsmūža viendiģļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	–	1
Ziemas mieži	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas īsmūža viendiģļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas īsmūža viendiģļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu lapu stadijas līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 12–32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	–	1

45. Fusilade Forte 150 EC

Reģ. Nr. 0182, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P, 150 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Limited

Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža viendiģļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt augļu koku apdobses, kad nezālēm 2–3 lapas, pirms kultūrauga ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	42	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.0–2.5		Apsmidzināt augļu koku apdobses, kad nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, pirms kultūrauga ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas		
Upenes, jānogas, avenes	Īsmūža viendiģļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt ogulāju apdobses, kad nezālēm 2–3 lapas, pirms kultūrauga ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	42	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.0–2.5		Apsmidzināt ogulāju apdobses, kad nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, pirms kultūrauga ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

46. Galera š.k.

Reģ. Nr. 0313, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klopīralīds, 267 g/l,
piklorams, 67 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nasegti ar lapām (AS 50)	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nasegti ar lapām (AS 14–50)	-	1

47. GAT Stake 20 EC

Reģ. Nr. 0392, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluoksipīrs, 200 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

GAT Microencapsulation AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūrauga divu lapu stadijas (AS 12)	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0		<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 45)		
Rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga viena mezgla stadijai (AS 31)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39)	–	1
Auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz viena mezgla stadijai (AS 12–31)	–	1
Kukurūza (lopbarībai)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 6 lapu stadijai (AS 13–16)	–	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sējas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju	–	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklu lauki)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	–	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles) Permanent grassland/rotational grassland	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	28	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

48. Glifogans 360 š.k.

Reģ. Nr. 0114, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–5.0			–	1
Kviešu, miežu, auzu, rapša, zirņu, pupu, linu sējumu apstrāde pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaušanas, rapša, linu, pupu un zirņu sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaušanas. Nelietot sēklaudzēšanas sējumos	–	1
Augļu dārzi, skuju koku un lapu koku stādījumi		3.0–5.0		Apsmidzināt rudenī pēc lapu nobīršanas, vai veģetācijas laikā, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus	–	1

49. Glifomaks š.k.

Reģ. Nr. 0175, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu un rapša sējumu apstrāde pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0	2	Kviešus, miežus, auzas – apsmidzināt 7 dienas pirms plaušanas, to pilngatavības stadijā. Eļļas rapši – 14 dienas pirms plaušanas (graudu mitrums mazāks par 30 %). Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Augļu dārzi un skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt tos aktīvas augšanas periodā	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

50. Glifomaks Plus š.k.

Reģ. Nr. 0316, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Tirumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	2.0		Apsmidzināt nezāles/labības – sārņaugus pavasarī 1–10 dienas pirms pirmssējas augsnes apstrādes vai kultūrauga sējas vai stādīšanas	–	1
Tirumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt vārpatu un citas daudzgadīgās nezāles pavasarī. Augsnes apstrādi un sēju vai stādīšanu veikt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
Tirumu apstrāde pirms kultūraugu dīgšanas/ pēc sējas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	2.0		Apsmidzināt augošas nezāles/ labības – sārņaugus vienu dienu pēc kultūrauga sējas. Kultūraugu sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Rapsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt rapša sējumus 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt sējumus aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75% no pākstīm ir brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Augļu dārzi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apstrāde veicama rudenī pēc ražas novākšanas. Apsmidzināt augošas nezāles, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apstrāde veicama rudenī. Apsmidzināt augošas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

51. Glifoss š.k.

Reģ. Nr. 0012, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Cheminova A/S

Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	2
Skuju koku jaunie stādījumi		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	2
Ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu un rapša sējumu apstrāde pirms plaušanas		2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, 7 dienas pirms plaušanas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaušanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	2

52. Glifoss Suprīm š.k.

Reģ. Nr. 0294, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 450 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Cheminova A/S

Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Ziemas kviešu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumu apstrāde pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–4.8		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapša sējumu apstrāde pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–3.2		Apsmidzināt rapša sējumus pirms plaušanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Augļu dārzi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus, vai rudenī pēc lapu nobiršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

53. Glīns 75 d.g.

Reģ. Nr. 0032, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: hlorsulfurons, 750 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Lini	Divdiģļlapju nezāles	0.005–0.007		Apsmidzināt sējumus linu “egļītes” fāzē (3–10 cm gari), nezāļu diģļlapu vai pirmo 2 īsto lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu – 50–100 ml/100 l darba šķidruma	–	1
------	----------------------	-------------	--	---	---	---

54. Glyphomax 480

Reģ. Nr. 0386, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 480 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	2.25–4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	1.5–2.25		Apsmidzināt kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus pilngatavības stadijā aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	2.25–3.0		Apsmidzināt sējumus 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	1.5–2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75% no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	1.5–2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 2/3–3/4 no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	1.125–1.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	2.25–3.0				
Tīrumu apstrāde pēc zālāju sēklu lauku novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	2.25–4.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	0.75–1.5		Apsmidzināt vārpatu un citas daudzgadīgās nezāles pavasarī. Vārpatai vēlamas 3–4 lapas apstrādes brīdī. Augsnes apstrādi un sēju vai stādīšanu veikt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīģļlapju un divdiģļlapju nezāles	2.25–3.0				

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumu apstrāde pēc sējas, bet pirms kultūraugu dīgšanas, lietojot minimālo apstrādi vai tiešo sēju	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.125 2.25–3.0		Apsmidzināt augošas nezāles/ labības – sārņaugus vienu dienu pēc kultūrauga sējas. Kultūraugu sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Plūmes, ķirši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms plūmju un ķiršu ziedpumpuru atvēršanās vai rudenī pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu atvases	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.5		Apstrāde veicama rudenī, kad koku pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši. Apsmidzināt augošas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrāde ir veicama laikā, kad koku sulas kustība ir virzienā uz saknēm, parasti no oktobra līdz februāra beigām	–	1

55. Golden Metaz 500 SC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 7, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metazahlori, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Goldengrass Ltd

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju. Pielaujamais maksimālais kopējais darbīgās vielas metazahlori daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laikā posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlori	–	1
-------------------------------	--	-----	--	--	---	---

56. Golden Piccant 334 SL

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 8, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klopīralīds, 267 g/l,

piklorams, 67 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Goldengrass Ltd

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus pavasarī, pēc veģetācijas atjaunošanās, līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nosegti ar lapām (AS 50)	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nosegti ar lapām (AS 14–50)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

57. Goltiks 70 p.s.

Reģ. Nr. 0029, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metamitrons, 70 %.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Makhteshim-Agan Holland B. V.

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt biešu sējumus pa dīgstošām nezālēm (neatkarīgi no biešu attīstības fāzes), maisījumā ar Betanāls Eksperts 1.0–1.25 l/ha	–	1
		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus atkārtoti nezāļu dīgļlapu fāzē maisījumā ar Betanāls Eksperts 1.0–1.25 l/ha, pēc 7–20 dienām	–	2
Zemenes		5		Apsmidzināt zemeņu stādījumus agri pavasarī zemeņu veģetācijas sākumā vai pēc ražas novākšanas, nezāļu dīgļlapu līdz pirmo divu īsto lapu stadijā	–	1

58. Goltiks 700 s.k.

Reģ. Nr. 0155, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metamitrons, 700 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt biešu sējumus pa dīgstošām nezālēm neatkarīgi no biešu attīstības stadijas, nepieciešamības gadījumā maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
		2.0		Apsmidzināt biešu sējumus atkārtoti, kad lielākā daļa nezāļu ir dīgļlapu stadijā, nepieciešamības gadījumā maisījumā ar piemērotu preparātu	–	2

59. Granstars Prēmija 50 š.g.

Reģ. Nr. 0255, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.0150– 0.0225		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airones pasēju	Divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), kad stiebrzāles ir 2–3 lapu stadijā (AS 12–13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

60. Grasps 400 s.k.

Reģ. Nr. 0261, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tralkoksidīms, 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	0.60–0.85		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 39), nezāļu 2 lapu stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Parastā rudzūsmilga (<i>Apera spica- venti</i>)	0.60–0.85		Apsmidzināt sējumus rudenī vai pavasarī, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas sākumam. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Daudzziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>)	0.6		Apsmidzināt sējumus: 1. rudenī, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas (AS 12), nezāļu 3 lapu stadijā līdz divu sānu dzinumu stadijai. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	2
		0.8		2. pavasarī līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 39), nezāļu 3 lapu līdz trešā mezgla parādīšanās stadijai. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	0.60–0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21–39), nezāļu 2 lapu stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Daudzziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>)	0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21–39), nezāļu 3 lapu stadijā līdz stiebrošanas sākuma stadijai. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

61. Grodils 75 d.g.

Reģ. Nr. 0028, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: amidosulfurons, 75 %.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02–0.04		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 49)	–	1
Vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02–0.04		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu trīs lapu stadijas līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 13–49)	–	1
Pļavas	Zirgskābenes, rudens vēļpiene, lielā nātre	0.06		Apsmidzināt nezāļu lapu rozetes stadijā	21	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

62. Harmonijs 50 š.g.

Reģ. Nr. 0300, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tifensulfurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.0225– 0.0300		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atjaunojoties līdz graudaugu attīstības karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.0225– 0.0300		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar stiebrzāļu, āboliņa vai lucernas pasēju	Divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 12–39), kad stiebrzāles ir 2–3 lapu stadijā (AS 12–13) un āboliņš vai lucerna vienas istās lapas stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 25 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1
Kukurūza (skābbarībai)	Divdīgļlapju nezāles	0.015		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–6 lapu stadijā (AS 13–16). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1
	Divdīgļlapju nezāles	0.01125+ 0.0075		<u>2. lietošanas variants</u> Nevienmērīgas nezāļu dīgšanas gadījumā apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē kukurūzas 3–6 lapu stadijā (AS 13–16). Atkārtotu apstrādi veikt pēc 10–12 dienām vai dīgstot jaunām nezālēm. Iespējams lietot maisījumā ar piemērotu preparātu. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	2
Ganības	Divdīgļlapju nezāles	0.045		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	7	1

63. Hoder 720 SG

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 13, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klopīralīds, 720 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ProEuro Sp z.o.o

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī, no rapša stublāja veidošanās sākuma līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 31–55)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu cerošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (21–37)	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (37)	–	1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1	2	3	4	5	6	7
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–6 lapu stadijā, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā	–	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad usne ir 15–20 cm augsta (rozetes stadijā), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Galviņkāposti	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt stādījumu 2–3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā	–	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad usnes ir 15–20 cm augstas. Neapstrādāt zemeņu stādījumus pavasarī	–	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt sējumus līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 55)	–	1
Egles un baltegles kokaudzētavās	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies un ierobežojamās nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21–37), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15–20 cm (rozetes stadija)	7	1

64. Hussar Activ OD

Reģ. Nr. 0311, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: nātrija metil-jodosulfurons, 10 g/l,
2.4-D 2-etilheksil esteris, 377 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām, nedaudz ar saknēm.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Parastā rudzusrūpīga un citas īsmūža viendiġļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām (AS 29)	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32)		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

65. Jablo š.k.

Reģ. Nr. 0278, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumi pēc ražas novākšanas		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas		2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skujas un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – novērst atvašu augšanu		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

66. Kalibre 50 š.g.

Reģ. Nr. 0301, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-tifensulfurons, 333 g/kg,
metil-tribenurons, 167 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.0225–0.0300		Apsmidzināt sējumus pavasarī veģetācijai atjaunojoties līdz graudaugu attīstības karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1

67. Kalif 360 CS

Reģ. Nr. 0409, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klomazons, 360 g/l.

Selektīvs, augšnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgšiem.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25–0.33		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša un nezāļu sadīgšanas	–	1
---------------	---	-----------	--	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Īsmūža divdiġļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīġļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša un nezāļu sadīġšanas	–	1
Kartupeļi	Īsmūža divdiġļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīġļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt stādījumus ne vēlāk kā 5 dienas pirms kartupeļu un nezāļu sadīġšanas	–	1

68. Kalif Mega

Reġ. Nr. 0410, reġ. klase 2.

Darbīġas vielas: metazahlori, 250 g/l,
klomazons, 33 g/l.

Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīġstiem.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas rapsis	Īsmūža divdiġļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīġļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša sadīġšanas. Pieļaujamais maksimālais kopējais darbīġas vielas metazahlori daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laikā posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlori	–	1
---------------	---	---------	--	--	---	---

69. Kernels 480 š.k.

Reġ. Nr. 0306, reġ. klase 2.

Darbīġa viela: glifosāts, 480 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Cheminova A/S

Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīġas viendīġļlapju un divdiġļlapju nezāles	2.3–3.8	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas. Augsnes apstrādi veikt ne ātrāk kā pēc 14 dienām	–	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūrauga sējas	Īsmūža un daudzgadīġas viendīġļlapju un divdiġļlapju nezāles	2.3–3.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas. Augsnes apstrādi veikt ne ātrāk kā pēc 14 dienām	–	1
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīġas viendīġļlapju un divdiġļlapju nezāles	2.3–3.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas. Augsnes apstrādi veikt ne ātrāk kā pēc 14 dienām	–	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīġas viendīġļlapju un divdiġļlapju nezāles	2.3	1	Apsmidzināt kviešu un miežu sējumus pilngatavības stadijā ne vēlāk kā 14 dienas pirms plaušanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīġas viendīġļlapju un divdiġļlapju nezāles	2.3	1	Apsmidzināt zirņu sējumus, ne vēlāk kā 14 dienas pirms plaušanas, kad 75 % pākšu ir brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīġas viendīġļlapju un divdiġļlapju nezāles	2.3–3.0	1	Apsmidzināt lupīnas sējumus, ne vēlāk kā 14 dienas pirms ražas novākšanas, kad 75 % pākšu ir brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1

1	2	3	4	5	6	7
Lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.3–3.0	1	Apsmidzināt linu sējumus ne vēlāk kā 10 dienas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.3–3.0	1	Apsmidzināt ziemas un vasaras rapša sējumus ne vēlāk kā 14 dienas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Augļu dārzi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.3–3.8	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Aizsargāt augļu koku stumbrus, lapotni un sakņu dzinumus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības (piem., zem elektrības pārvades līnijām, gar dzelzceļa līnijām)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.3–4.5	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Meža kultūru stādu audzētavās un apmežojamās platības pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.3–3.8	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Augsnes apstrādi veikt ne ātrāk kā pēc 14 dienām	–	1
	Virši	3.0–4.5	2	Ja augsnes organiskās vielas saturs ir augsts, tad lietojama zemāka preparāta deva. Ja augsnes organiskās vielas saturs zems, tad lietot augstāku preparāta devu	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.3–3.0	2	Apsmidzināt nezāles un ataugušas krūmu atvases augusta beigās – septembra sākumā, kad skuju koki ir beidzies aktīvās veģetācijas periods un vads ir pārkoksņējies. Sargāt jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	Atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:5–6		Apsmidzināt celmus ar atšķaidītu preparātu pēc koku nozāģēšanas	–	1

70. Kliniks 360 š.k.

Reģ. Nr. 0215, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Nufarm GmbH & Co KG

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanai	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaušanas		2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaušanas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaušanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	1

71. Komplet

Reģ. Nr. 0393, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: flufenacets, 280 g/l,
diflufenikans, 280 g/l.

Pieskares un augsnes iedarbības herbicīds.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūraugu vienas lapas stadijas līdz triju lapu stadijai (AS 11–13)	–	1
---	--	---------	--	---	---	---

72. Legacy 500 SC

Reģ. Nr. 0411, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l.

Selektīvs pieskares iedarbības un augsnes herbicīds.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15–0.20		Apsmidzināt sējumus rudenī, pirms graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 4 lapu stadijai (AS 00–14)	60	1
		0.20		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus pirms graudaugu sadīgšanas, līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 00–31)	60	1

73. Legacy Pro

Reģ. Nr. 0415, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: diflufenikans, 40 g/l,
pendimetalīns, 300 g/l,
hlortolurons, 250 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Makhteshim – Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc graudaugu sadīgšanas līdz 3 lapu stadijai (AS 10–13)	–	1
--	--	-----	--	--	---	---

74. Lentagrāns 45 p.s.

Reģ. Nr. 0330, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piridāts, 450 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Belchim Crop Protection NV

Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūraugu sadīgšanas, kad tie ir vismaz 6 lapu stadijā	42	1
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir izeauguši un ir vismaz 6 lapu stadijā		
Sīpoli (sētie un stādītie)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, tā 2–3 lapu stadijā. Atkārtot pēc 10–12 dienām	56	3



75. Lingo ZC

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.020		Apsmidzināt sējumus graudaugu 2–3 lapu stadijā (AS 12–13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100–250 ml/100 l darba šķidruma	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.0300–0.0375		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 4 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 14–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100–250 ml/100 l darba šķidruma		

78. Lontrel 72 SG

Reģ. Nr. 0388, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klopīralīds, 720 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī no rapša stublāja veidošanās sākuma līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 31–55)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai. AS (21–37)	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz karoglapas parādīšanās stadijai. AS (37)	–	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–6 lapu stadijā, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā	–	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad usne ir 15–20 cm augsta (rozetes stadijā), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Galviņkāposti	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt stādījumu 2–3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā	–	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad usnes ir 15–20 cm augstas. Neapstrādāt zemeņu stādījumus pavasarī	–	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt sējumus līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 55)	–	1
Egles un baltegles kokaudzētavās	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies un ierobežojamās nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21–37), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15–20 cm (rozetes stadija)	7	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

79. MAC glifosāts 360 š.k.

Paralēlā importa atļauja Nr. 3, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

MAC GmbH

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanai	–	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās 15-20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skujas un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

80. Maister OD

Reģ. Nr. 0326, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: foramsulfurons, 30 g/l,

nātrija metil-jodosulfurons, 1 g/l.

Sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Bayer CropScience AG

Kukurūza	Viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus no kukurūzas divu līdz sešu lapu stadijai (AS 12–16), kad nezāles sadīgušas	70	1
----------	---------------------------------------	-----	--	---	----	---

81. MCPA 750

Reģ. Nr. 0135, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atsākoties, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0–1.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3–4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13–30)	–	1
	Tīruma usne, tīruma mikstpiene	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mikstpienei izveidojusies lapu rozete, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)		

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3–4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13–30), kad āboliņam 1–2 īstās lapas	–	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības, pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus, kad stiebrzālēm attīstījušās 3–4 lapas	–	1

82. MCPA Super 500 š.k.

Reģ. Nr. 0119, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, vasaras kvieši, mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3–4 lapu stadijas līdz stiebrošanas fāzes sākumam	–	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju		0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3–4 lapu stadijas līdz stiebrošanas fāzes sākumam (āboliņam 1–2 īstās lapas)	–	1
Sarkanais un baltais āboliņš sējas gadā		0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam 1–2 īstās lapas	–	1
Sarkanais āboliņš sēklu laukos		0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus 2–3 nedēļu laikā pēc veģetācijas perioda atsākšanās, sēklu novākšanas gadā	45 (lopbarībai)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki		1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus sējas gadā no stiebrzāļu 1–2 lapu stadijas līdz stiebrošanas sākumam	–	1
Ganības un pļavas		1.0–1.5		Apsmidzināt nezāļu aktīvas augšanas laikā, daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Lini		1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1

83. Metric ZC

Reģ. Nr. 0344, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klomazons, 60 g/l, mertibuzīns, 233 g/l.

Selektīvs, augi uzņem caur saknēm un dīgšiem, augsnes iedarbība.

Belchim Crop Protection NV

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kartupeļu stādījumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1
-----------	---	-----	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

84. Mezzo d.g.

Reģ. Nr. 0322, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziema kvieši, ziema mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.010–0.020		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1

85. Milagro 4 OD

Reģ. Nr. 0223, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un caur augsni.

ISK Biosciences Europe N.V.

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, kad kukurūzai ir 2–8 lapas	40	1
		1.0+0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–3 lapu stadijā. Otro reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 5–8 lapu stadijā	40	2

86. Milagro Extra 6 OD

Reģ. Nr. 0361, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ISK Biosciences Europe N.V.

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–8 lapu stadijā (AS 12–18)	40	1
		0.5 + 0.25		<u>2. lietošanas variants</u> Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–3 lapu stadijā (AS 12–13), otro reizi, pēc 10–14 dienām, kukurūzas 5–8 lapu stadijā (AS 15–18)	40	2

87. Mistrāls 70 d.g.

Reģ. Nr. 0259, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metribuzīns, 700 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Kartupeļu stādījumos nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Feinchemie Schwebda GmbH

Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–0.7		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pirms kartupeļu sadīgšanas pa tikko sadīgušām nezālēm	42	1
		0.3–0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pēc kartupeļu sadīgšanas nezāļu dīgļlapu vai pirmo īsto lapu stadijā, kad kartupeļu dīgsti ir 8–10 cm gari	42	1
		0.3–0.4 + 0.2–0.3		<u>3. lietošanas variants</u> Apsmidzināt pa tikko sadīgušām nezālēm: 1.reizi pirms kartupeļu sadīgšanas; 2.reizi, kad kartupeļi sasnieguši 8 cm	42	2

1	2	3	4	5	6	7
Burkāni*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.085		Apsmidzināt pirms un pēc burkānu sadīgšanas, līdz burkāni 5–7 cm lieli (BBCH 00–16)	60	3

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51. punktu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem

88. Monitors d.g.

Reģ. Nr. 0145, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: sulfosulfurons, 75 %.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.0267		Apsmidzināt sējumus pavasarī, kad graudaugiem attīstījušās 3 lapas līdz graudaugu 2. mezgla stadijai (AS 13–32), aktīvi augošanas nezāles, to 2–4 lapu stadijā	–	1
	Rudzu smilga	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, kad graudaugiem attīstījušās 3–5 lapas (AS 13–15)	–	1

89. Mustangs s.e.

Reģ. Nr. 0184, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 6.25 g/l, 2.4-D, 300 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4–0.6		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no cerošanas stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 25–32), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1
Vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas		0.4–0.6		Apsmidzināt, sākot no vasarāju graudaugu 2–3 lapu stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 13–32), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1

90. Mustangs Forte s.e.

Reģ. Nr. 0334, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 5 g/l, aminopirālīds, 10 g/l, 2.4-D, 180 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atsākoties, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21–32)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

91. Nicogan

Reģ. Nr. 0413, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 2–8 lapu stadijā (AS 12–18)	40	1
		1.0+0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–3 lapu stadijā (AS 13–14), otro reizi, pēc 10–14 dienām, kukurūzas 5–8 lapu stadijā (AS 15–18)	40	2

92. Niklos 40 SC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 14, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un caur augsni.

ProEuro Sp z.o.o

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, kad kukurūzai ir 2–8 lapas	40	1
		1.0+0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–3 lapu stadijā. Otro reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 5–8 lapu stadijā	40	2

93. Nimbus

Reģ. Nr. 0328, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 250 g/l,

klomazons, 33.3 g/l.

Sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

BASF A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai. Pieļaujama maksimālā kopējais darbīgās vielas metazahlor daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laika posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlor	–	1
---------------	--	---------	--	---	---	---

94. Nortrons 50 s.k.

Reģ. Nr. 0013, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etofumezāts, 500 g/l.

Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Bayer CropScience AG

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt biešu sējumus nezāļu dīgļlapu stadijā (arī maisījumā ar piemērotu preparātu)	90	3
		1.0		Apsmidzināt sējumus, kad bietēm ir vismaz 2 istās lapas, nezālēm ne vairāk par 4 istām lapām. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu dīgšanas pēc 5–10 dienām (arī maisījumā ar piemērotu preparātu)	90	2
		2.0		Apsmidzināt sējumus, kad bietēm ir vismaz 4 istās lapas, nezālēm ne vairāk par 6 istām lapām (arī maisījumā ar piemērotu preparātu)	90	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

95. Nozomi p.s.

Reģ. Nr. 0323, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: flumioksazīns, 500 g/kg.

Vispārējs pieskares iedarbības herbicīds.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dzelzceļa sliežu ceļi un to apmales	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.2		Apsmidzināt nezāles agrās attīstības stadijās. Nepieciešamības gadījumā veidot tvertnes maisījumu ar piemērotu preparātu	–	1
-------------------------------------	--	-----	--	--	---	---

96. Nuance 75 WG

Reģ. Nr. 0403, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz ar saknēm.

Chemnova A/S

Ziema kvieši, ziema mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūraugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.012–0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39)	60	1

97.1. Nufarm MCPA 750 š.k.

Reģ. Nr. 0045, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju un vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājos atjaunojoties veģetācijai, vasarājos, kad graudaugiem ir 3–4 lapas, līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem ir 3–4 lapas, (āboliņam 1–2 lapas), līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne, tīruma mikstpiene	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mikstpienei izveidojusies lapu rozete (spēcīgākie augi 15–25 cm augsti), līdz graudaugu stiebrošanai	–	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības un pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt laukus pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	20 (ganīt un pļaut zāli)	1



1	2	3	4	5	6	7
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušas 3–4 lapas	–	1
Zāliens	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt zālienu pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	–	1

97.2. Nufarm MCPA 750 š.k.

Reģ. Nr. 0045, reģ. klase 3., iepakojumiem 100 ml un mazākiem.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zāliens	Divdīgļlapju nezāles	20		Apsmidzināt zālienu pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	–	1

98. Nuflon

Reģ. Nr. 0366, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: linurons, 450 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.

Belchim Crop Protection NV

Kartupeļi, zirņi, lauka pupas, sakņu pētersīļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūrauga sējas vai stādīšanas – pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas	90	1
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt burkānu sējumus pēc burkānu sējas, pirms burkānu un nezāļu sadīgšanas	90	1
		1.5		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt burkānu sējumus pēc burkānu sadīgšanas, burkānu 2–3 īsto lapu stadijā (AS 12–13)		

99. Optika Trio š.k.

Reģ. Nr. 0248, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dihlorprops–P, 310 g/l,

mekoprops–P, 130 g/l,

MCPA, 160 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt pavasarī līdz graudaugu cerošanas stadijas beigām (AS 30)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži		1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 5 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 15–30)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

100. Pantēra 4 e.k.

Reģ. Nr. 0171, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tefurilkvizalofops-P, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kartupeļi, cukurbietes, galda bietes, lopbarības bietes, lini, zirņi, pupas	Viengadīgās viendīgļlapju nezāles, labība – sārņaugi	1.0		Apsmidzināt kultūrauga sējumu vai stādījumu nezāļu divu lapu stadijā	60	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kultūrauga sējumu vai stādījumu nezāļu 4–6 lapu stadijā vai, kad nezāles 10–15 cm garas		

101. Piccoli 334 SL

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 12, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klopīralīds, 267 g/l,

piklorams, 67 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ProEuro Sp z.o.o

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus pavasarī, pēc veģetācijas atjaunošanās, līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nasegti ar lapām (AS 50)	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nasegti ar lapām (AS 14–50)	–	1

102. Primus XL

Reģ. Nr. 0387, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 5 g/l,

fluoksipīrs, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	–	1
Vasaras mieži, vasaras kvieši ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 20–31)	–	1

103. Primuss s.k.

Reģ. Nr. 0172, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.06–0.10		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no cerošanas stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1
---	--	-----------	--	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7
Vasaras mieži, vasaras kvieši un auzas tīrsējā (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.06–0.10		Apsmidzināt, sākot no vasarāju graudaugu 2–3 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1
Stiebrzāļu sējumi (arī sēklu lauki)		0.1		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1

104. Protugan Super

Reģ. Nr. 0414, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: izoproturons, 300 g/l,

bifenokss, 150 g/l,

mekoprops-P, 145 g/l.

Selektīvs, pieskares, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem, lapām un saknēm.

Feinchemie Schwebda GmbH

Ziemas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūraugu cerošanas fāzes beigām (AS 29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13–29)	–	1

105. Puma Universal

Reģ. Nr. 0131, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Parastā rudzuzmilga, vējauza un citas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām. Iespējams lietot maisījumos ar piemērotu preparātu	28	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži		0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu trīs lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 13–32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām. Iespējams lietot maisījumos ar piemērotu preparātu	28	1

106. R-20

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 16, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Advagro Ltd

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.010–0.020		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

107. Raundaps Eko š.k.

Reģ. Nr. 0173, reģ. klase 2., iepkojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0	2	Apsmidzināt rapša sējumus 14 dienas pirms plaujas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā	–	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles, nevietā augošus krūmus un kokus aktīvas augšanas periodā	–	1
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

108. Raundaps FL 360 š.k.

Reģ. Nr. 0317, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaušanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt rapša sējumus 14 dienas pirms plaušanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvas augšanas periodā, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles, nevietā augošus krūmus un kokus aktīvas augšanas periodā	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

109. Raundaps Gold ST š.k.

Reģ. Nr. 0318, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 450 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–2.4		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–2.4		Apsmidzināt rapša sējumus 14 dienas pirms plaujas, kad sēklu mitrums zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–4.8		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvas augšanas periodā, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevietā augoši koki un krūmi	2.4–4.8		Apsmidzināt nezāles, nevietā augošus krūmus un kokus aktīvas augšanas periodā	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		15	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

110. Raundaps Klasiks š.k.

Reģ. Nr. 0015, reģ. klase 2., 1.0 l iepakojumiem un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skuju un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
111. Raundaps Maks d.g.						
Reģ. Nr. 0331, reģ. klase 2.						
Darbīgā viela: glifosāts, 68%.						
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.						
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S						
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, zirņi, lauka pupas, sinepes, lini, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, la- bības – sārņaugi	0.75		Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Sparģeļi pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–2.5		Apsmidzināt stādījumu pirms kultūraugs sadīdzis	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt graudaugu sējumus pirms plaujas pilngatavības stadijā, kad graudu mitruma saturs graudos ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Zirņi, lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt zirņu un pupu sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Sinepes pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	8	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas	–	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–3.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–5 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem	–	1

112. Reglons Super š.k.

Reģ. Nr. 0087, reģ. klase 2.
 Darbīgā viela: dikvāts, 150 g/l.
 Pieskares iedarbība.
Syngenta Limited

Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus pirms kartupeļu sadīgšanas, pa sadīgušām nezālēm	–	1
-----------	--	---------	--	---	---	---

113. Reindžers š.k.

Reģ. Nr. 0192, reģ. klase 2., 1.0 l iepakojumiem un mazākiem, reģ. klase 3.
 Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
 Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skuju un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – novērst atvašu augšanu		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

114. Rodeo š.k.

Reģ. Nr. 0159, reģ. klase 2., 1.0 l iepakojumiem un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumi pēc ražas novākšanas		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	2
Ziema kvieši, ziema mieži, vasara kvieši, vasara mieži, auzas, rapsis pirms plaušanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaušanas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaušanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skujas un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – novērst atvašu augšanu		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

115. Rosate 36 š.k.

Reģ. Nr. 0348, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Albaugh Europe SARL

Kvieši, cietie kvieši, mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–4.0		Apsmidzināt sējumus pilngatavības stadijā, kad graudu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Zirņi, lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt zirņu un pupu sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%, vismaz 7 dienas pirms ražas novākšanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Eļļas lini, rapsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 14 dienas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Sinepes pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sinepju sējumus ne vēlāk kā 8 dienas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	8	1
Kvieši, cietie kvieši, mieži, auzas, zirņi, lauka pupas, rapsis, sinepes, eļļas lini, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli un puravi pirms kultūraugu sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešu, cieto kviešu, miežu un auzu sējumus apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas. Pārējo kultūraugu sējumus – 48 stundu laikā pēc sējas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10 cm garas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas		
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs (zem elektrības un gāzes pārvades līnijām, ap dzelzceļu uzbērumiem un gar automaģistrālēm)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas	–	–
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai rudenī pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Plūmes, ķirši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms plūmju un ķiršu ziedpumpuru atvēršanās vai rudenī pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām izveidojušās 4–5 lapas, un tās ir 10–20 cm garas. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	–	1
Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus		
	Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes	3.0	2	Apsmidzināt kokaugus – sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanas	–	1
	Virši	4.0–6.0	2	Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus		

1	2	3	4	5	6	7
Koku retināšana mežā, injicējot stumbrā	Lapu koki, skuju koki	2 ml uz 10 cm koka diametru		Injicējot koku stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Koki ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma, un injicēti 2 ml katrā reizē	–	1
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi		10	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1
	Skuju koku celmi		20	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1

116. Roundup ACE

Reģ. Nr. 0205, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 450 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas		1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		2.4–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6–2.4		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaušanas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaušanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi		1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		1.6–4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības		2.4–4.8		Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		15	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

117. Roundup FL 540

Reģ. Nr. 0268, reģ. klase 2., 1.0 l iepakojumiem un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 540 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.3–4.0	1	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības		1.3–4.0	1	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi, skuju koku jaunie stādījumi		2.0–4.0	1	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus un jauno skuju kociņu skujas un stumbrus	–	2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nevietā augoši koki un krūmi	1.3–4.0	1	Apsmidzināt aktīvas augšanas periodā	–	2
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršanai pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

118. Roundup Garden

Reģ. Nr. 0369, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 120 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Lietošanas vieta	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Pirms koku, krūmu, daudzgadīgo puķu stādīšanas, zālāja ierīkošanas, zem dekoratīvajiem kokiem un krūmiem, zem augļu kokiem, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, neapstrādātās platībās (papuve, atmata, l/s produkcijas ražošanai neizmantojamās platības), kā arī veģetācijas ierobežošanai pie ēku pamatiem, starp plātnēm uz taciņām un piebraucamiem ceļiem	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	100		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas. Zem augļu kokiem neveikt smidzināšanu ražas nogatavošanās un novākšanas laikā	–	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	200		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas. Zem augļu kokiem neveikt smidzināšanu ražas nogatavošanās un novākšanas laikā		

119. Roundup Quick

Reģ. Nr. 0370, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 7.2 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Lietošanas vieta	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Zem dekoratīvajiem kokiem un krūmiem, zem augļu kokiem, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, neapstrādātās platībās, l/s produkcijas ražošanai neizmantojamās platībās, kā arī veģetācijas ierobežošanai starp plātnēm uz taciņām un piebraucamiem ceļiem	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.33		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas. Zem augļu kokiem neveikt smidzināšanu ražas nogatavošanās un novākšanas laikā	–	1

120. Sekators 375 OD s.k.

Reģ. Nr. 0260, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: amidosulfurons, 100 g/l,
nātrija metil-jodosulfurons, 25 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz saknēm.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne	0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu karoglapas parādīšanās stadijai (AS 37)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži		0.1–0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3 lapu stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 13–37)	–	1

121. Starane 180 e.k.

Reģ. Nr. 0140, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipīrs, 180 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5–0.7		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39)	–	1
Daudzgadīgās stiebrzāles	Divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad stiebrzālēm 3–4 lapas. Daudzgadīgās nezāles sējumā apsmidzināt, kad tām ir izveidojusies lapu rozete	7	1
Ganības un pļavas (lokāli lietošanai)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	7	1
Zāliens golfa laukumā, parkā, skvērā (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt zāliena zelmeni, kad īsmūža nezāles ir sadīgušas un stiebrzāles ir 3–4 lapu stadijā. Daudzgadīgās nezāles zālienā apsmidzināt, kad tām ir izveidojusies lapu rozete	–	1
Piemājas zāliens un mauriņš (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0 vai 15–20 ml/100 m ²		Apsmidzināt zāliena zelmeni, kad īsmūža nezāles ir sadīgušas un stiebrzāles ir 3–4 lapu stadijā. Daudzgadīgās nezāles zālienā apsmidzināt, kad tām ir izveidojusies lapu rozete	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

122. Starane XL s.e.

Reģ. Nr. 0277, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluoksipirs, 100 g/l,
florasulams, 2.5 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	56	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)		0.8–1.0		Apsmidzināt, sākot no graudaugu cerošanas fāzes sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	56	1
Ganību airesnes, sarkanās auzenes, pļavas skārenes sēklu lauki		1.5–1.8		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	–	1
Ganības (zelmenī stiebrzāles)		1.5–1.8		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz stiebrzāļu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	14	1

123. Stomps e.k.

Reģ. Nr. 0007, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pendimetalīns, 330 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kultūrauga 1–2 lapu stadijā	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži ar āboliņa vai lucernas pasēju	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga 1–2 lapu stadijai, kad āboliņam vai lucernai ir 1–2 lapas, maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži maisījumā ar zirņiem	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai	–	1
Sīpoli	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) vai izstādīšanas, pirms kultūrauga dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 6 l/ha	–	2
Ķiploki	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt pēc izstādīšanas, līdz kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 6 l/ha	–	2
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas (sēkla iestrādāta 2 cm dziļi)	–	1
Sakņu pētersīļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas (sēkla iestrādāta 2 cm dziļi)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Kukurūza	Īsmūža viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas	–	1
Lauka pupas	Īsmūža viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, līdz kultūrauga sadīgšanai	–	1
Narcises, tulpes	Īsmūža viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	5.0		Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas	–	1

124. Sultāns 500 s.k.

Reģ. Nr. 0245, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgllapju un atsevišķas īsmūža viendīgllapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, nezāļu dīgllapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju. Pielaujamais maksimālais kopējais darbīgās vielas metazahlor daudzums ir 1 kg/ha triju gadu laika posmā vienā un tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir metazahlor	–	1
-------------------------------	--	-----	--	--	---	---

125. Symbol

Reģ. Nr. 0364, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

United Phosphorus Limited

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, cietie kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas, zirņi (graudiem), lauka pupas, ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, eļļas līni, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgllapju un divdīgllapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pēc kultūrauga sējas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Sparģeļi pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	1.5–5.0		Apsmidzināt stādījumu pirms kultūrauga sadīgšanas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt graudaugu sējumus pirms plaujas pilngatavības stadijā, kad graudu mitruma saturs graudos ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgllapju un divdīgllapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt zirņu un pupu sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziņas rapsis, vasaras rapsis, eļļas lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Sinepes pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	8	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 4–5 lapas	–	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–5 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–5 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai rudenī pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms plūmju un ķiršu ziedpumpuru atvēršanās vai rudenī pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz apstrādei nepakļautiem augiem	–	1

126. Taifūns B š.k.

Reģ. Nr. 0027, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Feinchemie Schwebda GmbH

Ziņas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt graudaugu sējumus pirms plaujas pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Zirņi (graudiem) pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–5.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4–5 lapas un nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–5.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4–5 lapas un nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		3.0–5.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4–5 lapas un nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Augļu dārzi		3.0–5.0	2	Apsmidzināt rudenī pēc lapu nobīršanas vai veģetācijas laikā, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus	–	1

127. Targa Super

Reģ. Nr. 0383, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība augi uzņem caur lapām.

Bayer CropScience AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	0.75–1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12–29)	75	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15–20 cm augsta		
Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	0.75–1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12–29)	–	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15–20 cm augsta		

128. Teridox 500 EC

Reģ. Nr. 0051, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dimetahlor, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus tūlīt pēc kultūrauga sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Pieļaujamais maksimālais darbīgās vielas dimetahlor daudzums ir 1 kg/ha reizi trijos gados tajā pašā laukā	–	1
-------------------------------	--	-----	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

129. Titus 25 d.g.

Reģ. Nr. 0059, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Kartupeļi	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03–0.05		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķiduma	–	1
		0.03+0.02		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7–10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķiduma	–	2
Kukurūza	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03–0.05		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķiduma	–	1
		0.03+ 0.02		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7–10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķiduma	–	2

130. Tombo d.g.

Reģ. Nr. 0335, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pirosulams, 50 g/kg,

florasulams, 25 g/kg,

aminopirālids, 50 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15–0.20		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atsākoties, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 21–32)	–	1

131. Tomigans 180 e.k.

Reģ. Nr. 0324, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluoksipirs, 180 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5–0.7		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39)	–	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Daudzgadīgās stiebrzāles	Divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad stiebrzālēm 3–4 lapas. Daudzgadīgās nezāles sējumā apsmidzināt, kad tām ir izveidojusies lapu rozete	7	1
Ganības un pļavas (lokālai lietošanai)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	7	1
Zāliens golfa laukumā, parkā, skvērā (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt zāliena zelmeni, kad īsmūža nezāles ir sadīgušas un stiebrzāles ir 3–4 lapu stadijā. Daudzgadīgās nezāles zālienā apsmidzināt, kad tām ir izveidojusies lapu rozete	–	1
Piemājas zāliens un mauriņš (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0 vai 15–20 ml/100 m ²		Apsmidzināt zāliena zelmeni, kad īsmūža nezāles ir sadīgušas un stiebrzāles ir 3–4 lapu stadijā. Daudzgadīgās nezāles zālienā apsmidzināt, kad tām ir izveidojusies lapu rozete	–	1

132. Tooler

Reģ. Nr. 0284, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tritosulfurons, 714 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.07		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.05–0.07		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

133. Trimmers 50 š.g.

Reģ. Nr. 0321, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.0225		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airones pasēju	Divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), kad stiebrzāles ir 2–3 lapu stadijā (AS 12–13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

134. U 46 M š.k.

Reģ. Nr. 0042, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju un vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājos – atjaunojoties veģetācijai, vasarājos – kad graudaugiem 3–4 lapas, līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju		0.8		Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem 3–4 lapas (āboliņam 1–2 lapas), līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete (spēcīgākie augi 15–25 cm augsti), līdz graudaugu stiebrošanai	–	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš		0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības un pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt laukus pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	20	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušas 3–4 lapas	–	1

135. Uragāns Sistem 4 š.k.

Reģ. Nr. 0209, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Syngenta Limited

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2		–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms pļaujas		2.0–3.0	2	Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, 7 dienas pirms pļaujas, rapša sējumu, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms pļaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1

INSEKTIČĪDI UN AKARICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1.1. Actara 25 WG

Reģ. Nr. 0167, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tiametoksams, 250 g/kg.

Sistēmas, pieskares un zarnu inde.

Syngenta Crop Protection AG

Kartupeļi	Laputis (<i>Aphididae</i>), cikāde (<i>Macrostelus sexnotatus</i>)	0.08		Apsmidzināt kaitēkļu invāzijas sākumā. Ja nepieciešams atkārtoti	14	2
	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.06–0.08				
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle, rudzi	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.08–0.10		Apsmidzināt invāzijas sākumā	14	2
	Tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.08–0.10		Apsmidzināt labību stiebrošanas stadijā		
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.08–0.12		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Smidzināšanu pārtraukt 2 nedēļas pirms ziedēšanas	14	2
	Ābeļu lapu blusiņas (<i>Psylla mali</i>), ābeļu lapu smecernieki (<i>Phyllobius spp.</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>)	0.10–0.20				
Bumbieres	Bumbieru lapu blusiņa (<i>Psylla pyri</i>)	0.20				
Ķirši, plūmes	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.08–0.12		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Smidzināšanu pārtraukt 2 nedēļas pirms ziedēšanas	14	2
	Zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>)	0.10–0.12				
Gurķi, tomāti (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.10–0.20		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Smidzināšanu pārtraukt 2 nedēļas pirms ziedēšanas	3	2
	Siltumņīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.20–0.40	0.04			
Krāšņumaugi uz lauka un segtās platībās: krizantēmas, rozes, gerberas, primulas u.c.	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumņīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), bruņutis (<i>Coccidae</i>)	0.10–0.15		Apsmidzināt invāzijas sākumā	–	2
Dekoratīvās kultūras (podos)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumņīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), trūdodiņš (<i>Bradysia spp.</i>), bruņutis (<i>Coccidae</i>)		0.04	Apliet invāzijas sākumā, izlietojot 100 ml darba šķidruma uz katru podu (15 cm diametrā)	–	2
Dekoratīvie kokaugi	Egļu-lapegļu hermesi (<i>Adelges laricis</i> , <i>Sacchiphantes viridis</i>)	0.20		Apsmidzināt invāzijas sākumā	–	2
Kokaudzētavās: priedes, egles, apses, bērzi	Laputis (<i>Aphididae</i>), priežu lielais smecernieks (<i>Hylobius abietis</i>)	0.12–0.15		Apsmidzināt invāzijas sākumā	–	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.2. Actara 25 WG

Reģ. Nr. 0167, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: tiametoksams, 250 g/kg.

Sistēmas, pieskares un zarnu inde.

Syngenta Crop Protection AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/10 l ūdens	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Laputis (<i>Aphididae</i>), cikāde (<i>Macrostelus sexnotatus</i>)	4.0		Apsmidzināt kaitēkļu invāzijas sākumā. Ja nepieciešams atkārtoti. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 500 m ²	14	2
	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	4.0				
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphididae</i>)	1.5		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Smidzināšanu pārtraukt 2 nedēļas pirms ziedēšanas. Darba šķidruma daudzums atkarībā no koka vainaga lieluma	14	2
	Ābeļu lapu blusiņas (<i>Psylla mali</i>), ābeļu lapu smecernieki (<i>Phyllobius spp.</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>)	2.0				
Bumbieres	Bumbieru lapu blusiņa (<i>Psylla pyri</i>)	2.5				
Ķirši, plūmes	Laputis (<i>Aphididae</i>)	1.5		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Smidzināšanu pārtraukt 2 nedēļas pirms ziedēšanas. Darba šķidruma daudzums atkarībā no koka vainaga lieluma	14	2
	Zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>)	1.5				
Gurķi, tomāti (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	3.0		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Smidzināšanu pārtraukt 2 nedēļas pirms ziedēšanas. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 170 m ²	3	2
	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	7.0				
Krāšņumaugi uz lauka un segtās platībās: krizantēmas, rozes, gerberas, prīmulas u.c.	Laputis (<i>Aphididea</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), bruņutis (<i>Coccidae</i>)	4.0		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 250 m ²	–	2
Dekoratīvās kultūras (podos)	Laputis (<i>Aphididea</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), trūdodiņš (<i>Bradysia spp.</i>), bruņutis (<i>Coccidae</i>)		0.04	Apliet invāzijas sākumā, izlietojot 100 ml darba šķidruma uz katru podu (15 cm diametrā)	–	2
Dekoratīvie kokaugi	Egļu-lapegļu hermesi (<i>Adelges laricis</i> , <i>Sacchiphantes viridis</i>)	2.5		Apsmidzināt invāzijas sākumā. Darba šķidruma daudzums atkarībā no koka vainaga lieluma	–	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Actellic 50 EC

Reģ. Nr. 0170, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metilpirimifoss, 50%.

Pieskares, elpošanas un zarnu indes iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas un iekārtas	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis furinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), miltu ērce (<i>Tyroglyphus farinae</i>)	0.4 ml/m ²		Apsmidzināt, vienmērīgi nokļājot apstrādājamo virsmu. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš līdz 50 ml/m ²	3	1
Kviešu, miežu, tritikāles, auzu graudi lopbarībai un sēklai	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis furinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), ērces (<i>Acari</i>)	8 ml/t		Vienmērīgi apstrādāt graudu vai sēklu masu ar darba šķidrumu. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš līdz 5 l/t	–	1
Rudzu graudi sēklai, zālāju sēklas materiāls						

3. AlfaStop 50 EC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 11, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

ProEuro Sp z.o.o

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Tripši (<i>Limothrips denticornis</i> , <i>Anaplothrips aculeatus</i>)	0.2–0.4		Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas	14	
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1.5–2 lapu stadijā	14	
Rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), smecernieki (<i>Ceuthorrhynchus rapae</i> , <i>Ceuthorrhynchus sulcicollis</i> , <i>Ceuthorrhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2



1	2	3	4	5	6	7
Lucerna	Lucernas smecernieks (<i>Phytonomus transsylvanicus</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i> , <i>Acyrtosiphon pisum</i>), lucernas blakts (<i>Adelphocoris lineolatus</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu spradzis (<i>Chaetocnema concina</i>), biešu mušas (<i>Pegomyia betae</i> , <i>P. hyoscyami</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Āboliņa sēklu lauki	Smecernieki (<i>Apium spp.</i> , <i>Sitona spp.</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Graudzāļu ērce (<i>Siteroptes gramineum</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas	–	1
	Timotiņa muša (<i>Ammaurosoma flavipes</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1.5–2 lapu stadijā	–	1
Lini	Tripsis (<i>Frankliniella intonsa</i>), melnais linu spradzis (<i>Langitarsus parvulus</i>), zilais linu spradzis (<i>Aphthona euphorbiae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Kukurūza	Melnās stiebrmušas (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1.5–2 lapu fāzē	14	1
Kāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcite (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	21	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2
Burkāni, ķimenes	Burkānu lapu blusiņa (<i>Trioza viridula</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā	14	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Olethreutes variegana</i> , <i>Spilonota ocellana</i>), laputis (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklim parādoties	14	2
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	3

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>) siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0–6.0 ml/100m ²		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	3	3
Avenes, zemenes, jānogas	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>), laputis (<i>Cryptomyzus ribis</i> , <i>Aphis grossulariae</i> , <i>Aphis schneideri</i>), avenāju vabole (<i>Byturus tomentosus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai arī kaitēklim parādoties	14	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu kode (<i>Acrolepia assectella</i>), sīpolu ziedmuša (<i>Eumerus strigatus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	14	2
Sakņu dārzeni	Pūcītes (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra oleracea</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Chaetocnema concinna</i>), biešu muša (<i>Pegomya betae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Dilles sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
Sakņu pētersīļi	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	1
Zāliens golfa laukumā	Maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>), jūnijvabole (<i>Amphimallon solstitialis</i>), jūlijvabole (<i>Anomala aenea</i>), dārza vabole (<i>Phyllorpertha horticola</i>), sprakšķi (<i>Agriotes spp.</i>), skudras (<i>Lasiu sp.</i> , <i>Myrmica sp.</i>)	0.4		Apsmidzināt zālienu, kaitēklim parādoties	–	3
Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyrallis farinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	0.4 ml/m ²		Darba šķidrums patēriņš 200 ml/m ²	20	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i> , <i>Hylobius pinastri</i>)		2.5–3.5 (0.25–0.35 l uz 10 l ūdens)	Iemērkst stādus darba šķīdumā pirms stādīšanas	–	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu vērpējs (<i>Dendrolimus pini</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), rūsganā priežu zāglapsene (<i>Neodiprion sertifer</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	–	1
Lapu koki kokaudzētavās	Mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>), ozolu tinējs (<i>Tortrix viridana</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	–	1
Koksne	Egļu astonzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)		1–3 (0.1–0.3 l uz 10 l ūdens)	Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidrums patēriņš 250 ml/m ²	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

4. Alverde

Reģ. Nr. 0365, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metaflumizons, 240 g/l.

Pieskares un zarnu iedarbība.

BASF A/S

Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.25		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus, kaitēklīm parādotes, atkārtoti pēc 7–14 dienām	14	2
-----------	--	------	--	---	----	---

5. Bulldoks 025 e.k.

Reģ. Nr. 0090, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: beta-ciflutrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Ievu-auzu laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), rožu-graudzāļu laputs (<i>Metopolophium dirhodum</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes	21	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes	28	2
Kāposti, puķkāposti, u.c. krustziežu dzimtas dārzeņi	Kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu pūcīte (<i>Barathra brassicae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes, atkārtoti pēc 7–10 dienām	7	2
Rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes	56	2
	Krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneura brassicae</i>), krustziežu stublāju smecernieks (<i>Ceutorhynchus quadridens</i>), rapša stublāju smecernieks (<i>Ceutorhynchus napi</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes		
Cukurbietes	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes	28	1
Ābeles	Ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādotes	20	1

6. Ciperkils 250 e.k.

Reģ. Nr. 0307, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cipermetrīns, 250 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Neliotot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Agriphar S.A.

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>)	0.1		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādotes	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>)	0.1		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādotes, līdz kultūrauga vārpošanas sākumam (AS 51)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta</i> spp.), smecernieki (<i>Ceutorhynchus rapae</i> , <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> , <i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.1		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	40	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.1		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta</i> spp.), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.1		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	7	2
Zirņi	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>)	0.1		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	7	2

7. Ciperkils 500 e.k.

Reģ. Nr. 0385, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cipermetrīns, 500 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Agriphar S.A.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras tritikāle, auzas	Labību lapgrauži (<i>Oulema</i> spp.), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), melnās stiebrmušas (<i>Oscinella</i> spp.), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus citellatus</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	28	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Svītrainais spradzis (<i>Phyllotreta nemorum</i>), rapša stublāju spradzis (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) smecernieki (<i>Ceutorhynchus napi</i> , <i>Ceutorhynchus quadridens</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia rosae</i>),	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	49	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Galviņkāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia rosae</i>)	0.05		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	7	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu puskode (<i>Acrolepiopsis assetcella</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.05		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augsti)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.1		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, kaitēklim parādoties	–	2

8. Danadims 40 e.k.

Reģ. Nr. 0211, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dimetoāts, 400 g/l.

Insekticīds, akaricīds.

Sistēmas, pieskares un zarnu indes iedarbība.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.4–0.8		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1
	Labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), melnās stiebrmušas (<i>Oscinella spp.</i>), tripši (<i>Limothrips spp.</i>)	1.0–1.2				
Zirņi lopbarībai (graudi)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tumšais zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.5–0.75			21	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Biešu muša (<i>Pegomya betae</i>)	0.4–0.8			35	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Biešu spradzis (<i>Chaetocnema concinna</i>), biešu kapracis (<i>Blitophaga opaca</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.5–1.0				
Kartupeļi sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.5–1.0			–	2
Ābeles, bumbieres	Smecernieki (<i>Anthonomus pomorum</i> , <i>Phyllobius spp.</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>)	0.25–0.75	0.05–0.10	Apsmidzināt pēc ražas novākšanas	35	1
Plūmes	Zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	1.2				
Zemenes	Laputis (<i>Aphididae</i>), parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>), zemeņu ērcē (<i>Tarsonemus pallidus</i>)	1.2			–	1

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi (izņemot krizantēmas)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), parastā tīklēce (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5–1.5	0.15	Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	–	2
Priedes kokaudzētavās un jaunaudzēs	Priežu mizas blakts (<i>Aradus cinnamomeus</i>)	1.5–2.5			–	1
Lapu koki kokaudzētavās	Laputis (<i>Aphididae</i>) Tinēji (<i>Tortricidae</i>), sprīžmeši (<i>Geometridae</i>)	0.5–1.5 1.5–2.5			–	2

9. Decis 2.5 e.k.

Reģ. Nr. 0020, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Bayer CropScience AG

Kvieši, mieži	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapgrauži (<i>Chrysomelidae</i>)	0.25		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Zirņi, pupas	Laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Curculionidae</i>)	0.2–0.3			20	2
Rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), lapgrauži (<i>Chrysomelidae</i>), blaktis (<i>Hemiptera</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), balteņi (<i>Pieridae</i>)	0.2			20	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.15–0.25			20	2
Kāposti	Kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), pūcītes (<i>Noctuidae</i>), balteņi (<i>Pieridae</i>), alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>)	0.3			14	2
Kāļi, turnepši	Šaursvītru spradzis (<i>Phyllotreta undulata</i>), rāceņu lapgrauzis (<i>Phaedon cochleariae</i>)	0.3			14	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>), burkānu lapu blusiņa (<i>Trioza apicalis</i>)	0.3			30	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Laputis (<i>Aphididae</i>), spradži (<i>Halticinae</i>), biešu muša (<i>Pegomyia betae</i>)	0.25–0.50			20	2
Lucernas un āboliņa sēklu lauki	Smecernieki (<i>Curculionidae</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), blaktis (<i>Hemiptera</i>)	0.3–0.4			20	2
Lupīna sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>)	0.3–0.4			20	2
Lini	Spradži (<i>Halticinae</i>), linu pogaļu tinējs (<i>Phalonia epilana</i>)	0.3			20	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā, segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), sūcējkaitēkļi (<i>Homoptera</i> , <i>Hemiptera</i>), lapgrauži (<i>Chrysomelidae</i>)	0.5–0.7			–	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi (atklātā laukā, segtās platībās)	Bruņutis (<i>Coccoidea</i>)	–	0.1	Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	–	2
Tomāti, gurķi, pipari (segtais platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5–0.7			5	2
Ābeles, bumbieres	Sūcējkaitēkļi (<i>Homoptera</i> , <i>Hemiptera</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>), lapgrauži (<i>Chrysomelidae</i>)	0.3–0.6			30	2
Ķirši, plūmes	Sūcējkaitēkļi (<i>Homoptera</i> , <i>Hemiptera</i>), plūmju zāglapsesnes (<i>Hoplocampa spp.</i>)	0.4–0.6			20	2
Jānogas, upenes, ērkšķogas	Sūcējkaitēkļi (<i>Homoptera</i> , <i>Hemiptera</i>), lapgrauži (<i>Chrysomelidae</i>)	0.4–0.6			20	1
Avenes, zemenes	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt pirms ziedēšanas sākuma	–	1
Meži	Eglu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), sprizmeši (<i>Geometridae</i>), maijvaboles (<i>Melolontha spp.</i>)	0.4–0.8		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Nogaidīšanas laiks attiecībā uz: Ogu, sēņu lasīšanu Meža darbu atsākšanu Atpūtu	– 19 2 5	1
Tukšas labības noliktavas	Maizes ķermis (<i>Stegobium panicea</i>), miltu melnulis (<i>Tenebrio molitor</i>), graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), miltu raibais svilnis (<i>Pyrallis farinalis</i>)	0.2 ml/m ²		Darba šķidruma patēriņš: 200 ml/m ²	48 stundas	1

10.1. Decis Mega

Reģ. Nr. 0310, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: deltametrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Augļu dārzos nelietot tuvāk par 40 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Tripši (<i>Thysanoptera</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), kviešu stiebru pangodiņš (<i>Haplodiplosis equestris</i>), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus clitellatus</i>)	0.125–0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.15				
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), zirņu tinēji (<i>Laspeyresia spp.</i>), zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus spp.</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.125–0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.10–0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, kāļi	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididea</i>)	0.125–0.150		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	14	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Cikādes (<i>Eupteryx collina</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	–	2
	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.25		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	–	
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis devector</i> , <i>Anuraphis subterranea</i>), lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Tmetocera ocellana</i> , <i>Argyroplote variegana</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>), ābolu zāglapsene (<i>Hoplocampa testudinea</i>)	0.15–0.25		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	2

10.2. Decis Mega

Reģ. Nr. 0310, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: deltametrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Bayer CropScience AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/10 l ūdens	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādes, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia spp.</i>), zirņu laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), pupu laputis (<i>Aphis fabae</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	20	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	20	2
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, kāļi	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	14	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	30	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), cikādes (<i>Eupteryx collina</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 200 m ²	–	2
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Argyroplote variegana</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu zāglapsene (<i>Hoplocampa testudinea</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 200 m ²	30	2

1	2	3	4	5	6	7
11. Fastac 50						
Reģ. Nr. 0250, reģ. klase 2., iepakojumiem 0.1 l un mazākiem, reģ klase 3.						
Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns, 50 g/l.						
Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.						
BASF A/S						
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Tripši (<i>Limothrips denticornis</i> , <i>Anaplothrips aculeatus</i>)	0.2–0.4		Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas	14	
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1.5–2 lapu stadijā	14	
Rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus rapae</i> , <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> , <i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.2–0.4			14	2
Lucerna	Lucernas smecernieks (<i>Phytonomus transsylvanicus</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i> , <i>Acyrtosiphon pisum</i>), lucernas blakts (<i>Adelphocoris lineolatus</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu spradzis (<i>Chaetocnema concina</i>), biešu mušas (<i>Pegomya betae</i> , <i>P. hyoscyami</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i>)	0.2–0.4			14	3
Āboliņa sēklu lauki	Smecernieki (<i>Apium spp.</i> , <i>Sitona spp.</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Graudzāļu ērce (<i>Siteroptes graminum</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas	–	1
	Timotiņa muša (<i>Amaurosoma flavipes</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1.5–2 lapu stadijā	–	1
Lini	Tripsis (<i>Frankliniella intonsa</i>), melnais linu spradzis (<i>Longitarsus parvulus</i>), zilais linu spradzis (<i>Aphthona euphorbiae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3

1	2	3	4	5	6	7
Kukurūza	Melnās stiebrmušas (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1.5–2 lapu fāzē	14	1
Kāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcite (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	14	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	21	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.3–0.4			14	2
Burkāni, ķīmenes	Burkānu lapu blusiņa (<i>Trioza viridula</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā	14	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Olethreutes variegana</i> , <i>Spilonota ocellana</i>), laputis (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklīm parādoties	14	2
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	14	3
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0–6.0 ml/100m ²		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	3	3
Avenes, zemenes, jānogas	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>), laputis (<i>Cryptomyzus ribis</i> , <i>Aphis grossulariae</i> , <i>Aphis schneideri</i>), avenāju vabole (<i>Byturus tomentosus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai arī kaitēklīm parādoties	14	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu kode (<i>Acrolepia assectella</i>), sīpolu ziedmuša (<i>Eumerus strigatus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	14	2
Sakņu dārzeni	Pūcītes (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra oleracea</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Chaetocnema concinna</i>), biešu muša (<i>Pegomyia betae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	2
Dilles sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4			–	1
Sakņu pētersīļi	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4			14	1

1	2	3	4	5	6	7
Zāliens golfa laukumā	Maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>), jūnijvabole (<i>Amphimallon solstitialis</i>), jūlijvabole (<i>Anomala aenea</i>), dārza vabole (<i>Phyllopertha horticola</i>), sprakšķi (<i>Agriotes spp.</i>), skudras (<i>Lasius sp.</i> , <i>Myrmica sp.</i>)	0.4		Apsmidzināt zālienu, kaitēklim parādoties	–	3
Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis farinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	0.4 ml/m ²		Darba šķidruma patēriņš 200 ml/m ²	20	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i> , <i>Hylobius pinastri</i>)		2.5–3.5 (0.25–0.35 l uz 10 l ūdens)	Iemērt stādus darba šķidrumā pirms stādīšanas	–	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu vērpējs (<i>Dendrolimus pini</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), rūsganā priežu zāglapsene (<i>Neodiprion sertifer</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	–	1
Lapu koki kokaudzētavās	Mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>), ozolu tinējs (<i>Tortrix viridana</i>)	0.2–0.3			–	1
Koksne	Egļu astoņzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)		1–3 (0.1–0.3 l uz 10 l ūdens)	Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidruma patēriņš 250 ml/m ²	–	1

12. Fitoekols IF

Reģ. Nr. 0239, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 2 %.

Insekticīds.

Pieskares iedarbība.

A/S "BIOLAT"

Dārzeni, ogulāji, krāšņumaugi	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)	–	2	Apsmidzināt augus, parādoties kaitēklim. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
-------------------------------	---	---	---	---	---	---

13. Fitoekols IF 40 s.k.

Reģ. Nr. 0238, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 40 %.

Insekticīds.

Pieskares iedarbība.

A/S "BIOLAT"

Dārzeni, ogulāji, krāšņumaugi	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)	–	1–2	Apsmidzināt augus, parādoties kaitēklim. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–15 dienām	–	4
-------------------------------	---	---	-----	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

14. Fury 100 EW

Reģ. Nr. 0256, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: zeta-cipermetrīns, 100 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

FMC Chemical sprl

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas	Labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), ievu-labību laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), kviešu vārpu pangodiņi (<i>Contarinia tritici</i> , <i>Sitodiplosis mosellana</i>)	0.10		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	42	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta</i> spp., <i>Psylliodes chrysocephala</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.10			42	2
Zirņi	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	0.07			7	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), cikādes (<i>Cicadinea</i>)	0.10		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	7	2
Cukurbietes	Pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.10		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	42	2
Kāposti	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.10		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	7	2

15. Fostoksīns tb.

Reģ. Nr. 0112, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.

Insekticīds, akaricīds.

Elpošanas inde.

Detia Degesch GmbH

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t. sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Krava, kravas raksturojums	Kaitīgais organisms	Deva	Minimālais ekspozīcijas ilgums, dienās	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Graudi brīvi sabērti kaudzēs	Noliktavu kaitēkļi	2–6 tb./t	12°–15°C–7 d. 16°–20°C–6 d. 21°–25°C–5 d. 26°C–4 d.	Atkarībā no noliktavu vai torņu konstrukcijas	Tabletes ievadīt graudu masā ar speciālām zondēm vai, ievērojot noteiktu intervālu, ievadīt graudu plūsmā graudu iebēršanas laikā
Graudu torņos		2–5 tb./t			
Graudi maisos sakrauti grēdās		1–3 tb./m ³		3 st.	Tabletes brīvi, lai nesaskaras, izvietot uz paplātēm. Vienmēri izvietot telpā
Tabaka ķīpās, kārbās, mucās		½–1 tb./m ³		Ķīpas 48 st., pārējie 72 st.	
Iesaiņoti pārtikas produkti		1–3 tb./m ³		48 st.	Nedrīkst apstrādāt neiesaiņotus pārtikas produktus
Tukšas noliktavu telpas		1–3 tb./m ³		3 st.	Tabletes vienmēri izvietot telpās un blīvi noslēgt tās

1	2	3	4	5	6	7
16. Golden Alpha 50 EC						
Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 5, reģ. klase 2.						
Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns, 50 g/l.						
Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.						
Goldengrass Ltd						
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Spradži (<i>Phyllotreta</i> spp.), labību lapgrauzis (<i>Oulema melanopus</i>), graudaugu lapgrauzis (<i>Oulema lichenis</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	2
	Tripši (<i>Limothrips denticornis</i>), kviešu tripsis (<i>Anaplothrips aculeatus</i>)	0.2–0.4		Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas	14	
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1.5–2 lapu stadijā	14	
Rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta</i> spp.), smecernieki (<i>Ceuthorrhynchus rapae</i> , <i>Ceuthorrhynchus sulcicollis</i> , <i>Ceuthorrhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	2
Lucerna	Lucernas smecernieks (<i>Phytonomus transsylvanicus</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i> , <i>Acyrtosiphon pisum</i>), lucernas blakts (<i>Adelphocoris lineolatus</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	3
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu spradzis (<i>Chaetocnema concinna</i>), biešu mušas (<i>Pegomya betae</i> , <i>P. hyoscyami</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	3
Āboliņa sēklu lauki	Smecernieki (<i>Apion</i> sp., <i>Sitona</i> sp.)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	–	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Graudzāļu ērce (<i>Siteroptes gramineum</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus pavasārī, tikko stiebrzāles sadīgušas	–	1
	Timotiņa muša (<i>Amaurosome flavipes</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	–	1
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1.5–2 lapu stadijā	–	1
Lini	Tripsis (<i>Frankliniella intonsa</i>), melns linu spradzis (<i>Langitarsus parvulus</i>), zilais linu spradzis (<i>Aphthona euphorbiae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	3
Kukurūza	Melnās stiebrmušas (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1.5–2 lapu fāzē	14	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Kāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādotes	14	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes	21	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	14	2
Burkāni, ķīmenes	Burkānu lapu blusiņa (<i>Trioza viridula</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā	14	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Olethreutes variegana</i> , <i>Spilota ocellana</i>), laputis (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklim parādotes	14	2
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādotes	14	3
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>) siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0–6.0 ml/100m ²		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādotes	3	3
Avenes, zemenes, jānogas	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>), laputis (<i>Cryptomyzus ribis</i> , <i>Aphis grossulariae</i> , <i>Aphis schneideri</i>), avenāju vabole (<i>Byturus tomentosus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai arī kaitēklim parādotes	14	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu kode (<i>Acrolepia assectella</i>), sīpolu ziedmuša (<i>Eumerus strigatus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādotes	14	2
Sakņu dārzeņi	Pūcītes (<i>Autographa gamma</i>), tomātu pūcīte (<i>Mamestra oleracea</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Chaetocnema concinna</i>), biešu muša (<i>Pegomyia betae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes	14	2
Dilles sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes	–	1
Sakņu pētersīļi	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes	14	1

1	2	3	4	5	6	7
Zāliens golfa laukumā	Maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>), jūnijvabole (<i>Amphimallon solstitialis</i>), jūlijvabole (<i>Anomala aenea</i>), dārza vabole (<i>Phyllopertha horticola</i>), sprakšķi (<i>Agriotes spp.</i>), skudras (<i>Lasius sp.</i> , <i>Myrmica sp.</i>)	0.4		Apsmidzināt zālienu, kaitēklīm parādoties	–	3
Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis farinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plakānis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	0.4 ml/m ²		Darba šķidruma patēriņš 200 ml/m ²	20	1
Skuju koki kokaudzētāvās	Priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i> , <i>Hylobius pinastri</i>)		2.5–3.5 (0.25–0.35 l uz 10 l ūdens)	Iemērt stādus darba šķidrumā pirms stādīšanas	–	1
Skuju koki kokaudzētāvās	Priežu vērpējs (<i>Dendrolimus pini</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), rūsganā priežu zāglapsene (<i>Neodiprion sertifer</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	–	1
Lapu koki kokaudzētāvās	Mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>), ozolu tinējs (<i>Tortrix viridana</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	–	1
Koksne	Egļu astoņzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)		1–3 (0.1–0.3 l uz 10 l ūdens)	Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidruma patēriņš 250 ml/m ²	–	1

17. Kaiso 50 EG

Reģ. Nr. 0381, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: lambda-cihalotrīns, 50 g/kg.

Pieskares un zarnu inde.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nufarm GmbH & Co KG

Kartupeļi	Laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis nasturtii</i> , <i>Aphis frangulae</i>), kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	14	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle	Laputis (<i>Aphididae</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema melanopus</i> , <i>Oulema lichenis</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Smecernieki (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> , <i>C. napi</i> , <i>C. quadridens</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneura brassicae</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), rapša stublāju spradzis (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	49	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

18. Karate Zeon 5 CS

Reģ. Nr. 0207, reģ. klase 2., iepakojumiem 0.05 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: lambda-cihalotrīns, 50 g/l.

Insekticīds.

Pieskares un zarnu inde.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Syngenta Limited

Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	0.1		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	28	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Aphididae</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), melnās stiebrmušas (<i>Oscinella spp.</i>)	0.15–0.20			35	1
Cukurbietes	Biešu muša (<i>Pegomya betae</i>), biešu spradzis (<i>Chaetocnema concinna</i>), biešu kapracis (<i>Blitophaga opaca</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15			28	1
Zirņi	Tumšais zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Sitona spp.</i>)	0.15			28	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus spp.</i>)	0.10–0.15		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes	28	2
	Krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.15				
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.15		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādotes	14	1
Ābeles, bumbieres,	Smecernieki (<i>Anthonomus pomorum</i> , <i>Phyllobius spp.</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>)	0.4–0.5			28	2
Plūmes, ķirši	Smecernieki (<i>Phyllobius spp.</i>), plūmju augļu tinējs (<i>Cydia funebrana</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>)	0.4			28	1
Lucernas un āboliņa sēklu lauki	Laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Apion spp.</i> , <i>Sitona spp.</i> , <i>Phytonomus spp.</i>)	0.15			28	1

1	2	3	4	5	6	7
Rozes, krizantēmas, gerberas, primulas, lilijas, petūnijas, atraitnītes	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)		0.05	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādotes	–	2
Skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs (ne vecākās par 1–3 gadiem)	Sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>), priežu pūcīte (<i>Panolis flammea</i>), priežu sprīžotājs (<i>Bupalus piniarius</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), lielais priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i>)	0.1			–	1
Lapu koki kokaudzētavās un jaunaudzēs (ne vecākās par 1–3 gadiem)	Sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>)	0.1		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	–	1
Koksne	Egļu astoņzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)	2.5–5.0 ml/m ²		Apsmidzināt koksni krautuvēs. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 250 ml/m ² koksnes	–	1
Noliktavas	Maizes ķermis (<i>Stegobium panicea</i>), miltu melnulis (<i>Tenebrio molitor</i>), graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), miltu raibais svilnis (<i>Pyrallis farinalis</i>)	0.4 ml/m ²		Apstrādāt tukšas noliktavu telpas. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 200 ml/m ²	2	1
Noliktavu teritorija	Maizes ķermis (<i>Stegobium panicea</i>), miltu melnulis (<i>Tenebrio molitor</i>), graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), miltu raibais svilnis (<i>Pyrallis farinalis</i>)	0.8 ml/m ²		Apstrādāt teritoriju ap noliktavām līdz 5 m platumā tūlīt pēc noliktavu apstrādes. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 400 ml/m ²	2	1

19. Karis 10 CS

Reģ. Nr. 0391, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: lambda-cihalotrīns, 100 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

GAT Microencapsulation AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i>), labību lapgrauzis (<i>Oulema melanopus</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu stublāju spradzis (<i>Phyllodes crysocephala</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus rudenī, kaitēklim parādotes	49	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.075		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādotes		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

20. Kestac 50

Reģ. Nr. 0251, reģ. klase 2., iepakojumiem 0.1 l un mazākiem, reģ klase 3.

Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Spradži (<i>Phyllotreta</i> spp.), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
	Tripši (<i>Limothrips denticornis</i> , <i>Anaplothrips aculeatus</i>)	0.2–0.4		Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas	14	
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1.5–2 lapu stadijā	14	
Rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta</i> spp.), smecernieki (<i>Ceutorhynchus rapae</i> , <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> , <i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.2–0.4			14	2
Lucerna	Lucernas smecernieks (<i>Phytonomus transsylvanicus</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i> , <i>Acyrtosiphon pisum</i>), lucernas blakts (<i>Adelphocoris lineolatus</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu spradzis (<i>Chaetocnema concinna</i>), biešu mušas (<i>Pegomyia betae</i> , <i>P. hyoscyami</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Āboliņa sēklu lauki	Smecernieki (<i>Apium</i> spp., <i>Sitona</i> spp.)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Graudzāļu ērce (<i>Siteroptes graminum</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas	–	1
	Timotiņa muša (<i>Amaurosoma flavipes</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1.5–2 lapu stadijā	–	1
Lini	Tripsis (<i>Frankliniella intonsa</i>), melnais linu spradzis (<i>Longitarsus parvulus</i>), zilais linu spradzis (<i>Aphthona euphorbiae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Kukurūza	Melnās stiebrmušas (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1.5–2 lapu fāzē	14	1

1	2	3	4	5	6	7
Kāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcite (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	21	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.3–0.4			14	2
Burkāni, ķimenes	Burkānu lapu blusiņa (<i>Trioza viridula</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā	14	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Olethreutes variegana</i> , <i>Spilota ocellana</i>), laputis (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklim parādoties	14	2
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	3
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0–6.0 ml/100m ²		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	3	3
Avenes, zemenes, jānogas	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>), laputis (<i>Cryptomyzus ribis</i> , <i>Aphis grossulariae</i> , <i>Aphis schneideri</i>), avenāju vabole (<i>Byturus tomentosus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai arī kaitēklim parādoties	14	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu kode (<i>Acrolepia assectella</i>), sīpolu ziedmuša (<i>Eumerus strigatus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	14	2
Sakņu dārzeņi	Pūcītes (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra oleracea</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Chaetocnema concinna</i>), biešu muša (<i>Pegomya betae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Dilles sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4			–	1
Sakņu pētersīļi	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4			14	1
Zāliens golfa laukumā	Maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>), jūnijvabole (<i>Amphimallon solstitialis</i>), dārza vabole (<i>Phyllopertha horticola</i>), sprakšķi (<i>Agriotes spp.</i>), skudras (<i>Lasius sp.</i> , <i>Myrmica sp.</i>)	0.4		Apsmidzināt zālienu, kaitēklim parādoties	–	3

1	2	3	4	5	6	7
Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis farinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plakanis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	0.4 ml/m ²		Darba šķidruma patēriņš 200 ml/m ²	20	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i> , <i>Hylobius pinastri</i>)		2.5–3.5 (0.25–0.35 l uz 10 l ūdens)	Iemērkst stādus darba šķidrumā pirms stādīšanas	–	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu vērpējs (<i>Dendrolimus pini</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), rūsganā priežu zāglapsene (<i>Neodiprion sertifer</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	–	1
Lapu koki kokaudzētavās	Mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>), ozolu tinējs (<i>Tortrix viridana</i>)	0.2–0.3			–	1
Koksne	Egļu astonzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)		1–3 (0.1–0.3 l uz 10 l ūdens)	Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidruma patēriņš 250 ml/m ²	–	1

21. K-Obiol

Reģ. Nr. 0394, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu iedarbība.

Bayer S.A.S

Graudi	Graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), miltu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>), Austrālijas kviešu smecernieks (<i>Rhyzopertha dominica</i>), zāgzobu graudu vabole (<i>Oryzaephylus surinamensis</i>), pupu smecernieks (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)	10–20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādoties kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 0.5–1.5 l/t	42	1
Tukšas noliktavu telpas	Graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), miltu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>), Austrālijas kviešu smecernieks (<i>Rhyzopertha dominica</i>), zāgzobu graudu vabole (<i>Oryzaephylus surinamensis</i>), pupu smecernieks (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), svilnis (<i>Ephestia cautella</i>)	60 ml/100 m ²		Apsmidzināt, vienmērīgi noklājot apstrādājamo virsmu. Darba šķidruma patēriņš gludas virsmas apstrādei – 5 l/100m ² , nelidzenas virsmas apstrādei – 10 l/100m ²	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

22. Litagra Decis Mega 50 e.ū.

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 15, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: deltametrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

UAB "Litagros Prekyba" filiāle "Litagra Latvija"

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/10 l ūdens	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādes, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia spp.</i>), zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	20	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	20	2
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, kāļi	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	14	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psilla rosae</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 300 m ²	30	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), cikādes (<i>Eupteryx collina</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 200 m ²	–	2
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Argyroplote variegana</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu zāglapsene (<i>Hoplocampa testudonea</i>)	4		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes. Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 200 m ²	30	2

23. Match 50 EC

Reģ. Nr. 0093, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: lufenurons, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Syngenta Crop Protection AG

Dekoratīvās kultūras siltumnīcās: fīkusi, mīrtes, krizantēmas, asparagi	Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>), bruņutis (<i>Coccidae</i>)	0.3–0.5		Apsmidzināt augus, parādotes kaitēkļu kāpurim, atkārtoti pēc 3–4 nedēļām	–	2
---	--	---------	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

24. Magtoksīns tb.

Reģ. Nr. 0111, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: magnija fosfīds, 66 %.

Insekticīds, akaricīds.

Elpošanas inde.

Detia Degesch GmbH

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t. sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Krava, kravas raksturojums	Kaitīgais organisms	Deva	Minimālais ekspozīcijas ilgums, dienās	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Graudi brīvi sabērti kaudzēs	Noliktavu kaitēkļi	2–6 tb./t	12°–15°C–7 d. 16°–20°C–6 d. 21°–25°C–5 d. 26°C–4 d.	Atkarībā no noliktavu vai torņu konstrukcijas	Tabletes ievadīt graudu masā ar speciālām zondēm vai, ievērojot noteiktu intervālu, ievadīt graudu plūsmā graudu iebēršanas laikā
Graudu torņos		2–5 tb./t			
Graudi maisos sakrauti grēdās		1–3 tb./m³		3 st.	Tabletes brīvi, lai nesaskaras, izvietot uz paplātēm. Vienmērīgi izvietot telpā
Tabaka ķipās, kārbās, mucās		½–1 tb./m³		Ķipas 48 st., pārējie 72 st.	
Iesaiņoti pārtikas produkti		1–3 tb./m³		48 st.	Nedrīkst apstrādāt neiesaiņotus pārtikas produktus
Tukšas noliktavu telpas		1–3 tb./m³		3 st.	Tabletes vienmērīgi izvietot telpās un blīvi noslēgt tās

25. Nīmazals e.k.

Reģ. Nr. 0241, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: azadiraktīns-A, 10 g/l.

Insekticīds, akaricīds.

Sistēmas un zarnu iedarbība.

Trifolio-M GmbH

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādotes 1.–2. vecuma kāpurim	3	2
Gurķi	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Tomāti	Alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Kāposti	Kāpostu laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu pūcīte (<i>Barathra brassicae</i>), balteņi (<i>Pieris spp.</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Ābeles	Laputis (<i>Aphididae</i>), sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), augļu koku sarkanā tiklērce (<i>Panonychus ulmi</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi	Alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>), šaurspārnu kodes (<i>Gracilaridae</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tīklērces (<i>Tetranychidae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	–	2
Ozoli	Maijvaboles (<i>Melolontha spp.</i>)	3.0		Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā	–	1

26. Perfekts 500 S e.k.

Reģ. Nr. 0212, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dimetoāts, 500 g/l.

Insekticīds, akaricīds.

Sistēmas, pieskares un zarnu indes iedarbība.

BASF A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Melnās stiebrmušas (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>), kviešu vārpu pangodiņš (<i>Contarinia tritici</i>), oranžais stiebru pangodiņš (<i>Sitodiplosis mossellana</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), tripši (<i>Limothrips denticornis</i> , <i>Haplothrips aculeatus</i>), labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), ievu-labību laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), kviešu stiebru pangodiņš (<i>Haplodiplosis equestris</i>)	0.6		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	21	2
Zirņi lopbarībai (graudi)	Zirņu svītrainais smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), zirņu tripsis (<i>Kakothrips robustus</i>), zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	0.6			21	1
Cukurbietes	Pļavu pūkainā blakts (<i>Lygus rugulipennis</i>), biešu kapracis (<i>Blitophaga opaca</i>), biešu muša (<i>Pegomyia betae</i>), laputis (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), balandu pūcite (<i>Discestra trifolii</i>)	0.6			35	1
Kartupeļi sēklai	Krustziežu vairogblakts (<i>Eurydema oleracea</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>), krūkļu laputs (<i>Aphis frangulae</i>), pabērzu laputs (<i>Aphis nasturtii</i>)	0.6		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	–	2
Galviņkāposti	Krustziežu vairogblakts (<i>Eurydema oleracea</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia rosae</i>), kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.6			28	1
Zemenes	Zemeņu ērce (<i>Tarsonemus pallidus</i>), zemeņu zilais issmeceris (<i>Coenorhinus germanicus</i>), parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.7		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

27. Plenum 50 WG

Reg. Nr. 0382, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pimetrozīns, 500 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.15		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties, rapša ziedkopas attīstības laikā, sākot ar “zaļo pumpuru” stadiju līdz “dzelteno pumpuru” stadijai (AS 51–59)	75	1
----------------------------------	---	------	--	--	----	---

28. Proteus OD

Reg. Nr. 0275, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tiakloprīds, 100 g/l,
deltametrīns, 10 g/l.

Pieskares, sistēmas un zarnu inde.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	30	1
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.5–0.75		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	14	3
	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.6–0.75				
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus</i> <i>spp.</i> , <i>C. quadridens</i> , <i>C. napi</i> , <i>C. pallidactylus</i> , <i>C. assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneura</i> <i>brassicae</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	45	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Laputis (<i>Aphididae</i>), spradži (<i>Chaetocnema concinna</i> , <i>Phyllotreta spp.</i>), biešu muša (<i>Pegomya hyoscyami</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	30	2
Kukurūza	Laputis (<i>Aphididae</i>), apiņu svilnis (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	30	1

29. Sumi-alfa 5 e.k.

Reg. Nr. 0148, reģ. klase 2., iepakojumiem 250 ml un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: esfenvalerāts, 50 g/l.

Insekticīds.

Pieskares un zarnu inde.

Graudaugu sējumus nelietot tuvāk par 14 m, rapša sējumus, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos un krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos nelietot tuvāk par 20 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Aphididae</i>), labību lapgrauzis (<i>Oulema</i> <i>melanopus</i>)	0.20		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	35	3
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> , <i>C. napi</i> , <i>C. pallidactylus</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasieura brassicae</i>)	0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	56	2
Galviņkāposti, Briseles kāposti	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassica</i>)	0.20		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augsti)	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.20		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēklim parādoties	–	2

30. Tiovits 80 d.g.

Reģ. Nr. 0056, reģ. klase 2., iepakojumiem 1 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: sērs, 80 %.

Akaricīds, inhalatīva iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Ābeles, bumbieres	Tīklērces (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Bryobia redicorzevi</i>)	3.0–7.5	0.75	Apsmidzināt augļu kokus pirms ziedēšanas	–	1
		3.0–7.5	0.3–0.5	Apsmidzināt augļu kokus sārtā pumpuru stadijā, atkārtoti pēc 5–10 dienām	7	4
Zemenes	Zemeņu ērce (<i>Tarsonemus pallidus</i>)	2.0–3.0	0.2–0.4	Apsmidzināt stādījumus pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	–	3
Dārzeni un krāšņumaugi	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	2.0–3.0	0.50–0.75	Apsmidzināt stādījumus, parādoties kaitēklim	35	3
Lapu koki kokaudzētavās un jaunos stādījumos	Tīklērces (<i>Eriophidae</i> , <i>Tetranychidae</i>)	1.2		Apsmidzināt, parādoties kaitēklim, un atkārtoti pēc 10–14 dienām pavasarī un vasarā	–	3

31. Vertimec 018 EC

Reģ. Nr. 0296, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: abamektīns, 18 g/l.

Lokāla sistēmas, pieskares un zarnu inde.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Syngenta Crop Protection AG

Gurķi, tomāti, pipari (segtās platībās)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt augus, parādoties pirmajiem kaitēkļiem	7	2
	Alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>)	0.6–1.2		Apsmidzināt augus, parādoties pirmajām mušām, olu dēšanas laikā		
Krāšņumaugi uz lauka un segtās platībās: rozes, balzamīnes, krizantēmas, gerberas, atraitnītes, nelķes u.c.	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.6–1.2		Apsmidzināt augus, parādoties pirmajiem kaitēkļiem	–	2
	Alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>)	0.6–1.2		Apsmidzināt augus, parādoties pirmajām mušām, olu dēšanas laikā		

LIMACĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. Ferramol

Reģ. Nr. 0395, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 9.9 g/kg.

Limacīds.

W. Neudorff GmbH KG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras, zāliens	Milzu kailgliemezis (<i>Limax maximus</i>), raibais kailgliemezis (<i>Deroceras reticulatum</i>), tūruma kailgliemezis (<i>Agrolimax agrestis</i>), Spānijas kailgliemezis (<i>Arion lusitanicus</i>)	5		Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājuma pazīmes	–	4

2. Mesurol

Reģ. Nr. 0378, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metiokarbs, 20 g/kg.

Limacīds.

Bayer CropScience AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	5.0		Apstrādi veic, parādoties kaitēklim vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)	–	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	5.0		Apstrādi veic, parādoties kaitēklim vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz tā rozetes veidošanās beigām (AS 29)	–	1
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	5.0		Apstrādi veic, parādoties kaitēklim vai pirmajām bojājuma pazīmēm	–	1
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	5.0		Apstrādi veic, parādoties kaitēklim vai pirmajām bojājuma pazīmēm	–	1
				Apstrādi veic, parādoties kaitēklim vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pilnīgi noslēgtā siltumnīcā, kur izslēgta līdzekļa iekļūšana augsnē zem siltumnīcas. Atkārtoti ne ātrāk kā pēc 7 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3. Sluxx

Reģ. Nr. 0396, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 29.7 %.

Limacīds.

W.Neudorff GmbH KG

Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7		Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	–	4
---	---	---	--	---	---	---

REPELENTI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. Cervacol extra

Reģ. Nr. 0337, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: kvarca smiltis, 251 g/kg.

Repelents.

Stähler International GmbH & Co. KG

Skuju koki, lapu koki	Aļņi, staltbrīeži, stirnas	2.0–3.0 kg/1000 kociņiem		Apstrādāt jauno kociņu gala dzinumus jaunaudzēs	–	1
-----------------------	----------------------------	--------------------------	--	---	---	---

2. Plantskids š.p.

Reg. Nr. 0274, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: žāvētu asiņu milti, 87 %.

Repelents.

SIA "American Equipment & Supply"

Skuju koki jaunaudzēs	Aļņi, staltbrīeži, stirnas, zaķi	1.0–1.1 kg/1000 kociņiem		Apsmidzināt jauno skuju kociņu galotnes jaunaudzēs. Darba šķidruma patēriņš 5.0–5.5 litri uz 1000 kociņiem	–	2
Lapu koki jaunaudzēs	Aļņi, staltbrīeži, stirnas, zaķi	1.0–1.1 kg/1000 kociņiem		Apstrādāt visu jauno kociņu ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0–5.5 litri uz 1000 kociņiem	–	2

3. Skuju pulveris SM 87

Reģ. Nr. 0237, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: priedes un egles skuju ēteriskās eļļas, >0.05 %.

Repelents.

A/S "BIOLAT"

Avenes	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)	0.01–0.02 kg/augu vai 30–35 kg/ha uz rindu vai vagu vai 50–60 kg/ha vienlaidus		Apkaisīt pirmo reizi, parādoties ziednešiem, atkārtoti apkaisīt, parādoties ziedpumpuriem	–	2
Sīpoli	Sīpolu ziedu muša (<i>Eumerus strigatus</i>), sīpolu muša (<i>Chortophila antiqua</i>)			Apkaisīt pirmo reizi stādīšanas laikā. Atkārtoti apkaisīt 2–3 reizes ik pēc 10–14 dienām	–	4
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)			Apkaisīt pirmo reizi maija beigās – jūnija sākumā. Atkārtoti apkaisīt pēc 10–14 dienām	–	2
Kāposti	Agrā kāpostu muša (<i>Delia brassicae</i>), vēlā kāpostu muša (<i>Delia floralis</i>)			Apkaisīt dēstus tūlīt pēc iestādīšanas. Atkārtoti apkaisīt pēc 10–14 dienām	–	2
Redīsi, rutki, kāļi	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>)			Apkaisīt, parādoties kultūrauga dīgstiem. Atkārtoti apkaisīt pēc 10–14 dienām	–	2
Gladiolas	Gladiolu tripsis (<i>Taeniothrips simplex</i>)			Apkaisīt bagātīgi bumbulšīpolus pirms novietošanas glabāšanā	–	1

RODENTICĪDI

Lietošanas vieta	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. Polytanol

Reg. Nr. 0363, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kalcija fosfīds, 18%.

Rodenticīds.

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co.KG

Zālājs, zāliens, lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras	Ūdenszūrka (<i>Arvicola terrestris</i>), kurmis (<i>Talpa europaea</i>)	8–10 kg/ha vai 8–10 g uz alu/eju		Ar speciālu iestrādes ierīci ievieto nepieciešamo preparāta daudzumu katrā alas vai ejas atverē, kuru pēc tam nekavējoties noslēdz ar augsni	–	2
--	---	----------------------------------	--	--	---	---

MIKROBIOLOĢISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšana
1	2	3	4	5

1. Rotstop SC

Reģ. Nr. 0401, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms *Phlebiopsis gigantea* strain 1835.

Fungicīds.

Verdera Oy

Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i>)	2 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs automātiski zāģēšanas laikā, izmantojot mehānizēto celmu apstrādi. Darba šķidruma patēriņš 2 l/m ²	Suspensijas koncentrāts, 1 g preparāta satur 2 x 10 ⁶ –10 ⁷ kolonijas veidojošo vienību
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i>)	1 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs, apstrādājot tos ar muguras smidzinātāju pēc nozāģēšanas. Darba šķidruma patēriņš 1 l/m ²	

2. Rotstops p.s.

Reģ. Nr. 0295, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms (*Phlebiopsis gigantea*).

Fungicīds.

Verdera Oy

Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i>)	2 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs automātiski zāģēšanas laikā, izmantojot mehānizēto celmu apstrādi. Darba šķidruma patēriņš 2 l/m ²	1 g preparāta satur 2x10 ⁶ –10 ⁷ kolonijas veidojošo vienību
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i>)	1 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs, apstrādājot tos ar muguras smidzinātāju pēc nozāģēšanas. Darba šķidruma patēriņš 1 l/m ²	

DZĪVOS ORGANISMUS SATUROŠIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšanas ilgums
1	2	3	4	5

1. Afidends

Reģ. Nr. 0124, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).

Koppert B.V.

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās	Laputis	Izlaišanai visā platībā: 1 kūniņa/ m ²	Iznīcina laputis. Izlikt kūniņas augu mājā, parādoties laputīm, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	Vermikulītā iejauktas pangodiņa kūniņas. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 10 kūniņas/ m ²		

2. Afidiuss

Reģ. Nr. 0064, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: laputu lapsenīte (*Aphidius colemani*).

IK "Ciklaneda BS"

Gurķi, tomāti, pipari, selerijas, salāti, pētersīļi augu mājās	Laputis	15 mūmijas/m ²	Parazitē laputis. Izlikt mūmijas augu mājā, kaitēklim parādoties	Laputu mūmijas. Uzglabāt +5°C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 15 dienām
--	---------	---------------------------	--	---

3. Ambliseiuss

Reģ. Nr. 0063, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsējērcē (*Amblyseius cucumeris*).

IK "Ciklaneda BS"

Gurķi, tomāti augu mājās	Tīklērces, tripši	500 ērces/m ²	Iznīcina tīklērces, tripšu kāpurus, retāk olas. Izlaist, kaitēklim parādoties	Plēsējērces. Uzglabāt +10°C temperatūrā, ne ilgāk par 3 dienām
Pipari augu mājās	Tripši			

4. Enkarsija

Reģ. Nr. 0061, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: spožlapsene (*Encarsia formosa*).

IK "Ciklaneda BS"

Gurķi augu mājās	Baltblusiņa	10 pupāriji/m ²	Parazitē 3.–4. vecuma baltblusiņu kāpurus. Izlikt pupārijus augu mājā, kaitēklim parādoties	Pupāriji. Uzglabāt +10°C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 30 dienām
Tomāti augu mājās		5 pupāriji/m ²		

5. Enstrips

Reģ. Nr. 0125, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: spožlapsene (*Encarsia formosa*).

Koppert B.V.

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās	Baltblusiņa	Izlaišanai visā platībā: 3–6 pupāriji / m ²	Parazitē 3. – 4. vecuma baltblusiņu kāpurus. Izlikt pupārijus augu mājā, kaitēklim parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	Pie kartona strēmelēm fiksēti pupāriji. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 9 pupāriji / m ²		
		Profilaktiskai izlaišanai: 1,5–3 pupāriji / m ²	Izlikt pupārijus atkārtoti ar intervālu 7–14 dienas	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. Entomits

Reģ. Nr. 0142, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsējērce (*Hypoaspis aculeifer*).**Koppert B.V.**

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās	Trūdodiņu kāpuri, tripši un nematodes	Izlaišanai visā platībā: 200 plēsējērces / m ²	Plēsējērces 1 reizi vienmērīgi izvieto uz augsnes vai substrāta maisiem, profilaktiski lieto kultūrauga dēstu aizsardzībai	Vermikulītā iejauktas plēsējērces. Uzglabāt tumšā, +10 °C līdz +15 °C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 500 plēsējērces / m ²		
		Profilaktiskai izlaišanai: 100 plēsējērces / m ²		

7. Fitosējuluss

Reģ. Nr. 0060, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsējērce (*Phytoseiulus persimilis*).**IK "Ciklaneda BS"**

Gurķi augu mājās	Tīklērces	1 plēsējērce uz 50 tīklērcēm	Iznīcina visu vecumu tīklērces, to olas. Izlaist augu mājā 1 reizi, kaitēklim parādoties	Plēsējērces uz augu lapām. Uzglabāt +3°C temperatūrā pie gaisa mitruma 80 %, ne ilgāk par 2 nedēļām
Tomāti augu mājās		1 plēsējērce uz 25 tīklērcēm		
Rozes augu mājās		1 plēsējērce uz 10 tīklērcēm		

8. Minekss

Reģ. Nr. 0126, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: parazītlapsenes (*Dacnusa sibirica*, *Diglyphus isaea*).**Koppert B.V.**

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās	Alotājmušu kāpuri	Izlaišanai visā platībā: 0.25 parazītlapsenes / m ²	Parazitē un iznīcina lapu alotājmušu kāpurus. Izlaist parazītlapsenes augu mājā, kaitēklim parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	Parazītlapsenes. Uzglabāt tumšā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Profilaktiskai izlaišanai: 0.25 parazītlapsenes / m ²	Parazitē un iznīcina lapu alotājmušu kāpurus. Izlaist parazītlapsenes augu mājā atkārtoti ar intervālu 7 dienas	

9. Mirikals

Reģ. Nr. 0127, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsīgā mīkstblaktis (*Macrolophus caliginosus*).**Koppert B.V.**

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās	Baltblusiņas, laputis, tīklērces, tripši, tauriņu kāpuri	Izlaišanai visā platībā: 0.5 mīkstblaktis / m ²	Plēsīgās mīkstblaktis izlaist augu mājā, kaitēklim parādoties, 2 reizes ar intervālu 14 dienas	Koka skaidiņās iejauktas plēsīgās mīkstblaktis. Uzglabāt tumšā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 5 mīkstblaktis / m ²	Plēsīgās mīkstblaktis izlaist augu mājā tikai kaitēkļu invāzijas perēkļos, 2 reizes ar intervālu 14 dienas	
		Profilaktiskai izlaišanai: 0.25 mīkstblaktis / m ²	Plēsīgās mīkstblaktis izlaist augu mājā, 2 reizes ar intervālu 14 dienas (kopā ar barību Entofood)	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. Pangodiņš

Reģ. Nr. 0062, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsīgais pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).**IK "Ciklaneda BS"**

Gurķi, tomāti, pipari augu mājās	Laputis	40 kūniņas/m ²	Izlikt kūniņas augu mājā, kaitēklim parādotes	Kūniņas. Uzglabāt +8°C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 10 dienām
-------------------------------------	---------	---------------------------	--	---

11. Spidekss

Reģ. Nr. 0128, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsējērcē (*Phytoseiulus persimilis*).**Koppert B.V.**

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās	Tīklērces	Izlaišanai visā platībā: 6 plēsējērces / m ²	Iznīcina dažādu sugu tīklērces. Izlaist plēsējērces augu mājā, kaitēklim parādotes, 1–2 reizes ar intervālu 7 dienas	Koka skaidiņās iejauktas plēsējērces. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 20–50 plēsējērces / m ²	Iznīcina dažādu sugu tīklērces. Izlaist plēsējērces augu mājā tikai kaitēkļu invāzijas perēkļos, 2 reizes ar intervālu 7 dienas	
		Profilaktiskai izlaišanai: 2 ērces / m ²	Iznīcina dažādu sugu tīklērces. Izlaist plēsējērces augu mājā atkārtoti ar intervālu 14 dienas, nelielās siltumnīcu saimniecībās, gadījumos, kad var prognozēt tīklērces parādīšanos	

12. Trihogramma

Reģ. Nr. 0143, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: spožlapsenīte (*Trichogramma embryophagum*).**SIA "Bioefekts"**

Ābeles	Ābolu tinējs (<i>Carpocapsa pomonella</i>)	0.5–1.0 g/ha	Izlikt uz ābelēm, kad kaitēklis izlidojis, 2 reizes ar intervālu 7–10 dienas	Ar trihogrammu parazitētas graudu kodes olas. Uzglabāt tumsā, +5°C līdz +6°C temperatūrā, ne ilgāk par 3 nedēļām
Zirņi	Zirņu tumšais tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.5–1.0 g/ha	Izlikt uz zirņiem 1 reizi ziedēšanas sākumā. Ja zirņi bagātīgi zied, ieteicams izlikt atkārtoti	Ar trihogrammu parazitētas graudu kodes olas.
Kāposti, krustziežu dārzeni	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Artogeia rapae</i>), kāpostu pūcite (<i>Barathra brassicae</i>) u.c.	0.5–1.0 g/ha	Izlikt kāpostos un krustziežu dārzenos 1–2 reizes, kaitēkļu lidošanas sākumā	Uzglabāt tumsā, +5°C līdz +6°C temperatūrā, ne ilgāk par 3 nedēļām

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13. Tripekss (Tripekss pluss)

Reģ. Nr. 0129, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: plēsējērcē (*Amblyseius cucumeris*).**Koppert B.V.**

Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās (Tripekss)	Tripši	Izlaišanai visā platībā: 100 plēsējērces / m ²	Iznīcina tripšu kāpurus un olas īsi pirms izšķilšanās. Izlaist plēsējērces augu mājā, kaitēklim parādotes, atkārtoti ar intervālu 14 dienas	Plēsējērces. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 100 plēsējērces / m ²	Iznīcina tripšu kāpurus un olas īsi pirms izšķilšanās. Izlaist plēsējērces augu mājā, kaitēklim parādotes, atkārtoti ar intervālu 7 dienas	
		Profilaktiskai izlaišanai: 50 plēsējērces / m ²	Iznīcina tripšu kāpurus un olas īsi pirms izšķilšanās. Izlaist plēsējērces augu mājā atkārtoti ar intervālu 14 dienas	
Dārzeni un krāšņumaugi augu mājās (Tripekss pluss)	Tripši	Izlaišanai visā platībā: 1 iepakojums (1000 plēsējērces) / 2.5 m ²	Iznīcina tripšu kāpurus un olas īsi pirms izšķilšanās. Izlaist plēsējērces augu mājā atkārtoti ar intervālu 35 dienas	Plēsējērces. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Lokālai izlaišanai: 1 iepakojums (1000 plēsējērces) / 0.75 m ²	Iznīcina tripšu kāpurus un olas īsi pirms izšķilšanās. Izlaist plēsējērces augu mājā, kaitēklim parādotes, atkārtoti ar intervālu 42 dienas	
		Profilaktiskai izlaišanai: 1 iepakojums (1000 plēsējērces) / 2.5 m ²	Iznīcina tripšu kāpurus un olas īsi pirms izšķilšanās. Izlaist plēsējērces augu mājā atkārtoti ar intervālu 28 dienas	

2010. GADĀ ANULĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANA

AUGU VAI DZĪVNIEKU VALSTS IZCELSMES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

1. EkoFits d.š. Atļauts izlietot līdz 31.12.2014.

Reģ. Nr. 0231, reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: piretrīni ekstrahēti no *Chrysanthemum cinerariaefolium*, 0.0015 %, priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 2 %.

Insekticīds. Pieskares un zarnu inde.

IU"Dārza Apgāds"

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	Apsmidzināt, parādoties kaitēkļiem	–	4
Kāposti	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>)		3	4
Zemenes	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)		–	4
Augļu koki	Tinēji (<i>Tortricidae</i>), ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>)		3	4
Ogulāji	Tinēji (<i>Tortricidae</i>)		3	4
Krāšņumaugi	Laputis (<i>Aphididae</i>), siltumnīcu baltbusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)		–	4

2. EkoFits e.k. Atļauts izlietot līdz 31.12.2014.

Reģ. Nr. 0230, reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: piretrīni, ekstrahēti no *Chrysanthemum cinerariaefolium*, 1.5 g/l, priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 950 g/l.

Insekticīds. Pieskares un zarnu inde.

IU"Dārza Apgāds"

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt, parādoties kaitēkļiem	–	4
Kāposti	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>)		0.5–1.0		3	4
Zemenes	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)		0.5–1.0		–	4

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Augļu koki	Tinēji (<i>Tortricidae</i>), ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt, parādotes kaitēkļiem	3	4
Ogulāji	Tinēji (<i>Tortricidae</i>),		0.5–1.0		3	4
Krāšņumaugi	Laputis (<i>Aphididae</i>), siltumnīcu baltbusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)		0.5–1.0		–	4

3. Silgards 20 s.k. Atļauts izlietot līdz 31.12.2014.

Reģ. Nr. 0229, reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: Austrālijas tējas koka eļļa, 200 g/l,
priedes un egles skuju ekstraktvielu maisījums, 800 g/l.

Kodne. Pieskares iedarbība.

IU“Dārza Apgāds”

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/t	Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, l/t	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
1	2	3	4	5
Ziemas kvieši, vasaras kvieši,	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0–3.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0–3.0	10.0	

**AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KAS SATUR SADZĪVĒ IZMANTOJAMAS VIELAS**

4. Sērs p. Atļauts izlietot līdz 31.12.2014.

Reģ. Nr. 0246, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: sērs, 90 %.

Fungicīds un akaricīds. Pieskares iedarbība.

SLA “Bioefekts”

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Gurķi	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)		1.0	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēklim parādotes	1	4
Krāšņumaugi	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)		1.0		–	4
Upenes	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)		1.0	Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādotes	1	4
Zemenes	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urticae</i>), zemeņu ērce (<i>Tarsonemus pallidus</i>)		1.0		1	4
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi	Īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	1	4
Krāšņumaugi	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)		0.5–1.0	Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	4
Upenes	Ērkšķogu Amerikas miltrasa (<i>Sphaerotheca morsuuae</i>)		1.0	Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	1	4
Siltumnīcas, pagrabi	Kaitīgie kukaiņi, ērces, slimību un bakteriālo infekciju ierosinātāji		50 g/m ³	Sadedzināt slēgtā telpā. Izvēdināt telpas pēc 36 stundām	–	1

5. Zaļās ziepes e.k. Atļauts izlietot līdz 31.12.2014.

Reģ. Nr. 0247, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: taukskābju kālija sāls, 12 %.

Insekticīds. Pieskares iedarbība.

SIA “Bioefekts”

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi, dārzeņi, augļu koki, ogulāji, dekoratīvie koki un krūmi, krāšņumaugi	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), lapu blaktis (<i>Miridae</i>), lapu blusīņas (<i>Psyllinea</i>)		3.5	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēklim parādoties	–	4
Krāšņumaugi	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), bruņutis (<i>Coccinea</i>)		3.5	Nomazgāt augu lapas, lapu kātus un stublājus ar mīkstu suku, kaitēklim parādoties	–	4

FUNGICĪDI KARTUPEĻU LAKSTU PUVES (*PHYTOPHTHORA INFESTANS*) IEROBEŽOŠANAI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha, %	Ieteicamais intervāls smidzinājumiem, dienās	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Sistēmas iedarbības fungicīdi				
Gloria	2.0	7–14	7	3
Infinito	1.2–1.6	7–12	7	4
	12–16 ml/100 m²			
Litagra Glorija 450 s.k.	20 g/100 m²	7–14	7	3
Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīdi				
Ridomil Gold MZ 68 WG	2.5	10–14	20	2
	25 g/100 m²			
Lokālas sistēmas iedarbības fungicīdi				
Elektis 75 d.g.	1.8	7–10	7	8
Revus 250 s.k.	0.5–0.6	7–10	3	2
Lokālas sistēmas un pieskares iedarbības fungicīdi				
Acrobat Plus	2.0	10–14	7	4
Orvego	0.8	5–10	7	3
Pieskares iedarbības fungicīdi				
Altima 500 s.k.	0.4	7–10	7	8
Bordo maisījums	0.5–1.0	7–10	15	3
Čempions 50 p.s.	2.5	7–10	7	3
Dithane NT	2.0–3.0	7–10	7	8
Fungurāns OH 300 s.k.	3.0–3.5	7–10	14	4
Leimay SC	0.5	7–10	7	6
Penncozeb 75 DG	2.0	7–14	14	3
Penncozeb 80 WP	2.0	7–14	14	3
Ranmans A s.k.	0.2	7–10	7	6
Ranman Top	0.5	5–10	7	6
Širlans 500 s.k.	0.4	7–10	7	8

FUNGICĪDI AUGĻU DĀRZIEM

Augu aizsardzības līdzeklis	Apstrādājamā kultūra / deva l, kg/ha, %				Kaitīgais organisms																
	Ābeles	Bumbieres	Kirši	Plūmes	Ābeļu kraupis <i>Venturia inaequalis</i>	Ābeļu lapu pelēkplankumainība <i>Phoma macrostoma</i>	Ābeļu miltņrūsa <i>Podosphæra leucotricha</i>	Ābeļu-paegļu rūsa <i>Gymnosporangium tremelloides</i>	Augļu koku iedegas <i>Pezicula malicorticis</i>	Augļu koku vēzis <i>Nectria galligena</i>	Augļu parastā puve <i>Monilinia fructigena</i>	Augļu rūgtā puve <i>Pezicula alba</i> , <i>Colletotrichum gleosporioides</i>	Bumbieru kraupis <i>Venturia pirina</i>	Bumbieru rūsa <i>Gymnosporangium sabinaea</i>	Kaulenķoku pelēkā puve <i>Monilinia laxa</i>	Kaulenķoku sausplankumainība <i>Stigminta carpophila</i>	Koku baktēriālais vēzis <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Kiršu lapbīrē <i>Blumeriella jappii</i>	Kiršu kraupis <i>Venturia cerasi</i>	Pelēkā puve <i>Botryotinia fuckeliana</i>	Plūmju rūsa <i>Transschelia pruni-spinosae</i>
Bordo maisījums	1–3% vai 0.5–1.0	1–3% vai 0.5–1.0	1–3% vai 0.5–1.0	1–3% vai 0.5–1.0	•						•		•		•	•		•			
Chorus 50 WG	0.30–0.45	0.45	0.45	0.45	•						•		•		•						
Čempions 50 p.s.	3.0–13.0	3.0–13.0	3.0–13.0	3.0–13.0	•				•				•		•	•	•				
Dithane NT	2.0–3.0	2.0–3.0			•								•								
Effector	0.05–0.10%	0.05–0.10%	0.05–0.10%	0.075–0.100%	•		•		•	•	•		•		•	•		•	•		•
Fungurāns OH 300 s.k.	1.25–1.50	1.25–1.50			•								•								
Kandits d.g.	0.15–0.25	0.15–0.25			•								•								
Signum d.g.			0.75–1.0	0.75–1.0							•				•			•			
Skors 250 e.k.	0.15–0.20	0.15–0.20			•																
Topāzs 100 e.k.	0.375–1.000		0.375–1.000																		•

KODNES ZIEMĀJU GRAUDAUGU SĒKĻU KODINĀŠANAI, TO DEVAS UN IEROBEŽOJAMĀS AUGU SLIMĪBAS

	Ziemas kvieši	Kviešu cietās mēlplaukas	Kviešu putošā mēlplauka	Kviešu pundurmēlplauka	Kviešu plēkšņu plankumainība	Labību tumšbrūnā plankumainība	Kviešu dzeltenplankumainība	Sakņu puves	Sniega pelējums	Sēkļu pelējums	Melnie graudi	Ziemas mieži	Miežu cietā mēlplauka	Miežu putošā mēlplauka	Miežu lapu brūnsvitārinība	Miežu lapu tīkļplankumainība	Labību tumšbrūnā plankumainība	Sakņu puves	Sniega pelējums	Sēkļu pelējums	Rudzu stiebru mēlplauka	Labību tumšbrūnā plankumainība	Sakņu puves	Sniega pelējums	Sēkļu pelējums	Melnie graui	Triticāle	Deva kg,l/t	Melnie garudi			
	Deva kg, l /t	3.0–4.0	+	+		+		+	+			3.0–4.0	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		3.0–4.0	Deva kg,l/t	+	Melnie garudi		
Baytan Universal	0.5	+	+					+	+		+	–							+	+				+	+		0.5		+	+	Sniega pelējums	
	0.5	+	+					+				0.5			+				+	+				+	+		–				Sniega pelējums	
Čāmbels s.k.	2.0	+	+		+							2.0	+	+			+					+		+	+		–			+	Sniega pelējums	
	1.5–2.0		+					+	+			1.5–2.0				+			+	+				+	+		1.5–2.0				Sniega pelējums	
Dividends Stārs 036 s.k.	–											1.5	+	+	+		+		+								–				Sniega pelējums	
Kemikars T s.k.	2.5–3.0	+	+					+	+	+		2.5–3.0	+	+					+	+	+			+	+		–				Sniega pelējums	
Kinto š.k.	2	+	+					+	+			2.0	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		2.0				Sniega pelējums	
Maksims 025 s.k.	1.5–2.0	+						+	+			1.5–2.0	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		–				Sniega pelējums	
Maksims ekstra 50 s.k.	1.5–2.0	+						+	+			1.5–2.0	+		+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		1.5–2.0				Sniega pelējums	
Maksims Stārs 025 s.k.	1.0–1.5	+	+					+	+			1.5–2.0	+	+	+	+	+	+	+								–				Sniega pelējums	
Premis 25 s.k.	1.5–2.0	+	+					+				1.5–2.0		+				+	+			+	+	+	+		1.5–2.0				Sniega pelējums	
Raksils Ekstra 515 š.k.	2.0	+	+					+	+			2.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		2.0				Sniega pelējums	
Vincits s.k.	2.0	+	+					+	+			2.0	+	+	+				+	+				+	+		–				Sniega pelējums	
Vitavakss 200 FF s.k.	2.5–3.0	+	+					+	+	+		2.5–3.0	+	+					+	+	+			+	+	+	2.5–3.0					Sniega pelējums

KODNES VASARĀJU GRAUDAUGU SĒKLU KODINĀŠANAI, TO DEVAS UN IEROBĒŽOJAMĀS AUGU SLIMĪBAS

	Vasaras kvieši	Deva kg, l / t	Kviešu cietās melnplaukas	Kviešu putošā melnplauka	Kviešu pundurmelnplauka	Kviešu plēkšņu plankumainība	Labību tumšbrūnā plankumainība	Kviešu dzeltenplankumainība	Sākņu puves	Sēklu pelējums	Vasaras mieži	Deva kg, l/t	Miežu cietā melnplauka	Miežu putošā melnplauka	Miežu lapu brūnsvītarība	Miežu lapu tīkļplankumainība	Labību tumšbrūnā plankumainība	Sākņu puves	Sēklu pelējums	Auzas	Deva kg, l/t	Auzu cietā melnplauka	Auzu putošā melnplauka	Labību tumšbrūnā plankumainība	Auzu brūnplankumainība	Sākņu puves	Sēklu pelējums
Čambels s.k.	0.5		+	+					+		0.5	+	+	+	+	+				-							
Celest Trio 060 FS	2.0		+	+	+						2.0	+	+	+						-							
	1.5-2.0					+			+		1.5-2.0					+		+		1.5		+	+	+			
Dividends Stārs 036 s.k.	1.0-1.5		+	+		+	+		+		1.5	+	+	+	+		+	+				+	+	+			
Kemikars T s.k.	2.5-3.0		+	+					+	+	2.5-3.0	+	+	+				+	+			+	+			+	+
Kinto š.k.	1.5-2.0		+	+		+			+		2.0	+	+	+	+	+		+		2.0		+	+		+		
Lamardor	0.15		+	+					+		0.2	+	+	+	+	+		+		-							
Maksims 025 s.k.	1.5-2.0		+			+			+		1.5-2.0	+	+		+	+	+	+		-							
Maksims ekstra 50 s.k.	1.0-1.5		+			+	+	+	+		1.0-1.5	+	+		+	+	+	+		1.0-1.5		+				+	
Maksims Stārs 025 s.k.	1.0-1.5		+	+		+	+		+		1.5-2.0	+	+	+	+	+		+		-							
Premis 25 s.k.	1.5-2.0		+	+		+			+		1.5-2.0			+				+		1.5-2.0			+			+	
Vincits s.k.	2.0		+	+		+			+		2.0	+	+	+	+			+		2.0		+	+				
Vitavakss 200 FF s.k.	2.5-3.0		+	+					+	+	2.5-3.0	+	+	+				+	+	2.5-3.0		+	+			+	+

FUNGICĪDI GRAUDAUGIEM

MIEŽI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms															
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata Cladosporium herbarum</i>	Graudzāļu baltplankumainība <i>Ascochyta graminicola</i>	Miežu lapu brūnplankumainība <i>Bipolaris sorokiniana</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Miežu lapu brūnsvītrainība <i>Drechslera graminea</i>	Miežu lapu tīklplankumainība <i>Drechslera teres</i>	Graudzāļu miltņasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Graudzāļu stiebru rūsa <i>Puccinia graminis</i>	Pundurrūsa <i>Puccinia hordei</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Stiebrzāļu gredzenplankumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>	Miežu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria hordei</i>	Ramulārija <i>Ramularia collo-cygni</i>	Stiebru lūšana <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	Sakņu kakla puve <i>Rhizoctonia cerealis</i>
Adexar	1.5–2.0						•	•			•		•		•		
Akanto 250 s.k.	0.25–1.0						•	•			•		•				
Akanto Prīma š.g.	0.75–1.5						•	•			•		•			•	
Allegro Super s.e.	0.5–1.0 vai 0.5+ 0.5						•	•			•	•	•				
Amistārs 250 s.k.	0.8–1.0	•									•	•					
Amistārs ekstra s.k.	0.5–0.8	v•					v•	v•			v•	v•					
Amistārs Opti 480 s.k.	1.5–2.0						•				•	•					
Archer Turbo 575 EC	0.5–1.0						•	•			•		•				
Artea 330 e.k.	0.4–0.5		•				•	•			•	•	•				
Bampers 25 e.k.	0.5							•				•	•				
Bampers Super e.k.	1.0						•	•			•	•	•			•	
Barclay Bolt XL	0.5	•									•	•					
Bell	0.75–1.0						•	•			•		•		•	•	
Bell Super OD	1.25–2.5						•	•			•		•		•	•	
Cerīax	2.0–3.0						•	•			•		•		•		
Comet	1.0			•			•	•					•				
Comet Pro	1.25						•				•	•					
Duets Ultra s.k.	0.4–0.6						•	•			•		•				
Epox Extra	1.0–2.0						•	•			•		•				
Epox Top e.k.	1.5–2.5						•	•					•				
Falcon Forte	0.6–0.8						•	•			•		•				
Falkons 460 e.k.	0.6						•	•	•		•	•	•				
Fandango	0.8–1.0						•	•	•		•		•		•		
Fleksiti s.k.	0.5							•									
Folikūrs 250 e.ū.	1.0			•	•		•	•			•	•	•				
Golden Propiconazol 250 EC	0.5							•				•	•				
Imbrex	2.0						•	•			•		•		•		
Impakts 25 s.k.	0.5						•	•			•	•	•				
Impakts s.k.	1.0						•	•			•	•	•				
Input	1.0				•		•	•			•		•			•	•
Juventus 90 š.k.	0.7–1.0			v•				v•			v•		v•				
Kapalo s.e.	1.0–2.0						•	•			•	•	•				
Korbels e.k.	0.5–1.0							•			•	•	•				
Leander	0.5							•			•	•					
Maredo 125 SC	0.5–1.0						•	•			•	•	•				
Menara 410 EC	0.4–0.5							•					•				
Mirāža 45 e.k.	1.0						•	•	•				•			•	
Mystic	1.0	•			•		•	•			•		•				
Opera N	1.0–2.0			•			•	•			•	•	•				
Opus EC	0.75–1.5					•	•	•			•	•	•				
Opus s.k.	0.5–1.0			•			•				•		•				
Orius 250 e.ū.	0.5–1.0			•	•		•	•			•	•	•				
Osiris	^z 1.5–3.0 ^v 1.0–2.0						•				•		•				
Prosaro	0.75–1.0			•	•		•	•			•	•	•				
Riza 250 e.ū.	1.0						•	•			•	•					
Sportak EW	1.0						•	•								•	
Tango Flex	0.75–1.5						•	•			•	•	•				
Tango Super s.e.	0.75–1.50			•			•	•			•		•				
Tilts 250 e.k.	0.5	•					•	•		•	•	•	•				
Vista 228 s.e.	1.5						•	•					•	•		•	
Viverda OD	1.25–2.5						•	•			•		•		•	•	
Zamirs 400 e.ū.	1.2–1.5				•		•	•			•		•				
Zantara	0.9–1.2						•	•			•		•				

KVIEŠI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms													
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata Cladosporium herbarum</i>	Graudzāļu baltplankumainība <i>Ascochyta graminicola</i>	Kviešu tumšbrūnā plankumainība <i>Bipolaris sorokiniana</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Kviešu lapu dzeltenplankumainība <i>Drechslera tritici-repentis</i>	Graudzāļu milt rasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Stiebru lišana <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	Graudzāļu stiebru rūsa <i>Puccinia graminis</i>	Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Kviešu plēkšņu plankumainība <i>Septoria nodorum</i>	Kviešu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria tritici</i>	Sakņu kakla puve <i>Rhizoctonia cerealis</i>
Adexar	2.0					•	•				•	•	•	•	
Akanto 250 s.k.	0.25–1.0						•				•	•	•	•	
Akato Prīma s.g.	0.75–1.5					•	•		•		•		•	•	
Allegro Super s.e.	0.75–1.5 vai 0.75+0.75–1.0					•	•				•	•	•	•	
Amistārs 250 s.k.	0.8–1.0	•				•	•				•	•	•	•	
Amistārs ekstra s.k.	0.4–1.0	•			•	•	•				•	•	•	•	
Amistārs Opti 480 s.k.	1.0–2.0					•	•				•	•	•	•	
Archer Turbo 575 EC	0.5–1.0					•	•				•	•	•	•	
Artea 330 e.k.	0.25–0.50		•	•		•	•		•		•	•	•	•	
Bampers 25 e.k.	0.5						•				•	•	•	•	
Bampers Super e.k.	1.0	•				•	•		•		•	•	•	•	
Barclay Bolt XL	0.5	•									•	•	•	•	
Bell	0.75–1.5					•			•		•	•	•	•	
Bell Super OD	1.25–2.5					•	•		•		•	•	•	•	
Cerix	2.0–3.0					•	•				•	•	•	•	
Comet.	1.0					•	•				•	•	•	•	
Comet Pro	1.25					•					•	•	•	•	
Dithane NT	2.0									z.				z.	
Duets Ultra s.k.	0.3–0.6 vai 0.3+0.3					•	•				•	•	•	•	
Epo Extra	1.0–2.0					•	•				•	•	•	•	
Epo Top e.k.	1.5–2.5					•	•						•	•	
Falcon Forte	0.6–0.8					•	•				•		•	•	
Falkons 460 e.k.	0.6						•	•		•		•	•	•	
Fandango	0.8–1.0					•	•	•		•	•	•	•	•	
Fleksiti s.k.	0.5						•								
Folikūrs 250 e.ū.	1.0				•	•	•				•	•	•	•	
Golden Propiconazol 250 EC	0.5						•				•	•	•	•	
Imbrex	2.0					•	•				•	•	•	•	
Impakts 25 s.k.	0.5						•				•	•	•	•	
Impakts s.k.	1.0						•				•	•	•	•	
Input	0.8–1.0				•	•	•		•		•	•	•	•	•
Juventus 90 š.k.	0.7–1.0				•	•	•				•	•	•	•	
Kapalo s.e.	1.0–2.0					•	•				•	•	•	•	
Korbels e.k.	0.5–1.0						•				•	•			
Leander	0.5						•				•	•	•	•	
Maredo 125 SC	0.5–1.0					•	•				•	•	•	•	
Menara 410 EC	0.4–0.5					•	•				•		•	•	
Mirāža 45 e.k.	1.0						•	•	•				•	•	
Mystic	1.0				•	•	•							•	
Opera N	1.0–2.0 vai 1.0+1.0					•	•				•	•	•	•	
Opus EC	0.75–1.5					•	•				•	•	•	•	
Opus s.k.	0.5–1.0					•	•				•	•	•	•	
Orius 250 e.ū.	1.0				•	•	•				•	•	•	•	
Osiris	1.5–3.0				•	•	•				•	•	•	•	
Prosaro	0.75–1.0				•	•	•				•	•	•	•	
Riza 250 e.ū.	1.0	•			•	•	•				•	•	•	•	
Sportak EW	1.0				•	•	•		•				•	•	
Swing Gold	1.5				•	•	•				•	•	•	•	
Tango Flex	0.75–1.5					•	•				•	•	•	•	
Tango Super s.e.	0.75–1.50					•	•				•	•	•	•	
Taspa 500 EC	0.5					•	•				•	•	•	•	
Tilts 250 e.k.	0.5	•		•		•	•			•	•	•	•	•	
Vista 228 s.e.	1.5					•	•				•	•	•	•	
Viverda OD	1.25–2.5					•			•		•	•	•	•	
Zamirs 400 e.ū.	1.2–1.5				•	•	•				•	•	•	•	
Zantara	0.9–1.2					•	•				•	•	•	•	

RUDZI

Augu aizsardzības līdzeklis	Kaitīgais organisms												
	Deva l, kg/ha	Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata</i> <i>Cladosporium herbarum</i>	Tumšbrūnā plankumainība <i>Bipolaris sorokiniana</i>	Stiebru lūšana <i>Pseudocercospora herpotricoides</i>	Graudzāļu miltrasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Graudzāļu stiebru rūsa <i>Puccinia graminis</i>	Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Stiebrzāļu gredzenplankumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>	Rudzu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria secalis</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Rudzu brūnplankumainība <i>Drechslera tuberosa</i> Sakņu kakla puve <i>Rhizoctonia cerealis</i>
Adexar	2.0				•			•	•	•			
Akanto 250 s.k.	0.25–1.0				•			•		•			
Akanto Prīma š.g.	0.75–1.5			•	•			•		•			
Allegro Super s.e.	0.75–1.5 vai 0.75+0.75				•			•	•	•			
Amistārs 250 s.k.	0.8–1.0	•						•	•				
Amistārs Opti 480 s.k.	1.5–2.0								•				
Archer Turbo 575 EC	1.0							•		•			
Bampers 25 e.k.	0.5				•			•	•				
Bampers Super e.k.	1.0	•		•	•			•		•			
Barclay Bolt XL	0.5	•			•			•					
Bell	0.75–1.5			•				•		•			
Bell Super OD	1.25–2.5			•				•	•	•			
Cerix	2.0–3.0				•			•	•	•			
Comet	1.0				•			•		•			
Duets Ultra s.k.	0.3–0.6				•			•		•			
Epox Top e.k.	1.5–2.5				•			•		•			
Falcon Forte	0.6–0.8				•			•		•			
Falkons 460 e.k.	0.6				•	•		•		•	•		
Fandango	0.8–1.0				•	•		•	•	•			
Fleksiti s.k.	0.5				•								
Folikūrs 250 e.ū.	1.0				•			•	•	•		•	
Golden Propiconazol 250 EC	0.5				•			•	•				
Imbrex	2.0				•			•		•			
Input	0.8–1.0			•	•			•	•	•		•	•
Juventus 90 š.k.	0.7–1.0				•			•		•	•		
Kapalo s.e.	1.0–2.0				•			•	•	•			
Korbels e.k.	0.5–1.0				•			•	•	•			
Leander	0.5				•			•					
Maredo 125 SC	0.5–1.0							•	•	•			
Menara 410 EC	0.4–0.5							•		•			
Mirāža 45 e.k.	1.0			•	•	•				•			
Mystic	1.0							•		•			
Opera N	1.0–2.0				•			•		•			
Opus EC	0.75–1.5				•			•		•			
Opus s.k.	0.5–1.0							•		•			
Orius 250 e.ū.	1.0				•			•	•	•		•	
Osiris	1.5–3.0				•			•		•			
Prosaro	0.75–1.0				•			•	•	•		•	
Riza 250 e.ū.	1.0	•			•				•	•		•	
Tango Super s.e.	0.75–1.50				•			•		•			
Tango Flex	0.75–1.5				•			•	•	•			
Tilts 250 e.k.	0.5	•			•		•		•				
Vista 228 s.e.	1.5				•			•		•	•		
Viverda OD	1.25–2.5			•				•	•	•			
Zamirs 400 e.ū.	1.2–1.5				•			•		•			
Zantara	0.9–1.2				•			•		•			

TRITIKĀLE

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms												
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata</i> <i>Cladosporium herbarum</i>	Graudzāļu miltņasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Graudzāļu stiebru rūsa <i>Puccinia graminis</i>	Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	Stiebrzāļu gredzenplankumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>	Kviešu plēkšņu plankumainība <i>Septoria nodorum</i>	Kviešu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria tritici</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Kviešu lapu dzeltenplankumainība <i>Drechslera tritici- repentis</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fussarium spp.</i>	Sakņu kakla puve <i>Rhizoctonia cerealis</i>	Stiebru lušana <i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>
Adexar	2.0		•			•		•	•	•				
Akanto 250 s.k.	0.25–1.0		•			•	•	•	•					
Akanto Prīma š.g.	0.75–1.5		•			•	•	•	•					•
Allegro Super s.e.	0.75–1.5 vai 0.75+0.75		•			•	•	•	•	•				
Amistārs 250 s.k.	0.8–1.0	•				•			•					
Amistārs ekstra s.k.	0.5–0.8	•	•			•		•	•	•				
Amistārs Opti 480 s.k.	1.5–2.0					•		•	•	•				
Archer Turbo 575 EC	0.5–1.0		•			•		•	•					
Bell	0.75–1.5					•		•	•	•				•
Bell Super OD	1.25–2.5					•		•	•	•				•
Cerix	2.0–3.0		•			•		•	•	•				
Comet	1.0		•			•	•							
Duets Ultra s.k.	0.3–0.6		•			•		•	•	•				
Epox Extra	1.0–2.0		•			•	•	•	•	•	•			
Epox Top e.k.	1.5–2.5		•			•	•	•	•	•				
Falcon Forte	0.6–0.8		•			•	•	•	•		•			
Falkons 460 e.k.	0.6		•	•		•	•							
Fandango	0.8–1.0		•	•		•	•	•	•	•	•			
Fleksiti s.k.	0.5		•											
Folikūrs 250 e.ū.	1.0		•			•	•	•	•	•	•			
Imbrex	2.0		•			•		•	•	•				
Input	0.8–1.0		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juventus 90 š.k.	0.7–1.0		•			•	•	•	•					
Kapalo s.e.	1.0–2.0		•			•		•	•	•	•			
Leander	0.5		•			•			•					
Maredo 125 SC	0.5–1.0		•			•		•	•	•	•			
Menara 410 EC	0.4–0.5					•		•	•		•			
Mystic	1.0					•	•							
Opera N	1.0–2.0		•			•	•							
Opus EC	0.75–1.5		•			•	•	•	•	•	•			
Opus s.k.	0.5–1.0					•	•							
Osiris	1.5–3.0					•		•	•	•	•			
Prosaro	0.75–1.0		•			•	•	•	•	•	•	•		
Riza 250 e.ū.	1.0	•	•			•	•	•	•	•	•			
Tango Flex	0.75–1.5		•			•		•	•	•				
Tilts 250 e.k.	0.5	•	•		•					•				
Vista 228 s.e.	1.5		•			•		•	•	•				
Viverda OD	1.25–2.5					•		•	•	•	•			•
Zamirs 400 e.ū.	1.2–1.5		•			•		•	•					
Zantara	0.9–1.2		•			•	•	•	•	•	•			

AUZAS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms								
		Auzu lapu baltplankumainība <i>Ascochyta avenae</i>	Melnais sodrējums <i>Cladosporium herbarum</i>	Auzu brūnplankumainība <i>Drechslera avenae</i>	Graudzāļu milt rasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Auzu vainagrūsa <i>Puccinia coronata</i>	Graudzāļu stiebru rūsa <i>Puccinia graminis</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Auzu pelēkplankumainība <i>Stagonospora avenae</i>
Adexar	2.0				•		•			
Akanto 250 s.k.	0.25–1.0			•	•		•			
Akanto Prīma š.g.	0.75–1.5			•	•					
Allegro Super s.e.	0.5–1.0				•		•			
Barclay Bolt XL	0.5		•		•					
Bell	0.75–1.0						•			•
Bell Super OD	1.25–2.5						•			•
Cerix	2.0–3.0				•		•			
Comet	1.0				•		•			
Comet Pro	1.25						•			
Duets Ultra s.k.	0.3–0.6				•		•			
Epox Top e.k.	1.5–2.5			•						
Fleksiti s.k.	0.5				•					
Folikūrs 250 e.ū.	1.0				•		•			•
Imbrex	2.0						•			
Juventus 90 š.k.	0.7			•	•		•			•
Kapalo s.e.	1.0–2.0				•		•			
Korbels e.k.	1.0						•			
Maredo 125 SC	0.5–1.0			•			•			
Opera N	0.75–2.0				•		•			
Opus EC	0.75–1.5						•			
Opus s.k.	0.5–1.0						•			
Orius 250 e.ū.	0.5–1.0				•		•			•
Prosaro	0.75–1.0				•		•			•
Riza 250 e.ū.	1.0				•					•
Tango Flex	0.75–1.5				•		•			
Tango Super s.e.	1.5				•		•			
Tilts 250 e.k.	0.5	•	•		•		•	•		
Viverda OD	1.25–2.5						•			•

APSTRĀDĀJAMO KULTŪRAUGU UN CITU OBJEKTU RĀDĪTĀJS

Kultūra	Augu aizsardzības līdzeklis	Liet. kat.	Lpp.
1	2	3	4
Āboliņš	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	MCPA 750	H	174
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	U 46 M š.k.	H	199
Āboliņš, baltais	2,4-D Nufarm š.k.	H	136
	Butoksons š.k.	H	150
	DMA 6 2,4-D Retro š.k.	H	153
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Stomps e.k.	H	193
Āboliņš, sarkanais	Butoksons š.k.	H	150
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Stomps e.k.	H	193
Āboliņš, sēklai	AlfaStop 50 EC	I	202
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Diqua	D	42
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Apiņi	Čempions 50 p.s.	F	76
Augļu dārzi	Amega š.k.	H	139
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Dalgis š.k.	H	152
	Dominators š.k.	H	153
	Dzelzs vitriols k.v.	F/L/ M	81
	EkoFits d.š.	I	237
	EkoFits e.k.	I	237
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Jablo š.k.	H	168
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Taifūns B š.k.	H	195
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
	Vara vitriols k.v.	F	132
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Augļu koku stādaudzētavas	Ažils 100 e.k.	H	141
	Čempions 50 p.s.	F	76
Ābeles	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137

Kultūra	Augu aizsardzības līdzeklis	Liet. kat.	Lpp.
1	2	3	4
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Chorus 50 WG	F	74
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fungurāns OH 300 s.k.	F	92
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kandits d.g.	F	100
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Nimazals e.k.	I/A	224
	Penncozeb 80 WP	F	114
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Skors 250 e.k.	F	122
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
	Topāzs 100 e.k.	F	131
	Trihogramma	Dz.	235
	Vara vitriols k.v.	F	132
Aprikozes	Čempions 50 p.s.	F	76
Bumbieres	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Chorus 50 WG	F	74
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fungurāns OH 300 s.k.	F	92
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Kandits d.g.	F	100
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Skors 250 e.k.	F	122
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
	Vara vitriols k.v.	F	132
Ķirši	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Chorus 50 WG	F	74
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Signum d.g.	F	121
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
	Topāzs 100 e.k.	F	131
Lazdas	Čempions 50 p.s.	F	76
Plūmes	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Chorus 50 WG	F	74
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Signum d.g.	F	121
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Biešu sēklinieki	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Bietes, lopbarības	AlfaStop 50 EC	I	202
	Betanal	H	148
	Betanal Expert	H	149
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207

1	2	3	4
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Fastac 50	I	211
	Fiesta T	H	155
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Goltiks 70 p.s.	H	164
	Goltiks 700 s.k.	H	164
	Hoder 720 SG	H	166
	Kestac 50	I	220
	Lontrel 72 SG	H	173
	Nortrons 50 s.k.	H	178
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Targa Super	H	196
	Tiovits 80 d.g.	F	130, 227
Celmi	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Dalgis š.k.	H	152
	Dominators š.k.	H	153
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glyphomax 480	H	162
	Jablo š.k.	H	168
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Rotstops p.s.	Mb	232
	Rotstop SC	Mb	232
	Roundup FL 540	H	190
Cukurbietes	AlfaStop 50 EC	I	202
	Artea 330 e.k.	F	65
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bampers Super e.k.	F	67
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Betanal	H	148
	Betanal Expert	H	149
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Fastac 50	I	211
	Fiesta T	H	155
	Fury 100 EW	I	214
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Impakts 25 s.k.	F	95
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Goltiks 70 p.s.	H	164
	Goltiks 700 s.k.	H	164
	Hoder 720 SG	H	166
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Lontrel 72 SG	H	173
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Maredo 125 SC	F	103
	Nortrons 50 s.k.	H	178
	Opus s.k.	F	109

1	2	3	4
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Proteus OD	I	226
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Targa Super	H	196
	Tiovits 80 d.g.	F	130, 227
Dārzeni	Ausma š.k.	AAS	37
	Fitoekols IF	I	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	I	89, 213
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Dārzeni, segtās platībās	Afidends	Dz.	233
	Enstrips	Dz.	233
	Entomits	Dz.	234
	Minekss	Dz.	234
	Mirikals	Dz.	234
	Spidekss	Dz.	235
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
	Tripekss (Tripekss Pluss)	Dz.	236
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Dārzeni, sakņu	AlfaStop 50 EC	I	202
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
Bietes, galda	Betanal	H	148
	Betanal Expert	H	149
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Goltiks 70 p.s.	H	164
	Goltiks 700 s.k.	H	164
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Maredo 125 SC	F	103
	Nortrons 50 s.k.	H	178
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
Brokoļi	Activus 330 EC	H	137
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Decis Mega	I	209, 210
	Dithane NT	F	78
	Infinito	F	95, 96
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Lentagrāns 45 p.s.	H	171
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Rovral Aqua Flo	K	52, 121
Burkāni	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Dithane NT	F	78
	Fastac 50	I	211
	Fenix	H	155
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Mistrāls 70 d.g.	H	176
	Nuflon	H	180
	Rovral Aqua Flo	F	52, 121
	Signum d.g.	F	121
	Stomps e.k.	H	193

1	2	3	4
Burkānu sēklinieki	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Dilles sēklai	AlfaStop 50 EC	I	202
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
Gurķi atklātā laukā	AlfaStop 50 EC	I	202
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Fastac 50	I	211
	Fitoekols IF	F/I	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	F/I	89, 213
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Infinito	F	95, 96
	Kestac 50	I	220
	Nimazals e.k.	I/A	224
	Sērs p.	F/A	238
	Skuju pulveris SM 87	R	230
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
Gurķi segtās platībās	Afidiuss	Dz.	233
	Actara 25 WG	I	200, 201
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ambliseiuss	Dz.	233
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Enkarsija	Dz.	233
	Fastac 50	I	211
	Fitoekols IF	F/I	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	F/I	89, 213
	Fitosējuluss	Dz.	234
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Infinito	F	95, 96
	Kestac 50	I	220
	Nimazals e.k.	I/A	224
	Pangodiņš	Dz.	235
	Revus 250 s.k.	F	117
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
	Sērs p.	F/A	238
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
	Topāzs 100 e.k.	F	131
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Kabači	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
Kāļi	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
Kāposti	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Butisan 400	H	150
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	EkoFits d.š.	I	237
	EkoFits e.k.	I	237

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Fastac 50	I	211
	Fury 100 EW	I	214
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Signum d.g.	F	121
	Skuju pulveris SM 87	R	230
	Trihogramma	Dz.	235
Kāpostī, Briseles	Activus 330 EC	H	137
	Infinito	F	95, 96
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Lentagrāns 45 p.s.	H	171
	Rovral Aqua Flo	F/K	52, 121
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
Kāpostī, galviņu	Activus 330 EC	H	137
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Butisan 400	H	150
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Decis Mega	I	209, 210
	Infinito	F	95, 96
	Hoder 720 SG	H	166
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Lentagrāns 45 p.s.	H	171
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Lontrel 72 SG	H	173
	Rovral Aqua Flo	K	52, 121
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
Kāpostī, Ķīnas	Amistārs 250 s.k.	F	60
Kāpostī, Pekīnas	Amistārs 250 s.k.	F	60
Krustziežu dzimtas dārzeņi	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Trihogramma	Dz.	235
Ķīploki	Acrobat Plus	F	54
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Dithane NT	F	78
	Fastac 50	I	211
	Fenix	H	155
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Stomps e.k.	H	193
Ķīrbji	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
Pastinaki	Activus 330 EC	H	137
	Fenix	H	155
Pētersīļi	Afidiuss	Dz.	233
	Fastac 50	I	211
	Kestac 50	I	220
Pētersīļi, sakņu	AlfaStop 50 EC	I	202
	Fenix	H	155
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Nuflon	H	180
	Stomps e.k.	H	193
Pipari segtās platībās	Afidiuss	Dz.	233
	Ambliseiuss	Dz.	233
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Pangodiņš	Dz.	235
	Previkurs E 840 š.k.	F	114
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Pupas	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148

1	2	3	4
	Butoksons š.k.	H	150
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Dithane NT	F	78
	Fastac 50	I	211
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Pantēra 4 e.k.	H	181
Pupas, lauka	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Fenix	H	155
	Lingo ZC	H	172
	Nuflon	H	180
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
Pupas (lopbarībai)	Diqua	D	42
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Pupiņas	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
Puravi	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Dithane NT	F	78
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Infinito	F	95, 96
	Kestac 50	I	220
	Lentagrāns 45 p.s.	H	171
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Stomps e.k.	H	193
Rāceņi	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
Redīsi	Skuju pulveris SM 87	R	230
Rutki	Skuju pulveris SM 87	R	230
Salāti	Afidiuss	Dz.	233
Selerijas	Afidiuss	Dz.	233
	Amistārs 250 s.k.	F	60
Sinepes	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188
Sīpoli	Acrobat Plus	F	54
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Dithane NT	F	78

1	2	3	4
	Fastac 50	I	211
	Fenix	H	155
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Infinito	F	95, 96
	Kestac 50	I	220
	Lentagrāns 45 p.s.	H	171
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Signum d.g.	F	121
	Skuju pulveris SM 87	R	230
	Stomps e.k.	H	193
Spargēļi	Raundaps Maks d.g.	H	186
Tomāti atklātā laukā	AlfaStop 50 EC	I	202
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Fastac 50	I	211
	Fitoekols IF	F/I	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	F/I	89, 213
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Nīmazals e.k.	I/A	224
	Previkurs E 840 š.k.	F	114
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
Tomāti segtās platībās	Afidius	Dz.	233
	Actara 25 WG	I	200, 201
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ambliseiuss	Dz.	233
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Enkarsija	Dz.	233
	Fastac 50	I	211
	Fitoekols IF	F/I	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	F/I	89, 213
	Fitosējuluss	Dz.	234
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Nīmazals e.k.	I/A	224
	Pangodiņš	Dz.	235
	Previkurs E 840 š.k.	F	114
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Revus 250 s.k.	F	117
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Spidekss	Dz.	235
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Turnepši	Decis 2.5 e.k.	I	208
Ziedkāposti	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Butisan 400	H	150
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Decis Mega	I	209, 210
	Dithane NT	F	78
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215

1	2	3	4
	Infinito	F	95, 96
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Lentagrāns 45 p.s.	H	171
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Rovral Aqua Flo	K	52, 121
Dekoratīvās kultūras	Ferramol	Lim	228
	Polytanol	Ro	231
	Sluxx	Lim	229
Dekoratīvās kultūras (podos)	Actara 25 WG	I	200, 201
Dzelzceļi	Banvels 4S š.k.	H	142
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Nozomi p.s.	H	179
Galega	Butoksons š.k.	H	150
Ganības	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Ariane S	H	140
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Estets 600 e.k.	H	154
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	Starane 180 e.k.	H	192
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	U 46 M š.k.	H	199
Ganības (zelmenī stiebrzāles)	GAT Stake 20 EC	H	158
	Starane XL s.e.	H	193
Graudaugi	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Auzas	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	Accurate 200 WG	H	136
	Adexar	F	55
	Akanto 250 s.k.	F	56
	Akanto Prima š.g.	F	57
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Amega š.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Barclay Bolt XL	F	68
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	CCC	AR	37
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Chwastox 750 SL	H	151
	Cikocels 750 š.k.	AR	38
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Comet Pro	F	76
	Dalgis š.k.	H	152
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Diqua	D	42
	Dividends Stārs 036 s.k.	K	47

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Dominators š.k.	H	153
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Epox Top e.k.	F	85
	Estets 600 e.k.	I	154
	Fastac 50	I	211
	Fury 100 EW	I	214
	Fleksiti s.k.	F	90
	Folikūrs 250 e.ū.	F	38, 90
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Glifoss Suprim š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Trinex 250 EC	AR	39
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grodils 75 d.g.	H	165
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Jablo š.k.	H	168
	Juventus 90 š.k.	F	39, 99
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219
	Kemikars T s.k.	K	48
	Kestac 50	I	220
	Kinto s.k.	F	48
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	Korbels e.k.	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Mesurool	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Moddus 250 EC	AR	40
	Mustangs s.e.	H	177
	Mustangs Forte s.e.	H	177
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Premis 25 s.k.	K	51
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Prosaro	F	115
	R-20	H	182
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Raundaps Maks d.g.	H	186

1	2	3	4
	Reindžers š.k.	H	187
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Stabilāns 750 š.k.	AR	40
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Taifūns B š.k.	H	195
	Tango Flex	F	125
	Tango Super s.e.	F	126
	Tilts 250 e.k.	F	128
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
	Vincits s.k.	K	52
	Vitavakss 200 FF s.k.	K	52
	Viverda OD	F	133
Auzas lopbarībai	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Auzas ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	174
Auzas ar sarkanās auzenes vai ganību aīrenes pasēju	Trimmers 50 š.g.	H	198
Auzas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Tomigans 180 e.k.	H	197
Kvieši	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Vitavakss 200 FF s.k.	K	52
Kvieši, cietie	Rosate 36 š.k.	H	188
Kvieši, vasaras	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	Accurate 200 WG	H	136
	Actara 25 WG	I	200, 201
	Adexar	F	55
	Akanto Prima š.g.	F	57
	Akanto 250 s.k.	F	56
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Amega š.k.	H	139
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs Ekstra s.k.	F	62
	Amistārs Opti 480 s.k.	F	63
	Archer Turbo 575 EC	F	64
	Arelons flussig s.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140

1	2	3	4
	Artea 330 e.k.	F	65
	Attribut	H	140
	Axial One 50 EC	H	141
	Bampers 25 e.k.	F	66
	Bampers Super e.k.	F	67
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barclay Bolt XL	F	68
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	CCC	AR	37
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Cerone	AR	37
	Chwastox 750 SL	H	151
	Cikocels 750 š.k.	AR	38
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Comet Pro	F	76
	Čambels s.k.	K	47
	Dalgis š.k.	H	152
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Dicoherb Super 750 SL	H	152
	Dividends Stārs 036 s.k.	K	47
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Dominators š.k.	H	153
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Epox Extra	F	84
	Epox Top e.k.	F	85
	Ergon	H	154
	Estets 600 e.k.	H	154
	Fandango	F	87
	Fastac 50	I	211
	Falcon Forte	F	86
	Falkons 460 e.k.	F	86
	Fury 100 EW	I	214
	Fleksiti s.k.	F	90
	Folikūrs 250 e.ū.	F	90
	Foxtrot 69 EW	H	157
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Propiconazol 250 EC	F	93
	Golden Trinex 250 EC	AR	39
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grasps 400 s.k.	H	165
	Grodils 75 d.g.	H	165
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Impakts s.k.	F	94
	Impakts 25 s.k.	F	95
	Input	F	97
	Jablo š.k.	H	168
	Juventus 90 š.k.	F	39, 99
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219

1	2	3	4
	Kemikars T s.k.	K	48
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kestac 50	I	220
	Kinto s.k.	F	48
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	Korbels e.k.	F	102
	Lamardor	K	49
	Leander	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Maksims 025 s.k.	K	49
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maksims Stārs 025 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Menara 410 EC	F	105
	Mesurool	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Mirāža 45 e.k.	F	105
	Moddus 250 EC	AR	40
	Monitors d.g.	H	177
	Mustangs s.e.	H	177
	Mustangs Forte s.e.	H	177
	Mystic	F	106
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Optika Trio š.k.	H	180
	Optimus	AR	40
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Osiris	F	112
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Premis 25 s.k.	K	51
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Protugan Super	H	182
	Prosaro	F	115
	Puma Universal	H	182
	R-20	H	182
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Sekators 375 OD s.k.	H	192
	Silgards 20 s.k.	K	238
	Sportak EW	F	123
	Stabilāns 750 š.k.	AR	40
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Swing Gold	F	124
	Taifūns B š.k.	H	195
	Tango Flex	F	125
	Tango Super s.e.	F	126
	Taspa 500 EC	F	127
	Tilts 250 e.k.	F	128

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Tombo d.g.	H	197
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimaxx	AR	41
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
	Vincits s.k.	K	52
	Vista 228 s.e.	F	132
	Viverda OD	F	133
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
	Zantara	F	135
Kvieši, vasaras ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	174
	Stomps e.k.	H	193
Kvieši, vasaras ar lucernas pasēju	Stomps e.k.	H	193
Kvieši, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju	Trimmers 50 š.g.	H	198
Kvieši, vasaras ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Tomigans 180 e.k.	H	197
Kvieši, ziemas	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	Accurate 200 WG	H	136
	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137
	Adexar	F	55
	Akanto Prima š.g.	F	57
	Akanto 250 s.k.	F	56
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Alister Grande OD	H	138
	Amega š.k.	H	139
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs ekstra s.k.	F	62
	Amistārs Opti 480 s.k.	F	63
	Archer Turbo 575 EC	F	64
	Arelons flussig s.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140
	Artea 330 e.k.	F	65
	Attribut	H	140
	Axial One 50 EC	H	141
	Barclay Bolt XL	F	68
	Baytan Universal	K	45
	Bampers 25 e.k.	F	66
	Bampers Super e.k.	F	67
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Bariton Ultra	K	45
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Caliban Duo	H	151
	CCC	AR	37
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Cerone	AR	37
	Chwastox 750 SL	H	151
	Cikocels 750 š.k.	AR	38

1	2	3	4
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Comet Pro	F	76
	Čambels s.k.	K	47
	Dalgis š.k.	H	152
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Dicoherb Super 750 SL	H	152
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Dominators š.k.	H	153
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Hussar Activ OD	H	167
	Epox Extra	F	84
	Epox Top e.k.	F	85
	Ergon	H	154
	Estets 600 e.k.	H	154
	Falcon Forte	F	86
	Falkons 460 e.k.	F	86
	Fandango	F	87
	Fastac 50	I	211
	Fury 100 EW	I	214
	Flaits s.k.	H	156
	Fleksiti s.k.	F	90
	Folikūrs 250 e.ū.	F	38, 90
	Foxtrot 69 EW	H	157
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Ethepon 480 SL	AR	38
	Golden Propiconazol 250 EC	F	93
	Golden Trinex 250 EC	AR	39
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grasps 400 s.k.	H	165
	Grodils 75 d.g.	H	165
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Impakts 25 s.k.	F	95
	Impakts s.k.	F	94
	Input	F	97
	Jablo š.k.	H	168
	Juventus 90 š.k.	F	39, 99
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219
	Kemikars T s.k.	K	48
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kestac 50	I	220
	Kinto s.k.	F	48
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	Komplet	H	171
	Korbels e.k.	F	102
	Leander	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Legacy Pro	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Maksims 025 s.k.	K	49

1	2	3	4
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maksims Stārs 025 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Medax Top	AR	39
	Menara 410 EC	F	105
	Mesurool	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Mirāža 45 e.k.	F	105
	Moddus 250 EC	AR	40
	Monitors d.g.	H	177
	Mustangs s.e.	H	177
	Mustangs Forte s.e.	H	177
	Mystic	F	106
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Optika Trio š.k.	H	180
	Optimus	AR	40
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Osiris	F	112
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Premis 25 s.k.	K	51
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Protugan Super	H	182
	Prosaro	F	115
	Puma Universal	H	182
	R-20	H	182
	Raksils Ekstra 515 š.k.	K	51
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Sekators 375 OD s.k.	F	192
	Silgards 20 s.k.	K	238
	Sportak EW	F	123
	Stabilāns 750 š.k.	AR	40
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Stomps e.k.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Swing Gold	F	124
	Taifūns B š.k.	H	195
	Tango Flex	F	125
	Tango Super s.e.	F	126
	Taspa 500 EC	F	127
	Terpāls š.k.	AR	41
	Tilts 250 e.k.	F	128
	Tombo d.g.	H	197
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimaxx	AR	41
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
	Vincits s.k.	K	52
	Vista 228 s.e.	F	132
	Viverda OD	F	133
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
	Zantara	F	135

1	2	3	4
Kvieši, ziemas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
	Starane XL s.e.	H	193
Mieži	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	CCC	AR	37
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Diqua	D	42
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Kemikars T s.k.	K	48
	Maksims 025 s.k.	K	49
	Maksims Stārs 025 s.k.	K	50
	Premis 25 s.k.	K	51
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188.
	Stabilāns 750 š.k.	AR	40
	Tango Super s.e.	F	126
	Terpāls š.k.	AR	41
	Vincits s.k.	K	52
Mieži lopbarībai	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Mieži, vasaras	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	Accurate 200 WG	H	136
	Activus 330 EC	H	137
	Adexar	F	55
	Akanto 250 s.k.	F	56
	Akanto Prima š.g.	F	57
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Amega š.k.	H	139
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs ekstra s.k.	F	62
	Amistārs Opti 480 s.k.	F	63
	Archer Turbo 575 EC	F	64
	Arelons flussig s.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140
	Artea 330 e.k.	F	65
	Axial One 50 EC	H	141
	Bampers 25 e.k.	F	66
	Barclay Bolt XL	F	68
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Cerone	AR	37
	Chwastox 750 SL	H	151
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Comet Pro	F	76
	Čambels s.k.	K	47
	Dalgis š.k.	H	152
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Dicoherb Super 750 SL	H	152

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Dividends Stārs 036 s.k.	K	47
	Dominators š.k.	H	153
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Epox Extra	F	84
	Epox Tõp e.k.	F	85
	Ergon	H	154
	Estets 600 e.k.	H	154
	Falcon Forte	F	86
	Falkons 460 e.k.	F	86
	Fandango	F	87
	Fastac 50	I	211
	Fury 100 EW	I	214
	Fleksiti s.k.	F	90
	Folikūrs 250 e.ū.	F	38, 90
	Foxtrot 69 EW	H	157
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Ethepon 480 SL	AR	38
	Golden Propiconazol 250 EC	F	93
	Golden Trinex 250 EC	AR	39
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grasps 400 s.k.	H	165
	Grodils 75 d.g.	H	165
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Impakts s.k.	F	94
	Impakts 25 s.k.	F	95
	Input	F	97
	Jablo š.k.	H	168
	Juventus 90 š.k.	F	39, 99
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kestac 50	I	220
	Kinto s.k.	F	48
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	Korbels e.k.	F	102
	Lamardor	K	49
	Leander	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Menara 410 EC	F	105
	Mesuroil	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Mirāža 45 e.k.	F	105
	Moddus 250 EC	AR	40
	Mustangs s.e.	H	177
	Mustangs Forte s.e.	H	177
	Mystic	F	106
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Optika Trio š.k.	H	180

1	2	3	4
	Optimus	AR	40
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Osiris	F	112
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Protugan Super	H	182
	Prosaro	F	115
	Puma Universal	H	182
	R-20	H	182
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Sekators 375 OD s.k.	H	192
	Silgards 20 s.k.	K	238
	Sportak EW	F	123
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Taifūns B š.k.	H	195
	Tango Flex	F	125
	Tilts 250 e.k.	F	128
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimaxx	AR	41
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
	Vista 228 s.e.	F	132
	Viverda OD	F	133
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
	Zantara	F	135
Mieži, vasaras ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	174
	Stomps e.k.	H	193
Mieži, vasaras ar lucernas pasēju	Stomps e.k.	H	193
Mieži, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību aīrenes pasēju	Trimmers 50 š.g.	H	198
Mieži, vasaras ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Tomigans 180 e.k.	H	197
Mieži, vasaras un zirņu mīstrs	Activus 330 EC	H	137
Mieži, ziemas	Accurate 200 WG	H	136
	Activus 330 EC	H	137
	Adexar	F	55
	Akanto 250 s.k.	F	56
	Akanto Prīma š.g.	F	57
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Amega š.k.	H	139
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs Opti 480 s.k.	F	63

1	2	3	4
	Archer Turbo 575 EC	F	64
	Arelons flussig s.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140
	Artea 330 e.k.	F	65
	Axial One 50 EC	H	141
	Barclay Bolt XL	F	68
	Baytan Universal	K	45
	Bampers 25 e.k.	F	66
	Bampers Super e.k.	F	67
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Buldoks 025 e.k.	I	205
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Cerone	AR	37
	Chwastox 750 SL	H	151
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Comet Pro	F	76
	Čambels š.k.	K	47
	Dalgis š.k.	H	152
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Dividends Stārs 036 s.k.	K	47
	Dominators š.k.	H	153
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Epox Extra	F	84
	Epox Top e.k.	F	85
	Falcon Forte	F	86
	Falkons 460 e.k.	F	86
	Fandango	F	87
	Fastac 50	I	211
	Fury 100 EW	I	214
	Flaits s.k.	H	156
	Fleksiti s.k.	F	90
	Flight Forte	H	156
	Folikūrs 250 e.ū.	F	90
	Foxtrot 69 EW	H	157
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Ethefon 480 SL	AR	38
	Golden Propiconazol 250 EC	F	93
	Golden Trinex 250 EC	AR	39
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grasps 400 s.k.	H	165
	Grodils 75 d.g.	H	165
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Impakts s.k.	F	94
	Impakts 25 s.k.	F	95
	Input	F	97
	Jablo š.k.	H	168
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kestac 50	I	220

1	2	3	4
	Kinto s.k.	F	48
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	Komplet	H	171
	Korbels e.k.	F	102
	Leander	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Legacy Pro	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Medax Top	AR	39
	Menara 410 EC	F	105
	Mesurool	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Mirāža 45 e.k.	F	105
	Moddus 250 EC	AR	40
	Mustangs s.e.	H	177
	Mystic	F	106
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Optimus	AR	40
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Osiris	F	112
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Prosaro	F	115
	R-20	H	182
	Raksils Ekstra 515 š.k.	K	51
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Roundup ACE	H	190
	Sekators 375 OD s.k.	H	192
	Sportak EW	F	123
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Stomps e.k.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Taifūns B š.k.	H	195
	Tango Flex	F	125
	Tilts 250 e.k.	F	128
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimaxx	AR	41
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
	Vista 228 s.e.	F	132
	Viverda OD	F	133
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
	Zantara	F	135
Mieži, ziemas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
	Starane XL s.e.	H	193

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
Rudzi	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137
	Adexar	F	55
	Akanto 250 s.k.	F	56
	Akanto Prima š.g.	F	57
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Alister Grande OD	H	138
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs Opti 480 s.k.	F	63
	Archer Turbo 575 EC	F	64
	Arelons flussig s.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140
	Attribut	H	140
	Axial One 50 EC	H	141
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barclay Bolt XL	F	68
	Baytan Universal	K	45
	Bampers 25 e.k.	F	66
	Bampers Super e.k.	F	67
	Bariton Ultra	K	45
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Buldoks 025 e.k.	I	205
	Caliban Duo	H	151
	CCC	AR	37
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Cerone	AR	37
	Chwastox 750 SL	H	151
	Cikocels 750 š.k.	AR	38
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Dicoherb Super 750 SL	H	152
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Hussar Activ OD	H	167
	Epox Top e.k.	F	85
	Estets 600 e.k.	H	154
	Fandango	F	87
	Fastac 50	I	211
	Falcon Forte	F	86
	Falkons 460 e.k.	F	86
	Fury 100 EW	I	214
	Flaits s.k.	H	156
	Fleksiti s.k.	F	90
	Flight Forte	H	156
	Folikūrs 250 e.ū.	F	38, 90
	Foxtrot 69 EW	H	157
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Ethefon 480 SL	AR	38
	Golden Propiconazol 250 EC	F	93
	Golden Trinex 250 EC	AR	39
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grasps 400 s.k.	H	165
	Grodils 75 d.g.	H	165

1	2	3	4
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Input	F	97
	Juventus 90 š.k.	F	39, 99
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Kinto s.k.	F	48
	Komplet	H	171
	Korbels e.k.	F	102
	Leander	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	Maksims 025 s.k.	K	49
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Medax Top	AR	39
	Menara 410 EC	F	105
	Mesurool	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Mirāža 45 e.k.	F	105
	Moddus 250 EC	AR	40
	Mustangs s.e.	H	177
	Mustangs Forte s.e.	H	177
	Mystic	F	106
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Osiris	F	112
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Premis 25 s.k.	K	51
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Prosaro	F	115
	Puma Universal	H	182
	R-20	H	182
	Raksils Ekstra 515 š.k.	K	51
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Sekators 375 OD s.k.	H	192
	Silgards 20 s.k.	K	238
	Stabilāns 750 š.k.	AR	40
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Stomps e.k.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Tango Flex	F	125
	Tango Super s.e.	F	126
	Terpāls š.k.	AR	41
	Tilts 250 e.k.	F	128
	Tombo d.g.	H	197
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Vincits s.k.	K	52
	Vista 228 s.e.	F	132
	Viverda OD	F	133

1	2	3	4
Rudzi ar stiebrzāļu pasēju	Zamirs 400 e.ū.	F	134
	Zantara	F	135
	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
Tritikāle	Starane XL s.e.	H	193
	Accurate 200 WG	H	136
	Actara 25 WG	I	200, 201
	Activus 330 EC	H	137
	Adexar	F	55
	Akanto 250 s.k.	F	56
	Akanto Prima š.g.	F	57
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Allegro Super s.e.	F	58
	Alistar Grande OD	H	138
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs ekstra s.k.	F	62
	Amistārs Opti 480 s.k.	F	63
	Archer Turbo 575 EC	F	64
	Arelons flussig s.k.	H	139
	Ariane S	H	140
	Arrats d.g.	H	140
	Attribut	H	140
	Axial One 50 EC	H	141
	Barclay Bolt XL	F	68
	Baytan Universal	K	45
	Bariton Ultra	K	45
	Bell	F	69
	Bell Super OD	F	70
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Caliban Duo	H	151
	CCC	AR	37
	Celest Trio 060 FS	K	46
	Cerix	F	73
	Cerone	AR	37
	Chwastox 750 SL	H	151
	Cikocels 750 š.k.	AR	38
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Comet	F	75
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis Mega	I	209, 210
	Duets Ultra s.k.	F	80
	Hussar Activ OD	H	167
	Epox Extra	F	84
	Epox Top e.k.	F	85
	Estets 600 e.k.	H	154
	Falcon Forte	F	86
	Falkons 460 e.k.	F	86
	Fandango	F	87
	Fastac 50	I	211
	Fury 100 EW	I	214
	Flaits s.k.	H	156
	Fleksiti s.k.	F	90
	Flight Forte	H	156
	Folikūrs 250 e.ū.	F	38, 90
	Foxtrot 69 EW	H	157
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Golden Ethe fon 480 SL	AR	38
	Golden Trinex 250 EC	AR	39

1	2	3	4
	Granstars Prēmija 50 š.g.	H	164
	Grasps 400 s.k.	H	165
	Grodils 75 d.g.	H	165
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Imbrex	F	93
	Input	F	97
	Juventus 90 š.k.	F	39, 99
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalibre 50 š.g.	H	168
	Kapalo s.e.	F	101
	Kestac 50	I	220
	Kinto s.k.	F	48
	Komplet	H	171
	Leander	F	102
	Legacy 500 SC	H	171
	Legacy Pro	H	171
	Lintūrs 70 d.g.	H	172
	Logrāns 20 d.g.	H	172
	Lontrel 72 SG	H	173
	Maksims ekstra 50 s.k.	K	50
	Maredo 125 SC	F	103
	Medax Top	AR	39
	Menara 410 EC	F	105
	Mesuroi	Lim	228
	Mezzo d.g.	H	176
	Moddus 250 EC	AR	40
	Monitors d.g.	H	177
	Mustangs s.e.	H	177
	Mustangs Forte s.e.	H	177
	Mystic	F	106
	Nuance 75 WG	H	179
	Opera N	F	108
	Opus EC	F	109
	Opus s.k.	F	109
	Osiris	F	112
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Premis 25 s.k.	K	51
	Primus XL	H	181
	Primuss s.k.	H	181
	Proteus OD	I	226
	Prosaro	F	115
	Puma Universal	H	182
	R-20	H	182
	Raksils Ekstra 515 š.k.	K	51
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Sekators 375 OD s.k.	H	192
	Stabilāns 750 š.k.	AR	40
	Starane 180 e.k.	H	192
	Starane XL s.e.	H	193
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Tango Flex	F	125
	Tilts 250 e.k.	F	128
	Tombo d.g.	H	197
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	Trimmers 50 š.g.	H	198
	Tooler	H	198
	Vista 228 s.e.	F	132
	Viverda OD	F	133
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
	Zantara	F	135
Tritikāle ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
	Primus XL	H	181
	Starane XL s.e.	H	193

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
Vasarāju graudaugi	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	Duplozāns Super š.k.	H	154
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	U 46 M š.k.	H	199
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	U 46 M š.k.	H	199
Vasarāju graudaugi ar lucernas pasēju	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
Vasarāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Duplozāns Super š.k.	H	154
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
Ziemāju graudaugi	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	Duplozāns Super š.k.	H	154
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	U 46 M š.k.	H	199
Ziemāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
Ziemāju graudaugi ar lucernas pasēju	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
Ziemāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
Graudi	Actellic 50 EC	I/A	202
	Fostoksīns tb.	I/A	214
	K-Obiol	I	222
	Magtoksīns tb.	I/A	224
Griķi	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
Kāpostu sēklinieki	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Kāposti, lopbarības	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Butisan 400	H	150
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Trihogramma	Dz.	235
Kartupeļi	Activus 330 EC	H	137
	Acrobat Plus	F	54
	Actara 25 WG	I	200, 201
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Altima 500 s.k.	F	59
	Alverde	I	205
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Bulldoks 025 e.k.	I	205
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Cruiser OSR	K	46
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Diqua	D	42
	Dithane NT	F	78
	EkoFits d.š.	I	237
	EkoFits e.k.	I	237
	Elektis 75 d.g.	F	83
	Fastac 50	I	211
	Fenix	H	155
	Fury 100 EW	I	214

1	2	3	4
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Fungurāns OH 300 s.k.	F	92
	Gloria	F	92
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Infinito	F	95, 96
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalif 360 CS	H	168
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Leimay SC	F	103
	Lingo ZC	H	172
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Litagra Glorija 450 s.k.	F	103
	Maksims 025 s.k.	K	49
	Metric ZC	H	175
	Mistrāls 70 d.g.	H	176
	Nimazals e.k.	I/A	224
	Nuflon	H	180
	Orvego	F	112
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Penncozeb 75 DG	F	113
	Penncozeb 80 WP	F	114
	Proteus OD	I	226
	Ranmans A s.k.	F	116
	Ranman Top	F	117
	Reglons Super š.k.	H	42, 187
	Revus 250 s.k.	F	117
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
	Rovral Aqua Flo	F/K	52, 121
	Signum d.g.	F	121
	Širlans 500 s.k.	F	124
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Titus 25 d.g.	H	197
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Kartupeļu sēklas lauki	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Kartupeļi pārstrādei	Gro-Stop HN k.k.f.	AR	39
Koksne (kokmateriāli)	AlfaStop 50 EC	I	202
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
Krāšņumaugi	Actara 25 WG	I	200, 201
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Ausma š.k.	AAS	37
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	EkoFits d.š.	I	237
	EkoFits e.k.	I	237
	Fastac 50	I	211
	Fitoekols IF	I	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	I	89, 213
	Kestac 50	I	220
	Nimazals e.k.	I/A	224
	Previkurs E 840 š.k.	F	114
	Sērs p.	F/A	238
	Timorekss d.š.	F	129
	Timorekss e.k.	F	129
	Timors e.k.	F	130
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227

1	2	3	4
	Vertimec 018 EC	I/A	227
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Krāšņumaugi (izņemot krizantēmas)	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
Krāšņumaugi atklātā laukā	Actara 25 WG	I	200, 201
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Decis Mega	I	209, 210
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Mesurool	Lim	228
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augstumam – sējumi un stādījumi)	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
Krāšņumaugi segtās platībās	Actara 25 WG	I	200, 201
	Afidends	Dz	233
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	Enstrips	Dz	233
	Entomits	Dz	234
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Match 50 EC	I	223
	Mesurool	Lim	228
	Minekss	Dz	234
	Mirikals	Dz	234
	Nīmazals e.k.	I/A	224
	Sērs p.	F/A	238
	Spidekss	Dz	235
	Tiovičs 80 d.g.	F/A	130, 227
	Tripekss (Tripekss pluss)	Dz	236
	Vertimec 018 EC	I/A	227
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Krāšņumaugu sīpoli un gumi	Ausma š.k.	AAS	37
	Fitoekols IF	F	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	F	89, 213
Acālijas	Čempions 50 p.s.	F	76
Arālijas	Čempions 50 p.s.	F	76
Asparāgi	Match 50 EC	I	223
Atrairnītes	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Balzamīnes	Vertimec 018 EC	I/A	227
Begonijas	Kandits d.g.	F	100
Ciklamēnas	Svičs 62.5 d.g.	F	123
Efejas	Čempions 50 p.s.	F	76
Fikusi	Match 50 EC	I	223
Filodendroni	Čempions 50 p.s.	F	76
Flokši	Topāzs 100 e.k.	F	131
Fuksijas	Svičs 62.5 d.g.	F	123
Gerberas	Actara 25 WG	I	200, 201
	Kandits d.g.	F	100
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Gladiolas	Čempions 50 p.s.	F	76
	Skuju pulveris SM 87	R	230
Gladiolas (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Ģērānijas (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78

1	2	3	4
Hiacintes (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Īrisi (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Jukas	Čempions 50 p.s.	F	76
Klinteres	Čempions 50 p.s.	F	76
Krizantēmas	Actara 25 WG	I	200, 201
	Fitoekols IF	I/F	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	I/F	89, 213
	Kandits d.g.	F	100
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Match 50 EC	I	223
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Topāzs 100 e.k.	F	131
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Krokusi (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Lefkojas	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
Lilijas	Čempions 50 p.s.	F	76
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Match 50 EC	I	223
Lilijas (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Magones (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Mežvītenī	Topāzs 100 e.k.	F	131
Mīķeliši	Topāzs 100 e.k.	F	131
Mīrtes	Match 50 EC	I	223
Narcises (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
	Stomps e.k.	H	193
Neļķes	Čempions 50 p.s.	F	76
	Fitoekols IF	I/F	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	I/F	89, 213
	Kandits d.g.	F	100
	Topāzs 100 e.k.	F	131
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Neļķes (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Pelargonijas	Svičs 62.5 d.g.	F	123
Pelargonijas (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Petūnijas	Karate Zeon 5 CS	I	218
Pirakantas	Čempions 50 p.s.	F	76
Prīmulas	Actara 25 WG	I	200, 201
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
Rozes	Actara 25 WG	I	200, 201
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Kandits d.g.	F	100
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	117, 118
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Topāzs 100 e.k.	F	131
	Vertimec 018 EC	I/A	227
Rozes (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Segliņi	Čempions 50 p.s.	F	76
Sīpolpuķes	Čempions 50 p.s.	F	76
	Danadims 40 e.k.	K	47, 207
Tulpes	Čempions 50 p.s.	F	76
	Stomps e.k.	H	193
Tulpes (atklātā laukā)	Dithane NT	F	78
Kukurūza	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Arrats d.g.	H	140
	Banvels 4S š.k.	H	142

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Estets 600 e.k.	H	154
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Harmonijs 50 š.g.	H	166
	Hoder 720 SG	H	166
	Kestac 50	I	220
	Lontrel 72 SG	H	173
	Maister OD	H	174
	Milagro 4 OD	H	176
	Milagro Extra 6 OD	H	176
	Nicogan	H	178
	Niklos 40 SC	H	178
	Opera N	F	108
	Proteus OD	I	226
	Titus 25 d.g.	H	197
Kukurūza (lopbarībai)	Activus 330 EC	H	137
	GAT Stake 20 EC	H	158
Kukurūza (skābbarībai)	Harmonijs 50 š.g.	H	166
Ķīmenes	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Fastac 50	I	211
	Fenix	H	155
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
Lauksaimniecības kultūras	Ferramol	Lim	228
	Polytanol	Ro	231
	Sluxx	Lim	229
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Amega š.k.	H	139
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Dalgis š.k.	H	152
	Dominators š.k.	H	153
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Jablo š.k.	H	168
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Roundup Garden	H	191
	Roundup Quick	H	191
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	Taifūns B š.k.	H	195
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
Lini	Agroksons 75 š.k.	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141

1	2	3	4
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Diqua	D	42
	Fastac 50	I	211
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glins 75 d.g.	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Hoder 720 SG	H	166
	Kemikars T s.k.	K	48
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kestac 50	I	220
	Lontrel 72 SG	H	173
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Taifūns B š.k.	H	195
	Vitavakss 200 FF s.k.	K	52
	U 46 M š.k.	H	199
Lini, eļļas	Accurate 200 WG	H	136
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Rosate 36 š.k.	H	188
Lucerna	AlfaStop 50 EC	I	202
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Stomps e.k.	H	193
Lucerna sēklai	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Karate Zeon 5 CS	I	218
Lupīna	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Kernels 480 š.k.	K	169
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Lupīna sēklai	Decis 2.5 e.k.	H	208
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
Meži	Decis 2.5 e.k.	I	208
Apses kokaudzētavās	Actara 25 WG	I	200, 201
Bērzi kokaudzētavās	Actara 25 WG	I	200, 201
Baltegles kokaudzētavās	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
Egles kokaudzētavās	Actara 25 WG	I	200, 201
	Fenix	H	155
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
Egles kokaudzētavās un jaunaudzēs	Dithane NT	F	78
Dekoratīvie kokaugi	Actara 25 WG	I	200, 201
Dekoratīvie kokaugi un krūmi	Dithane NT	F	78
Dekoratīvie krūmi kokaudzētavās	Svičs 62.5 d.g.	F	123
Kokaugi	Ausma š.k.	AAS	37
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
Koku jaunaudzēs pēc ierīkošanas mežā	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Rosate 36 š.k.	H	188

1	2	3	4
Koku retināšana mežā	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Bigrade 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Rosate 36 š.k.	H	188
Lapegles kokaudzētavās	Fenix	H	155
Lapu koki kokaudzētavās	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Lapu koku jaunaudzēs	Cervacol extra	R	230
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Plantskids š.p.	R	230
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Meža kultūru stādu audzētavas	Ažils 100 e.k.	H	141
Meža kultūru stādu audzētavas, pirms stādījumu ierīkošanas	Kernels 480 š.k.	H	169
Ozoli	Nimazals e.k.	I/A	224
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Bigrade 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Rosate 36 š.k.	H	188
Priedes kokaudzētavās	Actara 25 WG	I	200, 201
	Fenix	H	155
Priedes kokaudzētavās un jaunaudzēs	Dithane NT	F	78
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
Skuju koku jaunaudzēs	Amega š.k.	H	139
	Cervacol extra	R	230
	Dalgis š.k.	H	152
	Dominators š.k.	H	153
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Jablo š.k.	H	168
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	Plantskids š.p.	R	230
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Taifūns B š.k.	H	195
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
Skuju koku jaunie stādījumi	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glyphomax 480	H	162
	Kernels 480 š.k.	H	169
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Maks d.g.	H	186

1	2	3	4
Skuju koki kokaudzētavās	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Actellie 50 EC	I/A	202
Noliktavas	AlfaStop 50 EC	I	202
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Fastac 50	I	211
	Fostoksīns tb.	I/A	214
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	K-Obiol	I	222
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kestac 50	I	220
	Magtoksīns tb.	I/A	224
	Menno Florades š.k.	F/B /V	43
Noliktavas, kartupeļu	Karate Zeon 5 CS	I	218
Noliktavu apkārtne	Ažils 100 e.k.	H	141
	EkoFits d.š.	I	237
	EkoFits e.k.	I	237
	Fitoekols IF	I/F	89, 213
	Fitoekols IF 40 s.k.	I/F	89, 213
	Vara vitriols k.v.	F	132
	Zaļās ziepes e.k.	I	239
	Activus 330 EC	H	137
Ogulāji	AlfaStop 50 EC	I	202
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
Avenes	Skuju pulveris SM 87	R	230
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
Aveņu-kazeņu hibrīdi	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kestac 50	I	220
	Skuju pulveris SM 87	R	230
	Activus 330 EC	H	137
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Signum d.g.	F	121
	Activus 330 EC	H	137
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Čempions 50 p.s.	F	76
Dzērvenes	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Kandits d.g.	F	100
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
Ērkšķogas	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kandits d.g.	F	100
	Kestac 50	I	220
	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Basta	H	147
Jāņogas	Bordo maisījums	F	71, 72
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fastac 50	I	211
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Kandits d.g.	F	100
	Kestac 50	I	220

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
Kazeses	Activus 330 EC	H	137
	Čempions 50 p.s.	F	76
Krūmčidonijas	Basta	H	147
Krūmmellenes	Čempions 50 p.s.	F	76
	Signum d.g.	F	121
Upenes	Basta	H	147
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Čempions 50 p.s.	F	76
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Dithane NT	F	78
	Effector	F	82
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Kandits d.g.	F	100
	Sērs p.	F/A	238
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Vinogas	Čempions 50 p.s.	F	76
	Dithane NT	F	78
Zemenes	Activus 330 EC	H	137
	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Basta	H	147
	Betanal	H	148
	Bordo maisījums	F	71, 72
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	EkoFits d.š.	I	237
	EkoFits e.k.	I	237
	Fastac 50	I	211
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Fusilade Forte 150 EC	H	157
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Goltiks 70 p.s.	H	164
	Hoder 720 SG	H	166
	Kandits d.g.	F	100
	Kestac 50	I	220
	Lontrel 72 SG	H	173
	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Rovral Aqua Flo	F	52, 121
	Sērs p.	A	238
	Signum d.g.	F	121
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Tiovits 80 d.g.	F/A	130, 227
Zemenes segtās platībās	Svičs 62.5 d.g.	F	123
Pagrabi	Sērs p.	F/A	238
Papuves	Amega š.k.	H	139
	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Dalgis š.k.	H	152
	Dominators š.k.	H	153
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Jablo š.k.	H	168
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184

1	2	3	4
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Taifūns B š.k.	H	195
	Uragāns Sistem 4 š.k.	F	199
Pārtikas produkti (iesaiņoti)	Fostoksīns tb.	I/A	214
	Magtoksīns tb.	I/A	224
Pļavas	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Ariane S	H	140
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	Estets 600 e.k.	H	154
	Grodils 75 d.g.	H	165
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	Starane 180 e.k.	H	192
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	U 46 M š.k.	H	199
Rapsis	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amega š.k.	H	139
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Buldoks 025 e.k.	I	205
	Dalgis š.k.	H	152
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Diqua	D	42
	Dominators š.k.	H	153
	Fastac 50	I	211
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Jablo š.k.	H	168
	Kestac 50	I	220
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
Rapsis, vasaras	Akanto 250 s.k.	F	56
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs Ekstra s.k.	F	62
	Brasan 540 EC	H	149
	Butisan 400	H	150
	Butisan Star	H	150
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206

1	2	3	4
	Cruiser OSR	K	46
	Decis Mega	I	209, 210
	Devrinols s.k.	H	152
	Efilor	F	83
	Fury 100 EW	I	214
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Folikūrs 250 e.ū.	F/AR	38, 90
	Fox 480 SC	H	157
	Galera š.k.	H	158
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Metaz 500 SC	H	163
	Golden Piccant 334 SL	H	163
	Hoder 720 SG	H	166
	Juventus 90 š.k.	F/AR	39, 99
	Cantus d.g.	F	73 d.g.
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalif 360 CS	H	168
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Lontrel 72 SG	H	173
	Mesurool	Lim	228
	Mystic	F	106
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Piccoli 334 SL	H	181
	Plenum 50 WG	I	226
	Proteus OD	I	226
	Prosaro	F	115
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Rovral Aqua Flo	K	52, 121
	Sultāns 500 s.k.	H	194
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Taifūns B š.k.	H	195
	Targa Super	H	196
	Teridox 500 EC	H	196
	Tilmor	F	127
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
Rapsis, ziemas	Akanto 250 s.k.	F	56
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Amistārs Ekstra s.k.	F	62
	Brasan 540 EC	H	149
	Butisan 400	H	150
	Butisan Star	H	150
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Cruiser OSR	K	46
	Decis Mega	I	209, 210
	Devrinols s.k.	H	152
	Efilor	F	83
	Fury 100 EW	I	214
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Folikūrs 250 e.ū.	F/AR	38, 90
	Fox 480 SC	H	157
	Galera š.k.	H	158
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Metaz 500 SC	H	163
	Golden Piccant 334 SL	H	163
	Hoder 720 SG	H	166
	Juventus 90 š.k.	F/AR	39, 99
	Cantus d.g.	F	73 d.g.

1	2	3	4
	Kaiso 50 EG	I	217
	Kalif 360 CS	H	168
	Kalif Mega	H	169
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Karis 10 CS	I	219
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Lontrel 72 SG	H	173
	Mesurool	Lim	228
	Moddus 250 EC	AR	40
	Mystic	F	106
	Nimbus	H	178
	Orius 250 e.ū.	F	111
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Piccoli 334 SL	H	181
	Plenum 50 WG	I	226
	Proteus OD	I	226
	Prosaro	F	115
	Riza 250 e.ū.	F	119
	Rovral Aqua Flo	K	52, 121
	Sultāns 500 s.k.	H	194
	Sumi-alfa 5 e.k.	I	226
	Taifūns B š.k.	H	195
	Targa Super	H	196
	Teridox 500 EC	H	196
	Tilmor	F	127
	Toprex 375 SC	AR	41, 131
	Zamirs 400 e.ū.	F	134
Ripsis, vasaras	Akanto 250 s.k.	F	56
Ripsis, ziemas	Akanto 250 s.k.	F	56
Siltumnicas	Sērs p.	F/A	238
Sēklas materiāls (dažādu kultūru)	Actellic 50 EC	I/A	202
Stiebrzāles, daudzgadīgās	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	Agroksons 75 š.k.	H	137
	Ariane S	H	140
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Estets 600 e.k.	H	154
	Fastac 50	I	211
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Kestac 50	I	220
	Primuss s.k.	H	181
	MCPA 750	H	174
	MCPA Super 500 š.k.	H	175
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	Starane 180 e.k.	H	192
	Tomigans 180 e.k.	H	197
	U 46 M š.k.	H	199
Airene, ganību	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Starane XL s.e.	H	193
Auzene, pļavas	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
Auzene, sarkanā	Starane XL s.e.	H	193
Dižauza	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
Kamolzāle	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
Lāčauza, bezakotu	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
Lapsaste, pļavas	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
Skarene, pļavas	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153
	Starane XL s.e.	H	193
Timotiņš	2.4-D Nufarm š.k.	H	136
	DMA 6 2.4-D Retro š.k.	H	153

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
Stiebrzāles – sēklu lauki	Ariane S	H	140
	Hoder 720 SG	H	166
	Lontrel 72 SG	H	173
Stiebrzāles, daudzgadīgās – sēklu lauki	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ceridor MCPA 750 š.k.	H	151
	Barclay Bolt XL	F	68
	GAT Stake 20 EC	H	158
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
Stiebrzāles, daudzgadīgās – lopbarībai	Barclay Bolt XL	F	68
	GAT Stake 20 EC	H	158
Tabaka un tās izstrādājumi	Fostoksīns tb.	I/A	214
	Magtoksīns tb.	I/A	224
Tīrumu apstrāde pēc zālāju sēklu lauku novākšanas	Glyphomax 480	H	162
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Amega š.k.	H	139
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Dalgis š.k.	H	152
	Dominators š.k.	H	153
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glifomaks š.k.	H	159
	Glifoss š.k.	H	161
	Glifoss Suprīm š.k.	H	161
	Glyphomax 480	H	162
	Jablo š.k.	H	168
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kliniks 360 š.k.	H	170
	MAC glifosāts 360 š.k.	H	174
	Raundaps Eko š.k.	H	183
	Raundaps FL 360 š.k.	H	184
	Raundaps Gold ST š.k.	H	184
	Raundaps Klasiks š.k.	H	185
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Reindžers š.k.	H	187
	Rodeo š.k.	H	188
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Roundup ACE	H	190
	Roundup FL 540	H	190
	Taifūns B š.k.	H	195
	Uragāns Sistem 4 š.k.	H	199
Tīrumi pirms kultūrauga digšanas/ pēc sējas	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glyphomax 480	H	162
Tīrumi pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glyphomax 480	H	162
	Kernels 480 š.k.	H	169
Virsmas, tara, darbarīki	Menno Florades š.k.	F/B / V	43
Zālāji	Banvels 4S š.k.	H	142
	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Polytanol	Ro	231
	Raundaps Maks d.g.	H	186
	Rosate 36 š.k.	H	188

1	2	3	4
Zāliens	Amistārs 250 s.k.		60
	Ferramol	Lim	228
	Kestac 50	I	220
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	179, 180
	Polytanol	Ro	231
	Starane 180 e.k.	H	192
	Svičs 62.5 d.g.	F	123
	Tomigans 180 e.k.	H	197
Zāliens golfa laukumā	AlfaStop 50 EC	I	202
	Amistārs 250 s.k.	F	60
	Fastac 50	I	211
	Golden Alpha 50 EC	I	215
Zirņi	AlfaStop 50 EC	I	202
	Ažils 100 e.k.	H	141
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Bokseris 800 e.k.	H	149
	Butoksons š.k.	H	150
	Ciperkils 250 e.k.	I	205
	Ciperkils 500 e.k.	I	206
	Decis 2.5 e.k.	I	208
	Decis Mega	I	209, 210
	Diqua	D	42
	Dithane NT	F	78
	Fastac 50	I	211
	Fenix	H	155
	Fury 100 EW	I	214
	Fokuss Ultra e.k.	H	156
	Glifogans 360 š.k.	H	159
	Glifomaks Plus š.k.	H	160
	Glyphomax 480	H	162
	Golden Alpha 50 EC	I	215
	Karate Zeon 5 CS	I	218
	Kernels 480 š.k.	H	169
	Kestac 50	I	220
	Lingo ZC	H	172
	Litagra Decis Mega 50 e.ū.	I	223
	Maksims 025 s.k.	K	49
	Nuflon	H	180
	Pantēra 4 e.k.	H	181
	Reglons Super š.k.	D	42, 187
	Rosate 36 š.k.	H	188
	Signum d.g.	F	121
	Stomps e.k.	H	193
	Trihogramma	Dz	235
Zirņi graudiem	Barbarian 360 š.k.	H	142
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	144
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	145
	Raundaps Maks d.g.	H	186
Zirņi lopbarībai, graudi	Taifūns B š.k.	H	195
	Danadims 40 e.k.	I/A	47, 207
Zirņu mistri	Perfekts 500 S e.k.	I/A	225
	Bazagrāns 480 š.k.	H	148
	Stomps e.k.	H	193

LATVIJAS TĪRUMOS IZPLATĪTĀKĀS NEZĀLES

ĪSMŪŽA DIVDĪGĻLAPJU NEZĀLES

VIENGADĪGĀS

Aklis, asais	<i>Galeopsis tetrahit</i>
Aklis, raibais	<i>Galeopsis speciosa</i>
Balanda, baltā	<i>Chenopodium album</i>
Balanda, daudzsēkļu	<i>Chenopodium polyspermum</i>
Balodene, izplestā	<i>Atriplex patula</i>
Dievkrēsliņš, saules	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Gaurs, tīruma	<i>Spergula arvensis</i>
Madara, ķeraiņu	<i>Galium aparine</i>
Matuzāle, ārstniecības	<i>Fumaria officinalis</i>
Mīkstpiene, dārza	<i>Sonchus oleraceus</i>
Nātre, kodīgā	<i>Urtica urens</i>
Pavirza, tīruma	<i>Anagallis arvensis</i>
Pērkone, tīruma	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Sīkgalvīte, īsstaru	<i>Galinsoga parviflora</i>
Sinepe (zvēre), tīruma	<i>Sinapis arvensis</i>
Sunītis, trejdaivu	<i>Bidens tripartita</i>
Sūrene, blusu	<i>Polygonum persicaria</i>
Sūrene, maura	<i>Polygonum aviculare</i>
Sūrene, mezglainā	<i>Polygonum lapathifolium</i>
Vējagriķis	<i>Fallopia convolvulus</i>

ZIEMOTSPĒJĪGĀS

Aitene, tīruma	<i>Lycopsis arvensis</i>
Atraitnīte, tīruma	<i>Viola arvensis</i>
Atraitnīte, trejkrāsu	<i>Viola tricolor</i>
Dievkrēsliņš, saules	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Grābeklīte, velnarutku	<i>Erodium cicutarium</i>
Krustaine, parastā	<i>Senecio vulgaris</i>
Kumelīte, tīruma	<i>Matricaria perforata</i>
Magone, lauka	<i>Papaver dubium</i>
Naudulis, tīruma	<i>Thlaspi arvense</i>
Neaizmirstule, tīruma	<i>Myosotis arvensis</i>
Panātre, sārtā	<i>Lamium purpureum</i>
Pērkonene, parastā	<i>Erysimum cheiranthoides</i>
Plikstiņš, ganu	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Rudzupuķe, parastā	<i>Centaurea cyanus</i>
Salātene, parastā	<i>Lapsana communis</i>
Spulgotne, baltā	<i>Melandrium album</i>
Veronika, tīruma	<i>Veronica arvensis</i>
Virza, parastā	<i>Stellaria media</i>
Viķis, četrskēklu	<i>Vicia tetrasperma</i>
Viķis, smilts	<i>Vicia villosa</i>
Viķis, spilvainais	<i>Vicia hirsuta</i>

DAUDZGADĪGĀS DIVDĪGLĻAPJU NEZĀLES

Ceļteka, lielā	<i>Plantago major</i>
Cūkpiene, ārstniecības	<i>Taraxacum officinale</i>
Gārša, parastā	<i>Aegopodium podagraria</i>
Gundega, kodīgā	<i>Ranunculus acris</i>
Gundega, ložņu	<i>Ranunculus repens</i>
Latvānis, Sosnovska	<i>Heracleum sosnowskyi</i>
Māllēpe, parastā	<i>Tussilago farfara</i>
Mētra, tīruma	<i>Mentha arvensis</i>
Mīkstpiene, tīruma	<i>Sonchus arvensis</i>
Nātre, lielā	<i>Urtica dioica</i>
Pelašķis, parastais	<i>Achillea millefolium</i>
Pīpene, parastā	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Retējs, maura	<i>Potentilla anserina</i>
Sārmene, purva	<i>Stachys palustris</i>
Skābene, cirtainā	<i>Rumex crispus</i>
Skābene, mazā	<i>Rumex acetosella</i>
Tītenis, tīruma	<i>Convolvulus arvensis</i>
Usne, tīruma	<i>Cirsium arvense</i>
Vēlpiene, rudens	<i>Leontodon autumnalis</i>
Vībotne, parastā	<i>Artemisia vulgaris</i>
Zvērene, lokaugļu	<i>Barbarea arcuata</i>

ĪSMŪŽA VIENDĪGLĀPJU NEZĀLES

Airene, linu	<i>Lolium remotum</i>
Gaiļsāre, parastā	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Rudzusmilga, parastā	<i>Apera spica-venti</i>
Sarene, zaļā	<i>Setaria viridis</i>
Skarene, maura	<i>Poa annua</i>
Vējauza	<i>Avena fatua</i>

DAUDZGADĪGĀS VIENDĪGLĀPJU NEZĀLES

Vārpata, ložņu	<i>Elytrigia repens</i>
----------------	-------------------------

PAPARŽU DAUDZGADĪGĀS NEZĀLES

Kosa, tīruma	<i>Equisetum arvense</i>
--------------	--------------------------

AUGU AIZSARDZĪBAS JOMU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

AUGU AIZSARDZĪBAS LIKUMS

17.12.1998. likums "Augu aizsardzības likums" ("LV", 388/399 (1449/1460), 30.12.1998.)
[stājas spēkā 13.01.1999.] ar grozījumiem:

- 11.03.2004. likums ("LV", 47 (2995), 25.03.2004.) [stājas spēkā ar 01.05.2004.]
- 12.05.2005. likums ("LV", 85 (3243), 31.05.2005.) [stājas spēkā ar 14.06.2005.]
- 02.11.2006. likums ("LV", 183 (3551), 15.11.2006.) [stājas spēkā ar 01.01.2007.]
- 17.07.2008. likums ("LV", 116 (3900), 30.07.2008.) [stājas spēkā ar 01.07.2009.]
- 09.10.2008. likums ("LV", 164 (3948), 22.10.2008.) [stājas spēkā ar 23.10.2008.]
- 04.03.2010. likums ("LV", 43 (4235), 17.03.2010.) [stājas spēkā ar 31.03.2010.]
- 13.10.2011. likums ("LV", 173 (4571), 02.11.2011.) [stājas spēkā ar 03.11.2011.]

Redakcija:[01.01.2013]

I NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

- 1) augi – dzīvi augi un dzīvas augu daļas (dārzeni, bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi, griezti ziedi, zari ar lapām, nozāģēti koki ar lapotni, lapas, lapotne, augu audu kultūras, ziedputekšņi, potzari, spraudēni, dzinumī, sēklas), izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
- 2) augu produkti:
 - a) neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti) augu valsts izcelsmes produkti,
 - b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
- 3) augu aizsardzības līdzeklis – produkts, kurā ir darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģisti vai kurš sastāv no tām un kurš paredzēts kādam no šādiem lietojumiem:
 - a) augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai, ja vien līdzekļa galvenais mērķis ir augu vai augu produktu aizsardzība, nevis higiēnas nodrošināšana,
 - b) augu dzīvības procesu ietekmēšanai, piemēram, ar vielām, kas ietekmē augšanu un nav barības vielas,
 - c) augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus),
 - d) nevēlamu augu vai augu daļu (izņemot aļģes) iznīcināšanai, ja vien līdzekli nelieto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai,
 - e) nevēlamu augu (izņemot aļģes) augšanas apturēšanai vai novēršanai, ja vien līdzekli neizmanto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai;
- 4) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas – jebkuras iekārtas, kas ir īpaši paredzētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā arī šo iekārtu efektīvai darbībai vajadzīgie piederumi,

piemēram, sprauslas, manometri, filtri, sieti, tvertņu tīršanas ierīces;

- 5) augu aizsardzības konsultants – persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt šādas konsultācijas;
- 6) augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs – persona, kura augu aizsardzības līdzekļu izplatītāja uzdevumā tirdzniecības vietā pirms augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas sniedz pircējam augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulējošos normatīvajos aktos minētajā kārtībā informāciju par augu aizsardzības līdzekli un ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību;
- 7) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators – persona, kas veic darbības ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par tiesībām veikt šādas darbības;
- 8) dzīvie organismi – kukaiņi, ērces, nematodes, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai;
- 9) integrētā augu aizsardzība – visu pieejamo augu aizsardzības paņēmieni rūpīga izvērtēšana un tādu atbilstošu paņēmieni lietošana, kuri novērš kaitīgo organismu populāciju vairošanos, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu ietekmes formu lietošanu ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, samazinot vai minimalizējot risku cilvēka veselībai un videi. Integrētā augu aizsardzība paredz veselīgu kultūraugu audzēšanu ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz agroekosistēmām un veicina kaitīgo organismu ierobežošanas dabisku mehānismu izmantošanu;
- 10) izsmidzināšana no gaisa – augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātus;
- 11) invazīvo augu suga – Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka veselībai vai videi;

- 12) kaitīgie organismi – dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes kaitīgie organismi (vīrusi, mikoplazma vai citi patogēni), kas apdraud augus vai augu produktus;
 - 13) profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs – persona, kas savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus no gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus.
- (13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā
03.11.2011. Grozījumi 5., 6. un 13.punktā stājas spēkā
01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ieviešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panākt, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto uzturā, un vidi, novērst augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā
01.05.2004.)

3.pants. Augu aizsardzība

- (1) Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas veicams, lai izpētītu augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus, noteiktu un īstenotu šo organismu izplatības ierobežošanu un apkarošanu.
- (2) Augu aizsardzību valstī pārzina Zemkopības ministrija.

II NODAĻA

VALSTS INSTITŪCIJU KOMPETENCE AUGU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi

- (1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešā pārvaldes iestāde.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic dienesta inspektori.
- (3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevums ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienests savu uzdevumu veikšanai:

- 1) pilda kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk – regula Nr. 1107/2009), 3.panta 30.punktu;
- 2) izveido un kārtoti to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, ieviešanu un izvešanu;
- 3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;
- 4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lietošanu, izvešanu, uzglabāšanu un transportēšanu;
- 5) veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;
- 6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;
- 7) izsniedz atļauju kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanai vai pārvietošanai zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām;
- 8) pilda references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, laboratoriski diagnosticē augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, apstiprina citas laboratorijas konstatētu augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskus pakalpojumus;
- 9) veic kaitīgo organismu riska analīzi;
- 10) izsniedz sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus;
- 11) ievieš, izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas lēmumus augu aizsardzības jomā;
- 12) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, izveido un uztur datubāzi par invazīvo augu sugu izplatību;
- 13) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.;
- 14) izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
- 15) sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa;
- 16) uzrauga koksnes iepakojamā materiāla

marķēšanu, sertificēšanu un apriti, kārtu koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistru, pieņem lēmumu par personas iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā un izsniedz atļauju sertificēt koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi;

17) kārtu un uztur kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu.

(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem, veicot uzraudzību un kontroli, ir šādas tiesības:

1) pārbaudīt, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības augu aizsardzības jomā;

2) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt personas, kuras darbojas augu aizsardzības jomā, pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kā arī ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.

(6) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgajiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to izplatības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp valstīm augu aizsardzības jomā un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām.

(7) Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonām var veikt kontroli augu aizsardzības jomā Latvijā.

(8) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(9) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par fitosanitārā pasākuma piemērošanu un augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu izpildāms nekavējoties. Dienesta direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.

(10) Iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei vai pieteikuma iesniegšana tiesai, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitārā pasākuma piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

(11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanu, audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Argzījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004., 02.11.2006., 04.03.2010. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. Ceturtās daļas 1. un 4.punkta jaunā redakcija, kā arī 15.punkts stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18.punktu)

5.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot

fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ieviešanu un izvešanu reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, kārtību, kādā sniedzama informācija Eiropas Komisijai, un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;

2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot regulu Nr. 1107/2009;

3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

4) (izslēgts ar 13.10.2011. likumu);

5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glabāšanu, tajos reglamentējot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un glabāšanas prasības, integrētās augu aizsardzības principus un prasības, profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības, kārtību, kādā sagatavojams novērtējums par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku, kādā izsniedzama atļauja augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa, speciālos ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzības pasākumus;

6) (izslēgts ar 13.10.2011. likumu);

7) noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajiem pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;

8) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakojšanu un marķēšanu;

9) noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai;

10) noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ieviešanu vai pārvietošanu;

11) noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;

12) noteikumus par kārtību, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī par valsts nodevas apmēru;

13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;

- 14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem;
- 15) noteikumus par invazīvo augu sugas latvāņa (*Heracleum sosnowskyi* Manden) (turpmāk – latvānis) ierobežošanas pasākumiem, kā arī iznīcināšanas kārtību un metodēm, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņa izplatību zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par sugas izplatību, kā arī par darba aizsardzības prasībām, veicot ierobežošanas pasākumus;
- 16) noteikumus par invazīvo augu sugu sarakstu;
- 17) noteikumus par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtību, par kārtību, kādā invazīvo augu suga tiek iekļauta invazīvo augu sugu sarakstā, par kārtību, kādā tiek veikts invazīvo augu sugu monitorings, valsts uzraudzība un kontrole, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par invazīvo augu sugu izplatību, kā arī noteikumus par valsts institūciju, kas kontrolē Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu ieviešanu uz valsts robežas, un kārtību, kādā veic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus, konkrētu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumus un metodes un, ja nepieciešams, darba aizsardzības prasības;
- 18) noteikumus par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, nosakot augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija, tās apmēru un izmaksas kārtību;
- 19) noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un šā materiāla aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts;
- 20) noteikumus par kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, reglamentējot laboratorijas funkcijas un pienākumus, kārtību, kādā tā atzīst citu laboratoriju tiesības diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, un šo laboratoriju uzraudzības kārtību;
- 21) noteikumus par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību, reglamentējot kārtību, kādā izsniedzama atļauja apmācības veikšanai, prasības atļaujas saņemšanai, apmācības kārtību, mācību programmas saturu, pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtību;
- 22) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, reglamentējot šo iekārtu pārbaudes veikšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību, prasības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, izņēmumus attiecībā uz pārbaudēm, citu Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtību, pārbaudes termiņus;
- 23) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, reglamentējot prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ieviešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, kārtību, kādā sniedzama informācija augu aizsardzības līdzekļa pircējam, un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;
- 24) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un kārtību, kādā tie piemērojami koksnes iepakojamā materiāla aizsardzībai, reglamentējot šo pasākumu veikšanas un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas kārtību, piemērojamās izņēmumus, kārtību, kādā veicama un anulējama reģistrācija koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā, koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes sertifikācijas noteikumus un kārtību, kādā sertifikācijas institūcijai izsniedz un anulē atļauju veikt koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikāciju, kā arī fitosanitāro pasākumu veikšanas, koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas un sertifikācijas uzraudzības kārtību.

(*Argrozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004., 12.05.2005., 02.11.2006., 09.10.2008., 04.03.2010. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. 5.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18.punktu*)

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā apstiprina konkrētu Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīnijas, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

III NODAĻA AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI UN PASĀKUMI

7.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

- (1) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009. Augu aizsardzības līdzekļu reģistru kārtoti Valsts augu aizsardzības dienests.
- (2) Iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanai reģistrā iesniedz persona, kura ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa pirmreizēju izplatīšanu Latvijā, vai tās pilnvarota persona

(turpmāk – reģistrācijas pieteicējs). Reģistrācijas pieteicējam ir juridiskā adrese Eiropas Savienības teritorijā. Par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

- (3) Lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā Valsts augu aizsardzības dienests pieņem viena gada laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.
- (4) Iekļaujot augu aizsardzības līdzekļus reģistrā, tiem nosaka trīs reģistrācijas klases.
- (5) Uz pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi ierobežojumi:
 - 1) tos atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram vai augu aizsardzības konsultantam;
 - 2) tos atļauts iegādāties profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu aizsardzības konsultantam.
- (6) Trešās klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot visas personas.
- (7) Augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir pārdevējs, kurš ieguvis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.
- (8) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic juridiskā persona, kura profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.
- (9) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apliecības izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.
- (10) Valsts augu aizsardzības dienests jebkurai ieinteresētajai personai nodrošina iespēju saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, vispārēju informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ar to lietošanu saistītajiem riskiem, augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku vielu lietošanu, un reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru Valsts augu aizsardzības dienests publicē savā mājaslapā internetā.

(11.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2006. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. Piektās, sestās, astotās un

devītās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un lietošana

- (1) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji – komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālo atļauju (licenci).
- (2) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakojumu un marķēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā.
- (3) Nav atļauts laist tirgū vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam. Ja rodas šaubas vai aizdomas par augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram ir tiesības ņemt augu aizsardzības līdzekļa paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, – apturēt šo līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu līdz galīgai kvalitātes noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad apturēta augu aizsardzības līdzekļa laišana tirgū vai lietošana.
- (5) Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.
- (6) Augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš, atļauts laist tirgū, ja tā paraugs atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugus tiek ņemts, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīzi saņemšanas no akreditētās laboratorijas lemj par turpmāko rīcību ar šādu līdzekli. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18.punktu)

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

- (1) Komersanti, kas minēti šā likuma 8.panta pirmajā daļā, nodrošina:

- 1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītajos apstākļos, turklāt atsevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;

- 2) to augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu atsevišķi, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.
- (2) Šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām izvirzāmās tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets.
- (3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizsēdāmās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 14.06.2005.)

10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

- (1) Persona augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot norādes marķējumā, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos tajos paredzētajos gadījumos.
- (2) Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma persona sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību, īstenotajiem to apkarošanas pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
- (3) Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa ir atļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- (4) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas sedz ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18. un 21.punktu)

11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

- (1) Atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.
- (2) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic reizi trijos gados.
- (3) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes un izmantošanu.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Grozījumi trešajā daļā attiecībā uz augu

aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi stājas spēkā 01.01.2012. Grozījumi pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā stājas spēkā 26.11.2016. Sk. Pārejas noteikumu 20. un 22.punktu)

IV NODAĻA

AUGU KARANTĪNA UN PASĀKUMI

12.pants. Augu karantīna

- (1) Augu karantīna jeb fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, kas veicams, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kuri nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti un kuriem piemērojami fitosanitārie pasākumi.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienests veic fitosanitāro kontroli vai tā uzraudzībā tiek veikta šī kontrole, lai noskaidrotu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību fitosanitārajām normām, un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus, lai novērstu augu karantīnas organismu ieviešanu, ieviešanos un izplatīšanos.
- (3) Ja valsts teritorijā rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienests var ierosināt zemkopības ministram noteikt fitosanitāros pasākumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanai, audzēšanai un pārvietošanai.
- (4) Personai ir pienākums nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos.
- (5) Valsts augu aizsardzības dienests izstrādā ilgtermiņa programmu noteiktu kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai.
- (6) Persona var saņemt kompensāciju par tai uzdoto fitosanitāro pasākumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kompensācija tiek maksāta no valsts budžeta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

13.pants. Personu reģistrācija

- (1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ieviešanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā. Par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu aprītē iesaistīto personu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (2) Reģistrēto personu pienākums ir:
 - 1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt to Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;

- 2) vizuāli pārbaudīt augus un augu produktus un par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;
 - 3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;
 - 4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un kontrolēt fitosanitāro pasākumu izpildi;
 - 5) informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par izmaiņām reģistrā iekļautajā informācijā;
 - 6) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienestam nepieciešamo rakstveida informāciju par augu un augu produktu audzēšanas, ražošanas un uzglabāšanas vietām.
- (3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.
- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 02.11.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14.pants. Augu un augu produktu ieviešana

- (1) Eiropas Savienībā un valstī aizliegts ievest augu karantīnas organismus, kā arī augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja tie neatbilst fitosanitārajām normām, kā arī tad, ja nav attiecīgu dokumentu.
 - (2) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanu, nodrošina apstākļus fitosanitārās kontroles veikšanai.
 - (3) Pāri muitas robežai ievadamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu muietošanu var pabeigt tikai pēc to fitosanitārās kontroles.
 - (4) Atsevišķos gadījumos Valsts augu aizsardzības dienests var pakļaut fitosanitārajai kontrolei arī citus augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja pastāv augsta augu karantīnas organismu ieviešanas riska iespēja.
 - (5) Ja fitosanitārās kontroles rezultātā konstatēta augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstība fitosanitārajām normām, attiecībā uz tiem veic vienu no šādiem pasākumiem:
 - 1) nosūta atpakaļ attiecīgajai valstij vai izņem no kravas inficētu vai invadētu produkciju, pārējo kravas daļu atļauj ievest, ja tiek nodrošināts, ka nepastāv kaitīgā organisma izplatīšanās draudi;
 - 2) iznīcina Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktajā kārtībā;
 - 3) novieto muitas kontrolē līdz brīdim, kamēr ievēdējs veic Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus.
- (6) Šā panta piektajā daļā minēto pasākumu izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Šo pasākumu izmaksas sedz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievēdējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (7) Zemkopības ministra noteiktā ievestā pavairojamā materiāla fitosanitārā kontrole notiek tā uzglabāšanas vai audzēšanas vietās. Šādu pavairojamo materiālu atļauts izplatīt vai pārvietot tikai pēc tam, kad Valsts augu aizsardzības dienests pieņēmis lēmumu par tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

15.pants. Augu un augu produktu tranzīts

- (1) Ja augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava tiek vesta tranzītā cauri valsts teritorijai, šo kravu nesadalot, nepārsaiņojot, neuzglabājot un nodrošinot, ka nerodas iespēja ar to inficēt valsts teritoriju vai tai valsts teritorijā inficēties ar augu karantīnas organismiem, attiecīgo kravu nepakļauj fitosanitārajai kontrolei.
- (2) Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzitkrava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama to izplatīšanās, kā arī tad, ja netiek ievēroti šā panta pirmās daļas noteikumi.

16.pants. Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

- (1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.
- (2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.
- (3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzitvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.
- (4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību paredz saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.
- (5) Ja importētājvalsts normatīvie akti paredz, ka koksnes iepakojamais materiāls marķējams saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijai starptautiskajā tirdzniecībā", fitosanitāros pasākumus veic un koksnes iepakojamo materiālu marķē koksnes iepakojuma

markētāju reģistrā iekļauta persona. Iepakojamā materiāla termisko apstrādi veic persona, kas ir sertificēta kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par fitosanitārajiem pasākumiem koksnes iepakojamam materiālam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2006. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

17.pants. Augu un augu produktu iekšzemes aprīte

- (1) Aizliegts izplatīt un pārvietot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas inficēti ar augu karantīnas organismiem, kā arī augus un augu produktus, kuri neatbilst fitosanitārajiem normām.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda augus un augu produktus, analizē kaitīgo organismu ieviešanās vai izplatīšanās risku un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniedz ierosinājumu Eiropas Komisijai atzīt par aizsargājamo zonu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteikti kaitīgie organismi, bet pastāv draudi, ka šiem organismiem labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos tie var ieviesties un izplatīties.
- (3) Valsts augu aizsardzības dienests veic augaugļu, dekoratīvo kultūru un dārzeņu pavairojamā materiāla sertifikācijas uzraudzību un izsniedz atbilstības dokumentus.
- (3¹) Augļu koku pavairošanas materiāla vīrustestēšanu veic persona, kuru dienests atzinis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (4) Ja konstatēta augu karantīnas organismu klātbūtne, personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumiem veic attiecīgo augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu dezinfekciju vai dezinfekciju un ievēro augu un augu produktu aprītei noteiktos ierobežojumus.
- (5) Augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu uzglabāšanu un pavairošanu, kā arī darbības, kas saistītas ar šo organismu ģenētisko modifikāciju, drīkst veikt tikai fitosanitārās pētniecības vai diagnosticēšanas mērķiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu.
- (6) Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus veic saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.
- (7) Lai izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un Eiropas Savienībā, augiem un augu produktiem pievieno augu pasi, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajiem prasībām.
- (8) Kaitīgos organismus, augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām ieved vai pārvieto, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

18.pants. Kontrole un uzraudzība pār augu un augu produktu aprīti

- (1) Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprīti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontrolei uz valsts robežas Ministru kabinets var noteikt citu institūciju, kura ievēro Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kontroles veikšanā.
- (2) Veicot augu un augu produktu aprītes uzraudzību un kontroli, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori:
 - 1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī zemes platības neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;
 - 2) nemaksājot atlīdzību personām, ņem augu un augu produktu, audzēšanas substrātu, sēklu un pavairojamā materiāla paraugus analīzēm saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem;
 - 3) uzdod personām veikt augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apstrādi ar atbilstošiem augu aizsardzības līdzekļiem un dezinfekciju, ja konstatēti augu karantīnas organismi un augi un augu produkti neatbilst fitosanitārajiem prasībām, kā arī uzdod lietot noteiktas ierīces, paņēmienus vai pārvietot augus un augu produktus uz zonām, kur tie neradīs papildu apdraudējumu, vai pārvietot augus un augu produktus uz rūpnieciskās pārstrādes vietām, kā arī nosaka augu audzēšanas un novākšanas kārtību, kontrolē šo pasākumu izpildi;
 - 4) aizliedz noteiktu sēklu sēšanu, augu stādīšanu un audzēšanu, ar kaitīgiem organismiem piesārņotu augšņu izmantošanu uz laiku vai pavisam, inficētu sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu, inficētu augu vai augu produktu transportēšanu un realizāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu ģenētiski modificēto organismu aprīti;
 - 5) aizliedz vai nosaka ierobežojumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanai, izvešanai un iekšzemes aprītei, ja konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 - 6) ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv augu karantīnas organismu izplatības draudi, nepieciešamos fitosanitāros pasākumus veic piespiedu kārtā. Ar šiem pasākumiem saistītās izmaksas sedz pārkāpējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

IV¹ NODAĻA INVAZĪVO AUGU SUGU IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA UN IZPLATĪBAS APZINĀŠANA

(Nodaļa 02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

18.¹ pants. Invazīvo augu sugas un to izplatības ierobežošana

- (1) Invazīvo augu sugu var iekļaut invazīvo augu sugu sarakstā, ja šī suga ir iekļauta Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas apstiprinātajā invazīvo augu sugu sarakstā vai iesniedzot attiecīgu priekšlikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (2) Latvijā aizliegts ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Ministru kabinets nosaka valsts institūciju, kas uz valsts robežas kontrolē invazīvo augu sugu ieviešanu.
- (3) Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.
- (5) Invazīvo augu sugu iznīcināšana visās teritorijās, kurās tās izplatījušās, kā arī šīm teritorijām pieguļošajās teritorijās uzsākama un veicama vienā sezonā. Par pieguļošajām teritorijām uzskatāmas tādas teritorijas, kuras no apkārtnējās teritorijas ir norobežotas ar dabiskiem šķēršļiem (ceļš, ūdenstece, mežs u.tml.), kas traucē minēto augu sugu tālāku izplatību.
- (6) Atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai republikas pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība:
 - 1) pieņem lēmumu par Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumiem attiecīgās pašvaldības teritorijā un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
 - 2) izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi. Ekspertu grupa izstrādā attiecīgās pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu;
 - 3) sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un koordinē invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu īstenošanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus.
- (7) Invazīvo augu sugu zinātniskiem un pētniecības mērķiem drīkst ievest vai audzēt, ja ir saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja

normatīvajos aktos par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. un 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

18.² pants. Invazīvo augu sugu izplatības apzināšana un datu apkopošana

- (1) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās Valsts augu aizsardzības dienestam sniedz valsts pārvaldes iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienests datus par invazīvo augu sugu izplatību apkopo datubāzē. Informācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir brīvi pieejama sabiedrībai.
- (3) Ikviens persona informē Valsts augu aizsardzības dienestu, ja tās rīcībā ir ziņas par invazīvo augu sugu izplatību.

V NODAĻA SADARBĪBA AUGU AIZSARDZĪBĀ

19.pants. Sadarbība augu aizsardzībā

- (1) Zinātniskās pētniecības institūcijas un citas personas, kas veic zinātniskos pētījumus, pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par augu karantīnas organismiem, augiem sevišķi bīstamiem organismiem un fitosanitārajiem pasākumiem minēto organismu izplatīšanās ierobežošanai.
- (2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

VI NODAĻA ATBILDĪBA PAR LIKUMA NEIEVĒROŠANU

20.pants. Atbildība par likuma neievērošanu

- (1) Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.
 - (2) Par augu aizsardzības pasākumu neveikšanu, augu aizsardzības līdzekļu nolaidīgu lietošanu, nekvalitatīvu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, ar augu karantīnas organismiem inficētu augu un augu produktu tišu izplatīšanu, kā rezultātā augu audzētājiem nodarīti zaudējumi vai radušies papildu izdevumi, vainīgās personas ir atbildīgas saskaņā ar Civillikumu.
 - (3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā atbildība neatbrīvo personas no Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu veikšanas.
 - (4) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu.)
- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

PĀREJAS NOTEIKUMI

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.
2. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
3. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais darbības termiņš un reģistrācijas nosacījumi.
4. *(Izslēgts ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*
5. *(Izslēgts ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*
6. Ministru kabinets izdod līdz:
 - 1) 2004.gada 1.maijam noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;
 - 2) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
 - 3) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;
 - 4) 2004.gada 1.maijam noteikumus par ķīmisku augu aizsardzības līdzekļu un mikroorganismus un vīrusus saturošu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību;
 - 5) 2004.gada 1.maijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ieviešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un neregistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;
 - 6) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ieviešanu vai pārvietošanu;
 - 7) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakojšanu un marķēšanu;
 - 8) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus.
- (11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*
7. Līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
 - (11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*
 8. Līdz 2004.gada 1.maijam reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais reģistrācijas termiņš un reģistrācijas nosacījumi.
 - (11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*
 9. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta 15. un 16.punktā minētos noteikumus.
 - (02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)*
 10. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.panta 17.punktā minētos noteikumus.
 - (02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)*
 11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.decembrim izdod šā likuma 5.panta 18. un 19.punktā minētos noteikumus.
 - (09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)*
 12. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 5.panta 20.punktā minētos noteikumus.
 - (09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)*
 13. Šā likuma 5.panta 20.punkts stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī.
 - (09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)*
 14. Šā likuma 12.panta sestajā daļā paredzētā kompensācija 2008.gadā tiek maksāta no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtajiem līdzekļiem.
 - (09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)*
 15. Zemkopības ministrijas izdotās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
 - (04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)*
 16. Šā likuma 5.panta 12.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".
 - (04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)*
 17. Līdz šā likuma 5.panta 12.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.470 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
 - (04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)*
 18. Grozījumi šā likuma 1.panta 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā, 4.panta ceturrtās daļas 1., 4. un 15.punktā, 5.panta 5.punktā, 7.panta pirmajā, ceturtajā, septītajā un desmitajā daļā,

8. un 10.pantā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2011.gada 26.novembrī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

19. Grozījumi šā likuma 1.panta 5., 6. un 13.punktā, 7.panta piektajā, sestajā, astotajā un devītajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

20. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā un 11.panta trešajā daļā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

21. Šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētie integrētās augu aizsardzības principi un prasības piemērojamas no 2014.gada 1.janvāra.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

22. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2016.gada 26.novembrī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

23. Līdz 2016.gada 26.novembrim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudāmas vismaz vienu reizi.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

24. Līdz 2020.gada 1.janvārim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi starplaiks nepārsniedz piecus gadus.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta 2.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulu Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

26. Ministru kabinets līdz 2011.gada 26.novembrim izdod šā likuma 5.panta 5., 21., 22., 23. un 24.punktā minētos noteikumus. Integrētās augu aizsardzības principus un prasības Ministru kabinets izdod līdz 2014.gada 1.janvārim.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

INFORMATĪVA ATSAUCE UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVĀM

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

- 1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;
- 2) Komisijas 1992.gada 3.novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievadēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;
- 3) Komisijas 1995.gada 26.jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;
- 4) Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakojšanu un marķēšanu;
- 5) Padomes 2000.gada 8.maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ieviešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;
- 6) Komisijas 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/61/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (kodificētā versija);
- 7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);
- 8) Padomes 2009.gada 26.novembra direktīvas 2009/143/EK, ar ko groza direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorisko pārbaudi uzdevumu deleģēšanu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents **G. Ulmanis**

Rīgā 1998.gada 30.decembrī

Ministru kabineta noteikumi Nr.949
Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 18.§)

NOTEIKUMI PAR AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LAIŠANU TIRGŪ

13.12.2011. MK noteikumi Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū" ("LV", 202 (4600), 23.12.2011.) [stājas spēkā 24.12.2011.]

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 23.punktu un 9.panta otro daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

- Noteikumi nosaka prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ieviešanas, izvešanas, uzglabāšanas un transportēšanas prasības, to pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, informācijas sniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļa pircējam un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību. Jautājumus, kas saistīti ar atļaujas sniegšanu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.
- Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LAIŠANA TIRGŪ

- Augu aizsardzības līdzekļu ieviešanu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muižošanas vietas). Muitas procedūru noformē pēc šajā punktā noteiktās kontroles.
- Licences īpašnieks septiņu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa ieviešanas Latvijā par to informē dienestu, iesniedzot dienestā augu aizsardzības līdzekļa ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošu dokumentu.
- Augu aizsardzības līdzekli nosūta atpakaļ uz trešo valsti, no kuras tas Latvijā ievests, ja:
 - augu aizsardzības līdzeklis nav reģistrēts Latvijā;
 - augu aizsardzības līdzeklī beidzies derīguma termiņš;
 - augu aizsardzības līdzeklis nav klasificēts, marķēts vai iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu;
 - augu aizsardzības līdzeklis nav iepakots oriģinālā iepakojumā vai tam nav ražotāja marķējuma latviešu valodā.
- Latvijā neregistrētu augu aizsardzības līdzekli, ko paredzēts pārvest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nosūta atpakaļ uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, no kuras tas ievests, ja augu aizsardzības līdzeklis:
 - nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;
 - nav klasificēts, iepakots vai marķēts saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunkta prasībām.
- Latvijā atļauts ievest, ražot, uzglabāt vai transportēt neregistrētu augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts lietošanai:
 - kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;
 - kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir klasificēts, marķēts un iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu, izņemot prasību par marķējumu valsts valodā;
 - trešajā valstī un licences īpašnieks piecu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izvešanas informē dienestu par katru no Latvijas izvesto augu aizsardzības līdzekļu partiju.
- Neregistrētus augu aizsardzības līdzekļus līdz to pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai izvešanai uz trešo valsti uzglabā tirdzniecības vietas noliktavā, kuras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
- Licences īpašnieks 10 darbdienu pirms tāda neregistrēta augu aizsardzības līdzekļa ieviešanas uzglabāšanas vietā, kurš paredzēts pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, rakstiski iesniedz dienestā informāciju, norādot:
 - Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras augu aizsardzības līdzekli ievie, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura nosūta augu aizsardzības līdzekli;
 - Eiropas Savienības dalībvalsti, uz kuru paredzēts pārvest augu aizsardzības līdzekli, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
 - partijas numuru, augu aizsardzības līdzekļa

- nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu.
10. Par pārvietošanai paredzēto neregistrēto augu aizsardzības līdzekli licences īpašnieka rīcībā ir šādi dokumenti:
 - 10.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošs dokuments;
 - 10.2. dokuments, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 - 10.3. dokuments, kurā ir šāda informācija:
 - 10.3.1. Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuras augu aizsardzības līdzekli iaved, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
 - 10.3.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, uz kuru paredzēts pārvest augu aizsardzības līdzekli, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
 - 10.3.3. partijas numurs, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums, iepakojuma lielums.
 11. Persona, kas atbild par neregistrēta augu aizsardzības līdzekļa pārvietošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nodrošina:
 - 11.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinoša dokumenta kopiju katrai partijai;
 - 11.2. dokumentu, kas apliecina šī augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest.
 12. Licences īpašnieks:
 - 12.1. nodrošina, lai katrai jebkura augu aizsardzības līdzekļa partijai būtu kvalitāti apliecinošs dokuments, ja viņš ir attiecīgās augu aizsardzības līdzekļa partijas iavedējs;
 - 12.2. nodrošina katram augu aizsardzības līdzeklim drošības datu lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas;
 - 12.3. nodrošina iespēju dienesta inspektoram iepazīties ar šo noteikumu 29. un 31.punktā minētajiem uzskaites datiem, kā arī kontrolēt tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas;
 - 12.4. glabā augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošus dokumentus un šo noteikumu 29. un 31.punktā minēto informāciju vismaz piecus gadus;
 - 12.5. nodrošina, lai tirdzniecības vai uzglabāšanas vietā ir darbinieks, kas ir saņēmis augu aizsardzības līdzekļa pārdevēja apliecību vai apliecību par tiesībām konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un kas, pārdodot augu aizsardzības līdzekli, konsultētu pircēju saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas prasībām;
 - 12.6. pirms ievestā augu aizsardzības līdzekļa tālākas izplatīšanas pārbauda, vai augu aizsardzības līdzekļa marķējumā nav šo noteikumu 15.punktā minēto būtisko neatbilstību;
 - 12.7. 24 stundu laikā pēc tam, kad konstatēta neatbilstība augu aizsardzības līdzekļa marķējuma informācijā (turpmāk – neatbilstošs marķējums), par neatbilstošo marķējumu informē dienestu un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvi un iesniedz dienestā iesniegumu par iespējamo neatbilstības novēršanas veidu. Dienests izvērtē iesniegumu un 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu.
 13. Persona, kas iaved augu aizsardzības līdzekli, pēc licences īpašnieka pieprasījuma nekavējoties tam nodod augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošā dokumenta kopiju.
 14. Licences īpašniekam aizliegts:
 - 14.1. izplatīt augu aizsardzības līdzekli personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;
 - 14.2. izplatīt pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus personām, kurām nav speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vai apliecības par tiesībām konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, vai apliecības par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;
 - 14.3. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kura iepakojums ir bojāts (izņemot šo noteikumu 70.punktā minēto gadījumu) vai bez marķējuma, kā arī tad, ja marķējums ir nesalasāms, bojāts, neatbilstošs vai labots (daļēji dzēsts, papildināts), ja nav saņemts šo noteikumu 17.punktā minētais dienesta lēmums;
 - 14.4. pārbērt vai pārliet augu aizsardzības līdzekļus citā iepakojumā;
 - 14.5. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, ja vien dienests nav pieņēmis lēmumu par atļaujas izsniegšanu šāda augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai.
 15. Marķējumu par būtiski neatbilstošu uzskata, ja:
 - 15.1. marķējuma teksts nav latviešu valodā;
 - 15.2. norādītās darbīgās vielas nav reģistrētas Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
 - 15.3. norādīts Latvijā neregistrēts augu aizsardzības līdzekļa lietojums.
 16. Licences īpašnieks, kas Latvijā iavedis augu aizsardzības līdzekļa partiju ar šo noteikumu 15.punktā minēto būtiski neatbilstošo marķējumu, atsauc partiju no izplatīšanas šo noteikumu 20.punktā minētajā kārtībā, divu mēnešu laikā

- pēc neatbilstošā marķējuma konstatēšanas dienas to izved no Latvijas vai nodod iznīcināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un iesniedz dienestā apliecinājumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu iznīcināšanai.
17. Augu aizsardzības līdzekļa partiju, kurai konstatēts neatbilstošs marķējums, atļauts izplatīt ar labotu marķējumu, ja neatbilstība saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu nav būtiska un dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju labot augu aizsardzības līdzekļa marķējumu (turpmāk – dienesta lēmums).
 18. Licences īpašnieks dienesta lēmuma kopiju glabā katrā augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vietā un nodrošina augu aizsardzības līdzekļa marķējuma izlabošanu septiņu darbdienu laikā pēc dienesta lēmuma saņemšanas.
 19. Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvja pienākums ir nekavējoties informēt citus licences īpašniekus, kas Latvijā ievēduši attiecīgo augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu.
 20. Lai atsauktu no izplatīšanas augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu vai partiju, kuras izplatīšanu dienests ir aizliegdis, licences īpašnieks nosūta paziņojumu citiem licences īpašniekiem, kam konkrētā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:
 - 20.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma lielumu, partijas numuru;
 - 20.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;
 - 20.3. izplatīšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruna numuru.
 21. Lai dienesta inspektors varētu piedalīties tāda augu aizsardzības līdzekļa parauga ņemšanā, kuram beidzies derīguma termiņš, licences īpašnieks vismaz piecas darbdienu pirms parauga ņemšanas iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu (pielikums).
 22. Licences īpašnieks šo noteikumu 14.5.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanai iesniedz dienestā iesniegumu, kam pievienoti akreditētas laboratorijas augu aizsardzības līdzekļa parauga analīžu rezultāti.
 23. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš, uz vienu gadu no dienas, kad parakstīti augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīžu rezultāti, ja saskaņā ar tiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs joprojām atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam.
 24. Ja saskaņā ar augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests atsaka atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai, kuram beidzies derīguma termiņš.
 25. Augu aizsardzības līdzekļus aizliegts izplatīt:
 - 25.1. izmantojot tirdzniecības automātus vai pašapkalpošanās sistēmas;
 - 25.2. izstādēs un citos publiskos pasākumos, ielu tirdzniecības vietās un tirgos.
 26. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā aizliegta tirdzniecība ar pārtikas produktiem, lopbarību, sadzīves ķīmijas precēm un medikamentiem, ja vien augu aizsardzības līdzekļi nav izvietoti atsevišķā telpā.
 27. Tirdzniecībai paredzētos augu aizsardzības līdzekļus izvieto slēgtā skapī vai plauktā atsevišķi no citām precēm. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:
 - 27.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;
 - 27.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
 28. Gaistošus augu aizsardzības līdzekļus atļauts izvietot tikai vēdināmās telpās.
 29. Licences īpašnieks reģistrācijas žurnālā uzskaita:
 - 29.1. saņemtos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī augu aizsardzības līdzekļus, kuri ir bojāti vai kuriem beidzies derīguma termiņš, norādot:
 - 29.1.1. saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;
 - 29.1.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, no noliktavas izsniegto daudzumu un atlikumu – augu aizsardzības līdzekļiem, kas atrodas noliktavā;
 - 29.1.3. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, derīguma termiņa beigu datumu, parauga ņemšanas datumu, datumu, kad pieņemts lēmums par atļauju izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, – augu aizsardzības līdzekļiem, kam beidzies derīguma termiņš;
 - 29.1.4. nosaukumu, iepakojuma lielumu, daudzumu un bojājuma raksturu – augu aizsardzības līdzekļiem, kam bojāts iepakojums;
 - 29.2. neregistrētos augu aizsardzības līdzekļus, kas saņemti un izvesti no noliktavas, norādot:
 - 29.2.1. saņemšanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;
 - 29.2.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma

- lielumu, partijas numuru – augu aizsardzības līdzekļiem, kas tiek glabāti noliktavā;
- 29.2.3. izvešanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – izvestajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
30. Šo noteikumu 29.punktā minēto uzskaiti var veikt elektroniski.
31. Personām izplatītos pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus licences īpašnieks reģistrē šo noteikumu 29.punktā minētajā reģistrācijas žurnālā, atzīmējot pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, apliecības numuru par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekli vai konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai speciālās atļaujas (licences) numuru augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, pārdotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un daudzumu.
32. Persona, kas iegādājusies augu aizsardzības līdzekli, reģistrācijas žurnālā ar parakstu apliecina šo noteikumu 31.punktā minētās ziņas.
- ### III. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UZGLABĀŠANA
33. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā tirdzniecības vietas noliktavā vai noliktavas daļā (turpmāk – uzglabāšanas vieta), ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu.
34. Ja vairākiem licences īpašniekiem speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīta viena tirdzniecības vieta, uzglabāšanas vietu iekārto tā, lai varētu identificēt augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un tam piederošos augu aizsardzības līdzekļus.
35. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kurām pastāv acīmredzams applūšanas risks, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.
36. Lai garantētu darba drošību, darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem uzglabāšanas vietā vienlaikus veic vismaz divas personas.
37. Uzglabāšanas vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
38. Uzglabāšanas vietā aizliegts glabāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus.
39. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.
40. Ja uzglabāšanas vietā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem tiek glabātas citas preces, augu aizsardzības līdzekļus norobežo no pārējām precēm vai izvieto tos skapjos, nodrošinot ventilāciju. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:
- 40.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;
- 40.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
41. Augu aizsardzības līdzekli novieto plauktos (statīvos) vai uz paliktņiem tā, lai starp plauktu vai paliktņu rindām būtu vismaz vienu metru plata eja.
42. Ja augu aizsardzības līdzekļus:
- 42.1. novieto plauktā (ar vai bez paliktņiem), krāvuma augstums vienā plauktā nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus;
- 42.2. novieto ar paliktņiem uz grīdas, krāvuma augstums uz viena paliktņa nedrīkst pārsniegt 1,6 metrus;
- 42.3. novieto ar paliktņiem citu uz cita, kopējais krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,6 metrus.
43. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši šādām tehniskajām prasībām:
- 43.1. ieklāj grīdu no ūdensnecaurļaidīga materiāla vai betona;
- 43.2. ierīko ventilāciju ar atbilstošu gaisa cirkulāciju;
- 43.3. ierīko ūdensvadu vai speciālu ierīci roku mazgāšanai.
44. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.
45. Uzglabāšanas vietā izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā “UZMANĪBU, PESTICĪDI” un “NESMĒKĒT, NEĒST, NEDZERT”.
46. Neregistrētu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietā papildus šo noteikumu 45.punktā minētajiem uzrakstiem izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā “NEREĢISTRĒTI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI”.
47. Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, vai kuru marķējums neatbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām, vai kuriem bojāts iepakojums, uzglabā atsevišķi. Šo līdzekļu uzglabāšanas vietā izvieto uzrakstu uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā “PĀRDOT AIZLIEGTS”. Augu aizsardzības līdzekļus, kuru iepakojums ir bojāts, likvidē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
48. Uzglabāšanas vietā nodrošina:
- 48.1. individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, respiratoru, aizsargbrilles, aizsargapģērbu, cimdus);
- 48.2. absorbējošu materiālu (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdru);
- 48.3. atsevišķu inventāru (slotu, spaini, liekšķeri), kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst.

49. Uzglabāšanas vietā novieto labi redzamus norādījumus par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī tās personas uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, ar kuru var sazināties, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija.
50. Neregistrētus augu aizsardzības līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā, ievērojot šo noteikumu 36., 37., 38., kā arī 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktā minētās prasības.

IV. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU TRANSPORTĒŠANA

51. Augu aizsardzības līdzekli pārvadā:
 - 51.1. oriģinālā nebojātā un marķētā iepakojumā;
 - 51.2. vietējos vai tranzīta pārvadājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus.
52. Aizliegts pārvadāt augu aizsardzības līdzekli vienā kravas nodalījumā ar pārtikas produktiem, lopbarību un medikamentiem.

V. PĀRDEVĒJU UN AUGU AIZSARDZĪBAS KONSULTANTU PIENĀKUMI

53. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai konsultants, kas ieguvis šo noteikumu 12.5.apakšpunktā minēto apliecību, sniedz pircējam augu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa marķējumam atbilstošu informāciju par:
 - 53.1. iespējamo konkrētā augu aizsardzības līdzekļa radīto risku cilvēku veselībai un videi, īpaši par tā bīstamību un kaitīgu iedarbību;
 - 53.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas un uzglabāšanas prasībām un drošu izlieto to augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apglabāšanu;
 - 53.3. citām kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām ar mazu risku;
 - 53.4. citiem pircēju interesējošiem jautājumiem.
54. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai konsultants pircējam, kas iegādājas trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekli un nav profesionāls augu aizsardzības līdzekļa lietotājs, sniedz šo noteikumu 53.punktā minēto informāciju, bet profesionālam augu aizsardzības līdzekļa lietotājam – pēc tā pieprasījuma.
55. Ja augu aizsardzības konsultants sniedzis normatīvajiem aktiem, augu aizsardzības līdzekļa reģistrētajiem lietošanas noteikumiem vai Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktajiem labas augu aizsardzības prakses principiem (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē) neatbilstošas konsultācijas, persona ir tiesīga vērsties dienestā.

VI. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU APRITES KONTROLE

56. Kontrolējot augu aizsardzības līdzekļu apriti, dienests ņem paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, augu aizsardzības līdzekļu sagatavotiem darba šķidrumiem un priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Paraugus analizē akreditētā laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Labas laboratorijas prakse".
57. Lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, dienests ņem kontroles iepakojumu.
58. Kontroles iepakojums ir augu aizsardzības līdzekļa vienas partijas viena iepakojuma vienība, ko dienests iesniedz šo noteikumu 56.punktā minētajā laboratorijā augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes analīzei.
59. Par analizējamo paraugu izmanto vismaz 200 mililitru augu aizsardzības līdzekļa. Ja augu aizsardzības līdzekļa iepakojuma tilpums ir mazāks par 200 mililitriem, ņem vairākus kontroles iepakojumus.
60. Kontroles iepakojumu dienests ņem, piedaloties augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam. Ja augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks atsakās piedalīties kontroles iepakojuma ņemšanas procedūrā, dienesta inspektors paraugu ņem bez augu aizsardzības līdzekļa īpašnieka klātbūtnes un pārbaudes aktā izdara atzīmi par īpašnieka atteikšanos piedalīties pārbaudē.
61. Par parauga vai kontroles iepakojuma ņemšanu dienesta inspektors sastāda aktu trijos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru kopā ar paraugu vai kontroles iepakojumu ievieto iesaiņojumā. Iesaiņojumu noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Otrs akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, bet trešais – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.
62. Kontroles iepakojumu līdz nodošanai laboratorijā uzglabā atbilstoši augu aizsardzības līdzekļa uzglabāšanas prasībām.
63. Pamatojoties uz šo noteikumu 56.punktā minētās laboratorijas izsniegtajiem analīžu rezultātiem, dienests triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas sagatavo atzinumu par augu aizsardzības līdzekļa sastāva atbilstību reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam.
64. Atzinums par augu aizsardzības līdzekļa sastāva atbilstību reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam attiecināms uz visu augu aizsardzības līdzekļa partiju.
65. Ja saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzekļa sastāvs atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas izsniedz atzinuma kopijas augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas īpašnieka pārstāvim Latvijā.

66. Ja dienests pieņem lēmumu apturēt augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanu vai lietošanu Latvijā uz laiku, līdz pilnībā tiek noskaidrota augu aizsardzības līdzekļa kvalitāte, dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63.punktā minētā atzinuma parakstīšanas:
- 66.1. lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā;
 - 66.2. nosūta kontroles iepakojumu augu aizsardzības līdzekļa atkārtotām analizēm uz citu šo noteikumu 56.punktā minētajām prasībām atbilstošu laboratoriju.
67. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas atceļ lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu Latvijā. Lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā.
68. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests pieņem lēmumu aizliegt izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā un uzlikt par pienākumu izvest no Latvijas vai iznīcināt augu aizsardzības līdzekļa partiju. Lēmumu triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē www.vaad.gov.lv.
69. Ja, veicot analīzes, augu aizsardzības līdzeklis nav izlietots vai iznīcināts, dienests atdod kontroles iepakojuma daļu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam, sastādot par to aktu divos eksemplāros. Viens akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, otrs – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.
70. Šo noteikumu 69.punktā minēto kontroles iepakojuma daļu kopā ar vienu akta eksemplāru ievieto iesaiņojumā un noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Šādu augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu ir atļauts izplatīt.
71. Ja dienests pieņem lēmumu aizliegt izplatīt nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa partiju, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks un pārējie licences īpašnieki, kas ievēduši un izplatījuši augu aizsardzības līdzekli Latvijā, šo augu aizsardzības līdzekļa partiju atsauc no izplatīšanas un divu mēnešu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma saņemšanas izved no Latvijas vai nodod iznīcināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu iznīcināšanai.
72. Lai atsauktu no izplatīšanas nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekļa partiju, licences īpašnieks nosūta paziņojumu personām, kurām attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:
- 72.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma apjomu, partijas numuru;
 - 72.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;
 - 72.3. izplatīšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruna numuru un citu informāciju, kura konkrētajā gadījumā ir būtiska.
73. Ja dienests pieņem lēmumu par nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas aizliegumu, augu aizsardzības līdzekļa lietotājs konkrēto neizlietoto augu aizsardzības līdzekli nodod licences īpašniekam divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa izvešanu vai nodošanu iznīcināšanai.
74. Licences īpašniekam ir pienākums pieņemt pārdoto nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekli atpakaļ no pircēja un segt viņam radušos zaudējumus.

INFORMATĪVA ATSAUCE UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVU

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents **V. Dombrovskis**
Zemkopības ministre **L. Straujuma**

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.949

Valsts augu aizsardzības dienestam

**Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim,
kam beidzies derīguma termiņš**

Iesnieguma iesniedzējs _____
(nosaukums, adrese)

Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vieta _____
(adrese)

Speciālās atļaujas (licences) Nr. _____

Augu aizsardzības līdzekļa:

nosaukums _____

darbīgās vielas nosaukums _____, daudzums % _____

_____, daudzums % _____

_____, daudzums % _____

reģistrācijas numurs _____

partijas numurs _____

iepakošanas lielums _____ (l), (kg)

Iesniegumu aizpildīja _____
(vārds, uzvārds) (paraksts*)

Datums* _____

Iesniegumu pieņēma _____
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L. Straujuma

Ministru kabineta noteikumi Nr.950
Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 19.§)

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

13.12.2011. MK noteikumi Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"
(“LV”, 202 (4600),
23.12.2011.) [stājas spēkā 24.12.2011.]

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 5.punktu un 9.panta otro daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka:
 - 1.1. augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un uzglabāšanas prasības;
 - 1.2. profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības;
 - 1.3. novērtējuma sagatavošanas kārtību par iespējamo risku augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa;
 - 1.4. atļaujas izsniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa;
 - 1.5. speciālos pasākumus ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzībai.
2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS

3. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā, ievērojot marķējumā noteiktos uzglabāšanas apstākļus, kā arī Augu aizsardzības likuma 9.panta trešās daļas un Aizsargjoslu likuma prasības.
4. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā plauktos vai uz paletēm.
5. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kuras var applūst, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.
6. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā, vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.
7. Izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus līdz to apglabāšanai tur kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem un apglabā saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību. Šo prasību var neievērot, ja izlietotā augu aizsardzības līdzekļa iepakojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu.

III. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS PRASĪBAS

8. Saimniecībā, kurā tiek uzglabāti vai lietoti augu aizsardzības līdzekļi, darbā iesaistītajām personām ir pieejami:
 - 8.1. individuālie aizsardzības līdzekļi (piemēram, respirators, aizsargbrilles, aizsargapģērbs, cimdi);
 - 8.2. absorbējošie materiāli (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdra);
 - 8.3. inventārs, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst (piemēram, slota, spainis, liekšķere).
9. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, kultūrauga attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.
10. Par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.
11. Lietošanai pēc iespējas izvēlas tādus augu aizsardzības līdzekļus, kuri potenciāli var radīt mazāku risku videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai, kuri nav kvalificēti kā bīstami ūdens videi un kuros nav prioritāro bīstamo vielu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem un to iespējamo blakusiedarbību uz cilvēku veselību un vidi dienests ievieto un aktualizē savā tīmekļa vietnē.
12. Lai aizsargātu ūdens vidi un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības.
13. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs kārtro reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnālā uzskaita gan iegādātos augu aizsardzības līdzekļus (norāda saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa

- nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu), gan izlietos augu aizsardzības līdzekļus (norāda informāciju par apstrādāto kultūraugu sugu vai objektu (piemēram, labības noliktava), apstrādāto teritoriju, tās platību, apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un devu). Reģistrācijas žurnālu glabā vismaz trīs gadus.
14. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus, aizliegts:
 - 14.1. iesaistīt darbā personas, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un mātes, kas baro bērnu ar krūti;
 - 14.2. izmantot bojātas, nenoregulētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, kā arī iekārtas, kas nav pārbaudītas normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām noteiktajā kārtībā;
 - 14.3. atstāt bez uzraudzības sagatavotus darba šķidrumus un neizlietos augu aizsardzības līdzekļus;
 - 14.4. izliet smidzināšanai paredzētā darba šķidruma atlikumu;
 - 14.5. nepiederošām personām uzturēties vietā, kur strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 - 14.6. ēst, dzert un smēķēt.
 15. Iztukšoto augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu trīs reizes izskalo ar tīru ūdeni darba šķidruma gatavošanas laikā, un skalojamo ūdeni iepilda darba šķidruma tvertnē.
 16. Pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas darba šķidruma atlikumu atšķaida ar lielu ūdens daudzumu un izsmidzina uz apstrādāta lauka. Darbu beidzot, iekārtas tvertni izskalo ar tīru ūdeni vai ar lietotā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādīto mazgāšanas līdzekli, ko izsmidzina uz apstrādāta lauka.
 17. Aizliegts atkārtoti izmantot izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus.
 18. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sējumu un stādījumu apsmidzināšanai, ievēro šādus drošības pasākumus:
 - 18.1. augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētāmpalīgiecēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē;
 - 18.2. strādājot seko smidzinātāja darba kvalitātei, kā arī preparāta izlietojumam.
 19. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, persona, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ievēro marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, ja tajā ir:
 - 19.1. norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57;
 - 19.2. standartfrāze Spe8;
 - 19.3. citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju aizsardzību.
 20. Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.
 21. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sēklu kodināšanā, ievēro šādus drošības pasākumus:
 - 21.1. sēklas kodina speciāli iekārtotās telpās, nojumēs, laukumos un kodināšanai piemērotās iekārtās;
 - 21.2. kodināšanas darbos iesaistītās personas izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;
 - 21.3. kodināto sēklu pārpalikumus uzglabā sausā aizslēgtā noliktavā atsevišķi no pārtikas un lopbarības graudiem iepakojumā ar norādi "KODINĀTS", norādot arī kodnes vai darbīgās vielas nosaukumu;
 - 21.4. pēc sēklu kodināšanas un sējas pabeigšanas kodināšanas vietu, sēklu kodināšanas iekārtas, sējmašīnas, sēklu iepildītājus un citas iekārtas, kurām ir bijusi saskare ar kodinātām sēklām, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus neitralizē, ievērojot norādes attiecīgās kodnes marķējumā;
 - 21.5. kodinātās sēklas aizliegts lietot pārtikā, izbarot dzīvniekiem un putniem, kā arī mazgāt vai atīrīt no kodnes, lai tās realizētu pārtikas vai lopbarības vajadzībām;
 - 21.6. kodinātās sēklas drīkst pārvadāt tikai šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētajos iepakojumos vai speciālos sējmašīnu uzpildītājos, kā arī sējmašīnu tvertnēs.
 22. Ja pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus lieto par fumigantiem fumigācijā (objekta apstrādē ar augu aizsardzības līdzekli gāzveida stāvoklī), ievēro šādas darba drošības prasības:
 - 22.1. fumigāciju drīkst veikt tikai hermētiski noslēdzamā objektā, ja tas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no dzīvojamām ēkām un ne tuvāk par 30 metriem no plašai sabiedrībai pieejamām teritorijām (piemēram, parka, sporta laukuma, atpūtas vietas);
 - 22.2. vienu dienu pirms fumigācijas sākšanas par fumigāciju un tās veikšanas laiku brīdina cilvēkus, kas atrodas objektam piegulošajā teritorijā;
 - 22.3. pirms fumigācijas sākšanas veic objekta hermetizāciju. Objekta hermētiskumu nodrošina visa procesa laikā;
 - 22.4. objektu norobežo un izvieto labi saredzamus brīdinājuma uzrakstus "BĪSTAMI DZĪVĪBAI" un "IEEJA AIZLIEGTA";
 - 22.5. lai garantētu darba drošību, fumigāciju veic vismaz divas personas;

- 22.6. nodrošina personas klātbūtni objektā no fumigācijas sākuma līdz pilnīgai fumiganta neitralizācijai un telpu izvēdināšanai pēc fumigācijas beigām (turpmāk – degazācija);
- 22.7. fumigācijā iesaistītās personas nodrošina ar gāzmaskām;
- 22.8. fumigācijas sagatavošanu un fumiganta palaišanu veic diennakts gaišajā laikā;
- 22.9. pirms degazācijas sākšanas mēra fumiganta koncentrāciju objektā, lai konstatētu, vai fumigācijas laikā sasniegta nepieciešamā fumiganta koncentrācija;
- 22.10. degazāciju veic pakāpeniski, neļaujot izplūst atmosfērā lielumam fumiganta daudzumam;
- 22.11. objekta degazāciju veic, līdz fumiganta koncentrācija sasniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā paredzētos rādītājus.
23. Fumigācijas un degazācijas laikā:
 - 23.1. mēra fumiganta koncentrāciju gaisā un nodrošina, lai augu aizsardzības līdzekļu koncentrācija nepārsniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītās pieļaujamās normas;
 - 23.2. reģistrācijas žurnālā papildus šo noteikumu 13.punktā minētajam norāda fumigācijas laiku, izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, mērījumu veikšanas laiku un fumiganta koncentrāciju.
24. Pēc degazācijas mēra fumiganta koncentrāciju visās telpās, kurās veikta fumigācija, un sastāda aktu par fumigācijas un degazācijas veikšanu. Aktu paraksta profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators un pārējās personas, kas piedalījušās fumigācijā.
25. Ja augu aizsardzības līdzekli lieto segtās platībās, tad pēc attiecīgā līdzekļa lietošanas tās noslēdz un pie durvīm pieliek brīdinājuma zīmi ar informāciju par lietoto augu aizsardzības līdzekli, kā arī norāda laiku, kad telpā atkal drīkstēs uzturēties, un par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgās personas tālruna numuru.
26. Teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra (EK) Regulas Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, 3.pantu (piemēram, parkā, sporta laukumā, atpūtas vietā, skolu teritorijā, slimnīcu teritorijā), augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tad, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un lietošanas instrukcijā ir atļauts šāds konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietojums. Augu aizsardzības līdzekli plašai sabiedrībai pieejamās teritorijās lieto pēc iespējas tādā laikā, kad tajās neuzturas cilvēki.
27. Vismaz divas dienas pirms augu aizsardzības līdzekļu lietošanas šo noteikumu 26.punktā minētajās vietās atbildīgā persona vietējos nova-
da vai pagasta laikrakstos vai savā tīmekļa vietnē ievieto paziņojumu par paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai citādi publisko šo informāciju.
28. Šo noteikumu 26.punktā minētajos gadījumos augu aizsardzības līdzekļa lietošanas laikā, kā arī pēc tā lietošanas apstrādāto teritoriju norobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto augu aizsardzības līdzekli, nogaidīšanas periodu un par to, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju.
29. Dzelzceļa līnijas, autoceļu daļas un ļoti caurlaidīgas teritorijas, kā arī necaurlaidīgas teritorijas, kas ir tuvu virszemes vai pazemes ūdeņiem, ir atļauts apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, tikai ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības un nodrošinot, ka augu aizsardzības līdzekļi nenokļūst virszemes ūdeņos vai noteku sistēmās.

IV. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IZSMIDZINĀŠANA NO GAISA

30. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts izsmidzināt no gaisa, ja saņemta dienesta atļauja augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa (turpmāk – atļauja).
31. Dienests, ievērojot šo noteikumu 34.punktā minētos nosacījumus, atļauju izsniedz šādos gadījumos:
 - 31.1. ja tas nepieciešams zinātniskām institūcijām pētījumu veikšanai lauksaimniecības nozarē;
 - 31.2. lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistītajām personām ārkārtas gadījumā;
 - 31.3. mežu apstrādei kokiem kaitīgo organismu masveida savairošanās gadījumā.
32. Lai saņemtu atļauju, ieinteresētā persona dienestā iesniedz:
 - 32.1. pieteikumu atļaujas saņemšanai. Pieteikumā pamatota atļaujas nepieciešamība, kā arī norādīta kaitīgā organisma identitāte, kultūrauga apdraudējuma apjoms, nozīmīgums, ekonomiskais apdraudējums, lietošanai paredzētā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, tā deva, apstrādājamā platība, paredzamais izsmidzināšanas laiks, kā arī pamatojums, kādēļ konkrētajā situācijā nav izmantojamas citas kaitīgā organisma apkarošanas metodes;
 - 32.2. karti, kurā iezīmēta apsmidzināšanai no gaisa paredzētā teritorija;
 - 32.3. informāciju par personu, kura veiks smidzināšanas darbus, kā arī par lietošanas iekārtām.
33. Dienests, pamatojoties uz iesniegto un citu dienesta rīcībā esošo informāciju, sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību un veic riska analīzi ne ilgāk kā:
 - 33.1. divu nedēļu laikā, ja augu aizsardzības līdzeklis nav atļauts lietošanai Latvijā;

- 33.2. vienas nedēļas laikā, ja augu aizsardzības līdzeklis ir atļauts lietošanai Latvijā.
34. Dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja:
- 34.1. nav citas piemērotas alternatīvas vai arī izsmidzināšanai no gaisa salīdzinājumā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu uz zemes ir lielākas priekšrocības, lai mazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;
 - 34.2. ir veikta riska analīze un gūts apstiprinājums tam, ka pozitīvais efekts no šāda augu aizsardzības līdzekļu lietojuma būs lielāks nekā iespējamais risks videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai;
 - 34.3. operators, kas veic smidzinājumu no gaisa, ir apmācīts un ieguvis apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;
 - 34.4. lietošanas iekārtas ir pārbaudītas un atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām noteiktajām prasībām;
 - 34.5. lidaparāts ir reģistrēts normatīvajos aktos par aviāciju noteiktajā kārtībā un aprīkots ar piederumiem, kas atbilst labākai pieejamai tehnoloģijai, lai samazinātu augu aizsardzības līdzekļu nonesi ar vēju;
 - 34.6. apstrādājamā teritorija neatrodas dzīvojamo zonu tuvumā.
35. Atļaujā dienests iekļauj šādas ziņas:
- 35.1. izmantošanai atļautā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums;
 - 35.2. izmantošanai atļautā teritorija, norādot precīzu tās vietu un platību;
 - 35.3. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumi, ietverot riska ierobežošanas pasākumus;
 - 35.4. par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgā persona;
 - 35.5. plānotais augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas datums, laiks un nogaidīšanas laiks – laika intervāls no apstrādes līdz laikam, kad teritorijā drīkst atkal uzturēties un veikt saimnieciskas darbības (piemēram, ogot, sēpot).
36. Persona, kas saņēmusi atļauju, pirms darbu veikšanas informē attiecīgās apkārtnes iedzīvotājus šo noteikumu 27.punktā minētajā kārtībā, kā arī veic šo noteikumu 28.punktā minētos drošības pasākumus.
37. Ja tiek izsniegta atļauja izsmidzināt augu aizsardzības līdzekļus no gaisa, dienests lēmumu publicē savā tīmekļa vietnē, kā arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
38. Persona ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas no gaisa iesniedz dienestā pārskatu par smidzinājumu, norādot datumu un laiku, kad notika izsmidzināšana, izlietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, tā daudzumu un devu, kā arī informāciju par apstrādāto teritoriju.
39. Persona sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar

dienesta sagatavoto novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību un riska analīzi un kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

V. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS KONTROLE

40. Veicot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas kontroli, dienests var ņemt paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, sagatavotiem augu aizsardzības līdzekļu darba šķidrumiem un citiem priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Paraugus analizē akreditētā laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Labas laboratorijas prakse".
41. Paraugus ņem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā. Augu aizsardzības līdzekļa paraugu dienests ņem saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū noteikto kārtību.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumus Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2009, 70., 166.nr.; 2010, 174.nr.).
43. Līdz 2013.gada 1.janvārim pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot un iegādāties personām, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" minētajām prasībām.
44. Šo noteikumu 14.2. un 34.4.apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2016.gada 26.novembrī.
45. Šo noteikumu 34.5.apakšpunkta prasības attiecībā uz lidaparātu aprīkojumu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

INFORMATĪVA ATSAUCE UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVU

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents **V. Dombrovskis**

Zemkopības ministre **L. Straujuma**

AIZSARGJOSLU LIKUMA IZRAKSTS

05.02.1997. likums "Aizsargjoslu likums" ("LV", 56/57 (771/772), 25.02.1997.)
[stājas spēkā 11.03.1997.] ar grozījumiem:

- 21.02.2002. likums ("LV", 39 (2614), 12.03.2002.) [stājas spēkā ar 26.03.2002.]
- 19.06.2003. likums ("LV", 101 (2866), 08.07.2003.) [stājas spēkā ar 22.07.2003.]
- 22.06.2005. likums ("LV", 108 (3266), 12.07.2005.) [stājas spēkā ar 15.07.2005.]
- 06.03.2008. likums ("LV", 43 (3827), 18.03.2008.) [stājas spēkā ar 01.04.2008.]
- 14.05.2009. likums ("LV", 82 (4068), 27.05.2009.) [stājas spēkā ar 10.06.2009.]
- 16.12.2010. likums ("LV", 205 (4397), 29.12.2010.) [stājas spēkā ar 01.01.2011.]
- 13.10.2011. likums ("LV", 169 (4567), 26.10.2011.) [stājas spēkā ar 09.11.2011.]

Redakcija: [01.01.2013]

34.pants. Aizsargjoslu pārklāšanās

Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām.

35.pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās

- (1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.
- (2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.
- (3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.
- (4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.
- (5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas vienošanās.
- (6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus

veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai – pēc savstarpējas vienošanās – objekta īpašnieks vai valdītājs.

- (7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības.
- (8) Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kontroles veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, – zemes lietotāju.
- (9) Tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002., 19.06.2003., 22.06.2005. un 14.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2009. Devītā daļa stājas spēkā 01.07.2009. Sk. Pārejas noteikumus.)

36.pants. Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

- (1) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā noteikti šādi aprobežojumi:
 - 1) pilsētās un ciemos jaunveidojamās zemes vienības platību un apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
 - 2) ārpus pilsētām un ciemiem uz katra zemes īpašuma atļauts izvietot vienu viensētu ar palīgēkām, viesnīcu un tai līdzīga lietojuma ēku, tūrismam nepieciešamo skatu torni, šajā pantā minēto infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvi atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Sadalot

- zemes gabalu vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem, izņemot gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
- 3) ja, atsavinot vai iznomājot valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, paredzēta zemes lietojuma veida maiņa, kas nav noteikta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, katru reizi nepieciešams Ministru kabineta rīkojums;
- 4) aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;
- 5) apdzīvotās vietās, lai saglabātu piekrastei raksturīgu kultūrvēsturisko ainavu, vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā var iekļaut papildu arhitektūras prasības jaunajai būvniecībai.
- (2) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad:
- 1) saskaņojot ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam tiek:
 - a) renovētas vai restaurētas esošās ēkas un būves;
 - b) būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai būvēm;
 - c) rekonstruētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet, rekonstruējot esošās dzīvojamās ēkas, kuru platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem, to kopējā platība pēc rekonstrukcijas nedrīkst pārsniegt 150 kvadrātmetrus;
 - 2) tiek attīstīta osta vai attīstīti un rekonstruēti esošie zvejniecības un zivju pārstrādes uzņēmumi;
 - 3) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un notiek pilsētas teritorijā, un šīs darbības ir saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;
 - 4) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciema robežās vietās, kur bijusi iepriekšējā apbūve, minētās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;
 - 5) tiek veikta krastu nostiprināšana esošo būvju un infrastruktūras aizsardzībai;
 - 6) tiek veikta mehānisko transportlīdzekļu stāvlaukumu un glābšanas staciju būvniecība un tiem nepieciešamo pievadeļu un teritorijas labiekārtošanai nepieciešamo mazēku būvniecība.
- (2¹) Šā panta otrajā daļā minētās darbības veic, ja:
- 1) veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojumu vai izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām;
 - 2) attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.
- (3) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajam aizliegts:
- 1) atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā;
 - 2) pludmalē un tauvas joslā norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmģājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos, izņemot ostas teritoriju atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Lēmumi par nožogojumu nojaukšanu pieņemami un izpildāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 3) izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas, izņemot atbilstoši teritoriju plānojumam – ostas teritorijā, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot sienu šķūņus bez vienlaidu pamatiem);
 - 4) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvu ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām;
 - 5) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
 - 6) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus autoceļiem, pludmalē, meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;
 - 7) rīkot publiskus sporta, izklaides vai atpūtas pasākumus, kas nav saskaņoti ar vietējo pašvaldību, bet, ja aizsargjosla atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, – ar šīs teritorijas administrāciju;
 - 8) novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus, ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām vietām;
 - 9) pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt dabisko zemsedzi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams šajā pantā atļauto darbību veikšanai.

- (4) Krasta kāpu aizsargjoslā papildus šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajam aizliegts:
- 1) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situācijas seku likvidēšanai, kā arī vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;
 - 2) mežā veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu, kuras rezultātā platība tiek atmežota, un laucēs veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu bez Ministru kabineta iekreizēja rīkojuma. Koku ciršanas kārtību krasta kāpu aizsargjoslā esošā mežā šajā punktā minēto darbību īstenošanai nosaka Ministru kabinets;
 - 3) kurt ugunsķurkus ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām un māju pagalmiem, izņemot gadījumus, kad jāiznīcina sausie, vēja izgāztie vai lauztie koki un slimību inficētie vai kaitēkļu invadētie materiāli;
 - 4) novietot teltis ārpus šim nolūkam iekārtotām vai norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
- (5) Pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājām-gājējiem piekļūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju celiņu ierīkošanu, ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī to, ka celiņi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izņemot gadījumu, kad to nav iespējams nodrošināt dabā esošo apstākļu dēļ. Ja nepieciešams, pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies aprobežojuma noteikšanas dēļ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
- (6) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī kultūras un vēstures pieminekļu teritorijās kājām-gājēju pārvietošanos regulē šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
- (7) Ja ir paredzēts celtnes valsts nozīmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus, kuri nav paredzēti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, apbūve krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē ir pieļaujama tikai ar Ministru kabineta iekreizēju rīkojumu.
- (8) Jūras aizsargjoslā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. Vietējā pašvaldība nosaka speciāli iezīmētas vietas, kurās atļauts braukt ar ūdens motocikliem.
- (19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005., 14.05.2009. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2011. Ceturtās daļas*

2.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

37.pants. Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās

- (1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
- 1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas;
 - 2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
 - 3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, kailcirtē aizliegta visā aizsargjoslas platumā;
 - 4) applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot:
 - a) īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību,
 - b) esošo būvju renovāciju,
 - c) kultūras pieminekļu restaurāciju,
 - d) transporta un elektronisko sakaru tīklu būvju būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas pārvades un sadales būvju būvniecību,
 - e) peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību,
 - f) jahtu ostu būvniecību, kurās paredzētas ne mazāk kā 25 atpūtas kuģu stāvvietas ūdenī, un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu būvniecību,
 - g) valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu stacionāru valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būvniecību,
 - h) biotopu apsaimniekošanai nepieciešamo īslaicīgas lietošanas būvju un dabas tūrisma nepieciešamo skatu torņu, laipu u.tml. objektu būvniecību,
 - i) inženieraizsardzības un hidrotehnisko būvju izbūvi esošās apbūves aizsardzībai pret palieņiem vai plūdiem un stacionārās aizsardzības būves piesārņojuma aizturēšanai un savākšanai,
 - j) teritorijas uzbēršanu šā punkta "d", "e", "f", "g" un "i" apakšpunktā noteiktās būvniecības īstenošanai;

- 4¹⁾ ostu applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, izņemot hidrotehniskās būves, piestātnes, infrastruktūras, inženierkomunikācijas un citas ar ostu darbību saistītās būves un veikt minētajām būvēm nepieciešamo teritorijas uzbēršanu, arī esošo būvju renovāciju, ja šādas darbības nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu;
- 5) 10 metrus platā joslā papildus šā panta 1., 2., 3., 4. un 4.¹ punktā minētajam aizliegts:
- izvietot degvielas uzpildes stacijas,
 - būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot esošo būvju renovāciju; kultūras pieminekļu restaurāciju; transporta un elektronisko sakaru tīklu būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas pārvades un sadales būvju būvniecību; peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību; valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu stacionāru valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būvniecību, kā arī krastu nostiprināšanu; ostu teritorijā esošo hidrotehnisko būvju, piestātņu, infrastruktūras, inženierkomunikācijas, kā arī citu ar ostu darbību saistītu būvju būvniecību; jahtu ostu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī šīs daļas 4. un 4.¹ punktā minētajos gadījumos paredzēto teritorijas uzbēršanu),
 - lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
 - ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,
 - veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāzu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,
 - iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvī ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
 - mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku,
 - veikt teritorijas atmežošanu, ja tā nav saistīta ar šā punkta "b" apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem,
 - kurt uguns-kurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
- 6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;

- 7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas;

- (1¹⁾) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētās darbības drīkst veikt, ja tās nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu.
- (2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
- (3) Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

(21.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 06.03.2008., 14.05.2009. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2011. Grozījumi pirmās daļas 5.punkta "h" apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

37.¹ pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap purviem

Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meža likums.

(21.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2002.)

38.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem

Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

- jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;
- pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;
- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;
- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziiju izraisošas vielas.

39.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām

Aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

- 1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvī konkrētā ūdensapgādes urbūmā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
- 2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu mākslīgas papildināšanas metodi, jāievēro šā panta 1.punktā minētie aprobežojumi. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:
 - a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas,
 - b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus,
 - c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
 - d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm,
 - e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,
 - f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,
 - g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,
 - h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
- 3) ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums;
- 4) ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto grunts-ūdeņu (neaizsargātu) ūdens horizontu vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas papildināšanas metodi, ķīmiskajā aizsargjoslā 500 metru platā joslā ap stingrā režīma aizsargjoslu aizliegts:
 - a) veikt meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu esošo ciemu teritorijās un ēku un būvju būvniecībai viensētās ārpus ciema teritorijas robežām, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams ūdensapgādes būvju būvniecībai,
 - b) veidot jaunus ciemus un paplašināt esošos,
 - c) ārpus esošajiem ciemiem sadalīt zemi zemes vienībās, kas mazākas par 2400 kvadrātmetriem,
 - d) no jauna projektējamās un rekonstruējamās būvobjektos novadīt notekūdeņus (arī pēc attīrīšanas lokālajās attīrīšanas iekārtās) gruntī un virszemes ūdensobjektos,
 - e) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus.

(21.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2009. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2011. 4.punkta "a" apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

IZRAKSTS NO LIKUMA

“LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS”

07.12.1984. likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” (Ziņotājs, 51, 20.12.1984.) [stājas spēkā 01.07.1985.] ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 14.12.2012.

Redakcija: [01.01.2013]

102.² pants. Augu aizsardzības līdzekļu ieviešanas, izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas prasību pārkāpšana

Par Latvijā neregistrētu augu aizsardzības līdzekļu ieviešanu, izplatīšanu vai lietošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot neregistrētos augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas vai lietošanas prasību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.07.2003.)

IZRAKSTS

no Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumiem Nr.173 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” 14.pielikuma

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

01.03.2011. MK noteikumi Nr.173 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” (“LV”, 44 (4442), 18.03.2011.) [stājas spēkā 19.03.2011.] ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 24.07.2012.

Redakcija: [03.08.2012]

OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.497; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.135; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.514, sk. noteikumu 121. un 121.¹punktu)

B DAĻA

3. Prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības jomā

3.1. prasība “Augu aizsardzības līdzekļu lietošana”

3.1.1. Augu aizsardzības likuma 7.panta pirmās daļas pirmais teikums, 9.panta trešā daļa, 10.panta pirmā daļa (neattiecas vārdi “Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos tajos paredzētajos gadījumos”)

3.1.2. Augu aizsardzības likuma 7.panta piektās daļas 1.punkts

3.1.3. Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” 3., 9. un 13.punkts

3.1.4. Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” 43.punkts

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA TELEFONA NUMURI

Direktore	67027098
Direktores palīdzē.	67027406
Direktores vietnieks – galvenais inspektors	67027186
Agroķīmijas departaments	67551272

AUGU AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTS

Direktore	67185478
Departamenta direktores vietiece	67550929
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa	67185481
.....	67185479
Integrētās augu aizsardzības daļa	67550923

AUGU KARANTĪNAS DEPARTAMENTS

Direktore	67550931
Fitosanitārās uzraudzības daļa	67550926
.....	67550928
Nacionālā fitosanitārā laboratorija	67550950
Nacionālā fitosanitārā laboratorijas vadītāja	67543138

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA REĢIONĀLĀS NODAĻAS


Rīgas reģionālā nodaļa	67324506	Vidzemes reģionālā nodaļa	64221594
Rīga	67323698	Valmiera	64221137
	67324516		64221591
	67323676		64221578
	67323678	Priekuļu novads	64123937
Limbaži	64022368		64130977
Tukums	63122778		64130300
Kurzemes reģionālā nodaļa	63222552	Alūksne	64322963
Tālsī	63232248	Gulbene	64471050
Kuldīga	63322092	Madona	64822541
	63348239	Latgales reģionālā nodaļa	65322724
Liepāja	63427674		65444113
	63427206	Daugavpils	65440058
	63425068		65444112
Saldus	63821377		65444113
	63822679		65474059
Ventspils	63628548	Rēzekne	64622728
Zemgales reģionālā nodaļa	63022541		64623110
Jelgava	63022519	Balvi	64522971
	63010920	Preiļi	65307405
Bauskas novads	63926882	Krāslava	65623832
	63922318	Ludza	65723565
Dobele	63791288		
Aizkraukle	65123591		
Jēkabpils	65235207		
	65233164		

Mājas lapa: <http://www.vaad.gov.lv>


Informāciju par 2013.gadā reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to lietojumu un apstiprinātajām izmaiņām iepriekš reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietojumā var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā <http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba.aspx>

Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība

Rapša fenoloģiskās attīstības stadijas (BBCH identifikācijas skala)

Divlapu atraisīšanās	10	
Pirmā lapiņu pāra attīstība	11	
Otrā lapiņu pāra attīstība	13	
Astotā lapu pāra attīstība	18	
Divu starpmezglu posmu attīstība	32	
Ziedkopas veidošanās	51	
10% ziedu galvenajā dzinumā	61	
Ziedēšanas beigas	69	
Nogatavošanās	79	
	89	

Sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas (BBCH identifikācijas skala)

Miera periods	00	
Pumpuru briešana	51	
Zaļais konuss	53	
Peļausu stadija	54	
Ziedpumpuru parādīšanās	55	
Ziedpumpuru uzbriešana	59	
Ziedēšanas sākums	61	
Augļaizmetņu augšana (līdz 10 mm diametrā)	71	
Augļa augšana	75	

PIEZĪMĒM